

مجرّبات ہو میو پیتھی

از

ہومیو پیتھک ڈاکٹر
کرنل (ریٹائرڈ) محمد رمضان احسن

ایم۔ اے، ایل۔ ایل۔ ایم (گولڈ میڈلسٹ)

ڈی۔ ایچ۔ ایم۔ ایس (پاکستان)

آر۔ ایچ۔ ایم۔ پی (پاکستان)



**Tibbi Books for
Atiba Karam**

ایس ڈی۔ ۱۹، عسکری ۷، چکالہ سکیم III، راولپنڈی کینٹ

مہجرات، ہومیو پیتھی	:	نام کتاب
کرغل (ریٹائرڈ) محمد رمضان احسن	:	مصنف
الفا کمپوزنگ پوائنٹ، راولپنڈی	:	کمپوزنگ
طاہر پرنٹنگ پریس، اسلام آباد فون ۴۲۳۲۵۹	:	مطبع
جولائی ۱۹۹۶	:	تاریخ اشاعت
۱۰۰۰	:	تعداد
اول برائے : رابطہ کرغل (ریٹائرڈ) محمد رمضان احسن ایس ڈی-۱۹، عسکری ۷، چکالہ سکیم III، راولپنڈی کینٹ	:	اشاعت
فون گھر ۳۰۳۰۱۵۰ / ۳۲۷۷۷۷۷		
۱۰٪ روپے	:	قیمت



**Tibbi Books for
Atiba Karam**

فہرست

پیش لفظ

۱۱

الف

۲۴	ایومن	۱۳	اباسی
۲۴	الرجی	۱۳	اپنڈی سائٹس
۲۵	الر	۱۴	ابھار
۲۵	الکو حل	۱۵	اپریشن
۲۵	امتحان	۱۵	اثرات
۲۶	انتقال مرض	۱۵	احکام
۲۶	اندام نہانی	۱۶	احتیاطی علاج
۲۶	اندھاپن	۱۷	احساس
۲۷	اندھراتا	۱۷	اداسی
۲۷	انفلوئنزا	۱۸	اڈینائڈز
۲۸	انگلی	۱۸	اسقاط حمل
۲۸	انگلی کے پور	۱۸	اسہال
۲۹	انگلی کے ناخن	۲۰	اطراف
۲۹	اینٹھن	۲۰	اعتماد
۲۹	آنت اترنا	۲۱	اعصابی درد
۳۰	آنکھیں	۲۱	اعصابی کمزوری
۳۱	آنسو	۲۲	اعصابی ورم
۳۱	آواز	۲۲	اعضاء
۳۱	ایڑی	۲۲	اکیلا پن
۳۲	آہیں	۲۳	اگزیم

ب

پ

۵۰	بے حرکتی	۳۲	بال
۵۰	بے سلیقہ	۳۲	بازو
۵۱	بے ہودہ	۳۳	بچہ
۵۱	بے ہوشی	۳۵	بخار
		۳۶	بد ہضمی
۵۱	پاخانہ	۳۷	برف
۵۲	پاگل پن	۳۷	برص
۵۳	پالی پس	۳۸	برونکائٹس
۵۳	پاؤں	۴۰	بستر
۵۴	پاؤں کے انگوٹھے کی سوجن	۴۰	بلڈ پریشر
۵۵	پائوریا	۴۱	بلغم
۵۵	پتھری	۴۲	بانجھ پن
۵۶	پستان	۴۲	بو
۵۸	پسینہ	۴۲	بوسہ
۶۰	پلوریسی	۴۳	بھوک
۶۱	پلاس	۴۴	بھس
۶۱	عمیمش	۴۶	بواسیر
۶۲	پیدائش / پیدائش	۴۶	بہرہ پن
۶۳	پیشاب	۴۷	بھنویں
۶۶	پیٹ	۴۸	بھینگا پن
۶۷	پیٹ میں درد	۴۸	بے خوابی
۶۹	پھنسیاں	۴۹	بے چینی
۶۹	پھوڑا		

ت

۸۲	جلق	۷۱	تپ دق
۸۳	جلن	۷۲	تسلی
۸۳	جلنا	۷۳	تشخ
۸۳	جنسی خواہش	۷۴	تل
۸۳	جوڑ	۷۴	تلی
		۷۴	توتلاپن
		۷۴	تیزابیت
		۷۵	تھکاوت

ج

۸۵	چائے
۸۶	چھین
۸۶	چڑچڑاپن

ٹ

۸۶	چکر		ٹاسل
۸۷	چوڑ	۷۵	ٹانگیں اور پاؤں
۸۸	چوٹ	۷۶	ٹنخے
۸۹	چنبل	۷۷	

ج

۸۹	چہرہ		جاگنا
۹۰	چپک	۷۷	جانور
۹۱	چینا	۷۸	جہڑے
۹۱	چھاتی	۷۹	جذام
۹۲	چھالے	۷۹	جسم
۹۲	چھپاکی	۸۰	جریان منی
		۸۰	جگر
		۸۱	جلد
		۸۲	جلد باز
		۸۲	

ح

۹۲	حمل
۹۳	حیض
۹۵	حیض کا ختم ہونا

خ

۱۰۶	وانے	۹۶	خارش
۱۰۷	درد	۹۷	خال پن
۱۰۹	درد زہ	۹۷	خراٹے
۱۰۹	درد کمر	۹۷	خراش
۱۱۰	دست	۹۸	خسرہ
۱۱۰	دقیانوسی	۹۸	خشکی
۱۱۰	دکھن	۹۹	خلوت نشینی
۱۱۱	دل	۹۹	خناق
۱۱۲	دل کی جلن	۹۹	خواب
۱۱۲	دل کے ڈوبنے کا احساس	۱۰۰	خواہش
۱۱۳	دماغ	۱۰۱	خوف
۱۱۳	دمہ	۱۰۲	خون
۱۱۶	دودھ	۱۰۲	خون بہنا
۱۱۶	دوڑنے والا	۱۰۱	خود کشی
۱۱۷	دیوانے کتے کا ہلکاؤ	۱۰۳	خونی پیشاب
۱۱۷	ڈر	۱۰۳	خون تھوکنا
۱۱۷	ڈکار	۱۰۴	خیالات
۱۱۷	ڈنگ		
	ذ		د
۱۱۸	ذات الجنب	۱۰۴	داد
۱۱۸	ذات الریہ	۱۰۵	داڑھی
۱۱۸	ذائقہ	۱۰۵	دانت
			دانت کا درد

۱۳۱	سر درد	۱۱۹	زہنی ابتری
۱۳۲	سردی	۱۲۰	زیا بطیس
۱۳۳	سر خباد	ر	
۱۳۵	سرطان	۱۲۱	رحم
۱۳۷	سفر	۱۲۲	رخسار
۱۳۷	سکتہ	۱۲۲	رگوں کا پھولنا
۱۳۸	سکون	۱۲۲	رعشہ
۱۳۸	سگرٹ نوشی	۱۲۳	رنگ
۱۳۸	سوچنا	۱۲۳	ریاح
۱۳۹	سوزاک	۱۲۳	ریڑھ کی ہڈی
۱۳۹	سوکھا پن	ز	
ش		۱۲۵	زائد آنت کا درد
۱۴۰	شب چراغ	۱۲۵	زبان
۱۴۰	شریان	۱۲۶	زخم
۱۴۰	شک	۱۲۶	زردی
۱۴۱	شور	۱۲۶	زکام
ص		س	
۱۴۱	صفراء	۱۲۸	سانپ
ط		۱۲۸	سانس
۱۴۱	طاعون	۱۲۹	سانس لینا
۱۴۲	طوفان	۱۲۹	سختی
		۱۲۹	سر
		۱۳۰	سراب

۱۵۱	کالچ نکنا	۱۳۲	ع	عرق النساء
۱۵۲	کئی پھنی جگہ		غ	
۱۵۲	ککڑے			
۱۵۲	کمر درد	۱۳۳		غردود
۱۵۲	کمزوری باہ	۱۳۳		غم
۱۵۳	کی خون	۱۳۴		غصہ
۱۵۳	کن پیڑے			
۱۵۳	کندھا		ف	
۱۵۳	کنہی	۱۳۴		فالج
۱۵۴	کینسر	۱۳۵		فکر
۱۵۵	کھانی	۱۳۶		فکر مند
۱۵۷	کیڑے		ق	
۱۵۸	کیل	۱۳۶		قبض
	گ	۱۳۷		قوت شامہ
۱۵۸	گالی کلویج	۱۳۷		قونج
۱۵۹	گردن	۱۳۸		قے
۱۵۹	گردے		ک	
۱۶۰	گرم	۱۳۹		کالی کھانی
۱۶۰	گری	۱۳۹		کار بنگل
۱۶۱	گا	۱۳۹		کان
۱۶۱	گھٹوئے	۱۵۱		کالی آنت کا ورم
۱۶۲	گلے پڑنا	۱۵۱		کانپنا
۱۶۳	گھلڑ	۱۵۱		کانٹا

۱۷۲	منہ	۱۶۳	گنٹھیا
۱۷۳	معدہ	۱۶۳	گھٹن
۱۷۵	مقعدہ	۱۶۳	گھٹنے
۱۷۶	موج	۱۶۳	گھٹکھا
۱۷۶	موسم		
۱۷۶	موتیا بند		
۱۷۷	موٹاپا	۱۶۵	لیوما
		۱۶۵	لقوہ
		۱۶۵	لنگڑی کا درد
۱۷۸	نا پسندیدگی	۱۶۵	لوز تمن
۱۷۹	ناراضگی	۱۶۵	لو
۱۷۹	ناخن	۱۶۵	لیکوریا
۱۸۰	ناخن خورہ		
۱۸۰	ناف		
۱۸۱	ناک	۱۶۷	مارفیا
۱۸۲	نامردی	۱۶۷	متلی
۱۸۳	نزله	۱۶۷	مشانہ
۱۸۳	نظر	۱۶۸	محببت
۱۸۵	نکسیر	۱۶۹	مروڑ
۱۸۶	نمونہ	۱۶۹	مرگی
۱۸۷	نخند	۱۷۰	مزاج
		۱۷۰	مے
۱۸۸	وجع الفاصل	۱۷۲	موسڑھے

ل

م

ن

و

۱۹۰

وقت

د

۱۹۰

ہاتھ

۱۹۰

پچکی

۱۹۱

ہڈیاں

۱۹۲

ہرنیا

۱۹۲

ہسٹریا

۱۹۳

ہونٹ

۱۹۳

ہیضہ

ک

۱۹۳

یرقان

۱۹۵

ضمیمہ - ۱

۱۹۶

ضمیمہ - ۲



**Tibbi Books for
Atiba Karam**

پیش لفظ

ہومیو پیتھی ذریعہ علاج فطرت کے عین مطابق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ہر طریقہ علاج آزمانے کے بعد ہومیو پیتھی کے علاج کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ اس ذریعہ علاج میں معالج کو مریض کی مکمل اور جامع علامات کو مد نظر رکھ کر دوا تجویز کرنا ہوتی ہے لیکن یہ بات مشاہدہ میں آئی ہے کہ معالج دوا کی تلاش کی بھول، بھیلوں میں اکثر پھنس جاتے ہیں جس کی وجہ سے بالمثل دوا کا تجویز کرنا از حد مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا معالج انفرادی دوا کی بجائے مرکبات کا سہارا لینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

ادویات کے بغور مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مریض علامات کا ذکر کرتے ہوئے چند ایسی علامات کا ذکر ضرور کرتا ہے جو کلیدی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ اگر دوا ان کلیدی علامات کو مد نظر رکھ کر تجویز کی جائے تو یقیناً سودمند ہوگی۔ معالجین کی اس مشکل کو رفع کرنے کے لئے اور مریض کی شفا کو یقینی بنانے کے لئے اس کتاب میں صرف ان کلیدی علامات کا ذکر ہے جس پر دوا بغیر کسی حیل و حجت کے تجویز کی جاسکتی ہے اور ایسی علامات کے سامنے ایسی دوا اور اس کی طاقت کا انتخاب کیا گیا ہے جو ہومیو پیتھی کے اساتذہ استعمال کرتے آئیں ہیں۔ پوٹینسی کا انتخاب صرف معالج کے تجربہ کی بناء پر ہی ہونا چاہئے، مجھے اس سے انکار نہیں، مگر اس افراطی کے دور میں معالج کے لئے ایسا کرنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ ہومیو پیتھی ذریعہ علاج میں اگر دوا کا انتخاب درست ہو اور بالمثل ہو تو پھر کوئی بھی پوٹینسی ضرور موثر ہوگی۔ جب ذہنی ابتری کی وجہ سے مریض کے خیالات میں فرق آ جائے تو چھوٹی پوٹینسی موثر ثابت نہیں ہوتی بلکہ دس ہزار یا اس سے اوپر کی پوٹینسی

کی صرف ایک خوراک اکسیر ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کچھ ادویات ایسی بھی ہیں جو صرف چھوٹی پوٹینسی میں ہی بہتر نتائج کی حامل ہوتی ہیں اور کچھ ادویات ایسی ہیں جو اونچی پوٹینسی میں زیادہ سودمند ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دوا کی طاقت مدر نکلچر سے لے کر IM پوٹینسی تک سفارش کی گئی ہے۔ IM سے اونچی طاقت کا انتخاب معالج پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ کچھ ادویات کے ساتھ کوئی طاقت نہیں لکھی گئی۔ یہاں پوٹینسی معالج کی صوابدید پر چھوڑ دی گئی ہے۔ معالج اگر چاہے تو اپنے تجربہ کی بنا پر اور مریض کی حالت اور علامات کے پیش نظر مجوزہ طاقتوں میں مناسب رد بدل کر سکتا ہے۔

اس کتاب میں یہ کوشش نمایاں ہے کہ ہر علامت کے سامنے ایک ہی دوا کا انتخاب کیا جائے اور اس کے ساتھ مناسب پوٹینسی اور دوا کھانے کا وقت بھی لکھ دیا جائے۔ بعض مقامات پر معالجین کی سہولت کے لئے ایک کی بجائے دو یا زیادہ ادویات کا انتخاب ضروری سمجھا گیا ہے۔ اگر معالج ضروری سمجھے تو ایسی ادویات کو اول بدل کر دے سکتے ہیں ورنہ ان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر کے بھی بہتر نتائج حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

اس کتاب کی تالیف میں جہاں میرے اپنے تجربہ کا دخل ہے، وہاں ہومیو پیتھی کے بہت سے اساتذہ کے علم کا عمل دخل بھی ہے۔ میں نے جن اساتذہ کی کتب سے استفادہ حاصل کیا ہے ان کا اجتماعی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں پر ہومیو ڈاکٹر جناب ڈاکٹر خالد عزیز صاحب کا انتہائی مشکور ہوں، جنہوں نے اس کتاب کی تیاری میں میری رہنمائی فرمائی اور قیمتی مشوروں سے نوازا۔

میں اپنی بیٹی ارم احسن کا بھی ممنون ہوں جس نے اپنی مصروفیات کے باوجود اس کتاب کی تیاری میں میری مدد کی۔

اباسی

اتنی شدید جیسے جبر الگ ہو جائے گا

کھانے کے بعد

کھانے کے بعد گھنٹوں تک

اٹھنے کے فوراً بعد

ڈکاروں کے ساتھ - دن کے وقت

متواتر اباسیاں لینا

موڈ خراب اور اباسیاں

زوردار - جس سے جبرے کا اپنی جگہ سے

ہٹ جانے کا ڈر ہو

نیند کے بغیر متواتر اباسیاں

نیند کے بغیر - شام کے وقت متواتر اباسیاں

اپنڈی سائٹس

مرض کے شروع میں

شدید درد - ایک مقام سے دبانے سے سخت درد

قعر معدہ موت کا احساس

کاٹتے ہوئے اور چیرتے ہوئے دائیں طرف درد جبکہ

رشاکس 30

لائیکوپوڈیم 30

نکس دامیکا 30

نکس دامیکا 30

سلفر 30

کلکیریا فاس 6x

(کھانے کے بعد)

زکیم 30 - صبح

چائنا 30 - رات

رشاکس 30

ایکونائیٹ 30

آرنیکا 200

لائیکوپوڈیم 200 - رات

لیکیس 200 - صبح

آئرس ٹینکس 200

لیکیس 200

(ہر نصف گھنٹے بعد - صرف 4 خوراکیں)

بیلٹاؤنا IM

مرک کار 30

کالچیکم 200

ڈائیکوریا MT

(دوا گرم پانی میں استعمال کریں)

(ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو) سورائینم IM

(ہر ماہ کی 15 تاریخ کو) لائیو پوڈیم IM

کالوسنتھ 200

پیٹ پھولا ہوا ہو۔

پردہ اپنڈیکس میں سوزش 'ورد اور بخار

اپنڈیکس کے مقام پر کچلنے کا سادہ جبکہ

تکلیف رات کو زیادہ ہو۔

جب مریض کے لئے کھانے پینے کی چیز ناقابل برداشت ہو

متواتر درد، پیچھے جھکنے سے درد میں افادہ

بار بار حملہ سے بچاؤ کے لئے

کاٹنے والی شدید درد

ابھار

جسم پر بڑے گرمی ابھار

کریازوٹم 30 - صبح رات

(حساس مریضوں میں 200)

سورائینم 200

کریازوٹم 30

سینگونیریا 200

(رات کو)

تھوجا 200

سیکونٹا 200

سورائینم 200 (ہر جمعہ کو)

کھنی اور گھٹنے میں پچھلی طرف ابھار

کھٹل کے کاٹنے سے ابھار جبکہ رات کو

خارش زیادہ ہو

نوجوان عورت کے چہرے کے ابھار خصوصاً

جب حیض مقدار میں کم ہو

اعضائے تناسل پر ابھار

چہرے پر زرد رنگ کے ابھار

بستر کی گرمی سے تکلیف میں اضافہ مگر گرمی

میں افادہ اور سردی میں اضافہ

اپریشن

اپریشن کے بعد

شانی سیکریا 200 - صبح
(ایک ہفتہ کے لئے)

ایسے ٹک ایسڈ 3x

کاشی کم 30

کیمفر 1x - ہر پندرہ منٹ

بعد چند خوراکیں

اپریشن کرانے کے بعد کمزوری دور کرنے کیلئے

اپریشن کے بعد پیشاب میں رکاوٹ

اپریشن کے بعد ٹمپریچر کا گر جانا

اثرات

چائے پینے کی وجہ سے عصبی کمزوری

چائے بکثرت پینے کی وجہ سے مزمن خرابیاں

ڈر کے اثرات

چائنا 3x

تھوجا 200 (ہر جمعہ کو)

کالی کارب 200 - صبح

کالی فاس 200 - رات

کیمولٹا 30

کاربووٹیج 3x سے 200 تک

انگیشیا 200 (کھانے کے بعد)

کلکیریا فاس 200

کافی کے بد اثرات

کوئلہ اور گیس کے زہریلے اثرات

موت (کسی کی) کی وجہ سے بد اثرات

مایوسی کے بد اثرات

احتلام

بار بار احتلام

موٹے مریضوں میں احتلام

تھوجا 200 تک

کلکیریا کارب 30 - صبح، رات

ٹر یکسکم MT (ایک قطرہ فی خوراک)

نیرم فاس 6x

سیکیوٹی لیریا MT 6x

ڈیجی ٹلیس 3x

ڈاسکو ربا

انفلو انزیم 200 - بدھ اور جمعہ کو

جیلی میم 30 - صبح - رات

بیلا ڈونا 30 - کھانے سے پہلے

چائنا 6

آر سینکم 30 - کھانے سے پہلے

آرینکا 30 - کھانے کے بعد

گریفائٹس 30

ماربی لینم 200

پلساٹیل 200

تھوجا - سلفریا ویری او لینم 30 200

(کھانے سے پہلے)

آر سینکم 30 (کھانے کے بعد)

ڈیفیریا 200/30 (کھانے سے پہلے)

پلساٹیل 200 - رات

ڈروسرا 200 صبح

بیسی لینم 200

(ہفتہ میں ایک بار)

ہر دوسری رات کا احتلام

ہر رات کا احتلام

جب خدشہ ہو کہ احتلام کبھی درست نہیں ہوگا

کثرت احتلام

ایک رات میں ایک سے زائد دفعہ

احتیاطی علاج

انفلو انزا

بخار

پتہ کی درد یا پتہ کی پتھری

ٹائی فائیڈ

پھنسیاں

خرہ

خرہ (جرمن)

چچک

ڈیفیریا

کالی کھانسی

کروپ

فار سفورس 30- صبح، رات

پہلی مہینہ 200- ہر اتوار کو

اگیشیا 200

کالی بروما ٹیم 30- صبح

گلونا ٹین 30- رات کو

سلفر 200

طاعون

مرگی

ہیضہ

احساس

تھو جا 200

تھو جا 200- صبح

ایلو ز 30- صبح، رات

سلفر 30- صبح

ایلو ز 30- صبح، رات

تھو جا 200- صبح

کلکیریا کارب 30- صبح

نیٹرم میور 30- رات

تھو جا 200- صبح

سی سی فیوگا 30- رات

الگ ہونے کا احساس - اکیلا پن

اعضاء اور جسم کاشیشے کی مانند ہونے کا احساس

بھینگے پن کا احساس

پیٹ میں زندہ جانور کا احساس

پیٹ میں ہزاروں جانوروں کا احساس

روح کا جسم سے الگ ہونے کا احساس

ٹانگوں اور پاؤں کا ٹھنڈے اور نمدار ہونے کا احساس

کسی اجنبی کے پیچھے پیچھے آنے کا احساس

معدہ ڈوبنے کا احساس

اداسی

اداسی اور چڑچڑاپن

اداسی کی وجہ سے کمزوری

رونے کے بغیر اداسی

رونے کے ساتھ اداسی

اینٹی مونیم کروڈم 30- صبح، رات

ایسڈ فاس MT

نکس و امیکا 30 (کھانے کے بعد)

اگیشیا 200

(روزانہ ایک خوراک کچھ روز کیلئے)

ایڈی نائیڈز

حفظ ماتقدم

یوبرکولینم 200 (ہر جمعرات کو)

کلکیریا فاس 3x

سلفر 200 (4 روز بعد ایک خوراک)

کلکیریا کارب 30

کنزور بچوں میں جبکہ گھسٹے پیلے ہوں

چرچڑاپن - نہانا دھونانا پسند

بچے جن کا رجحان موٹاپے کی طرف ہو اور

سر پر پسینہ آتا ہو۔ (صبح، رات)

اسقاط حمل

پہلے، دوسرے، تیسرے ماہ میں رکاوٹ کے لئے

پانچویں سے نویں ہفتے تک رکاوٹ کے لئے

ایپس 200، کھانے سے پہلے

(ہر ہفتہ ایک خوراک)

کلکیریا فاس - کھانے سے پہلے

ایکینیشیا

(ہر منگل اور جمعہ کو)

دائی برنم آپولس MT

کالی کارب (اوپنچی طاقت میں)

سبائنا

سمی سی فیوگا 200

کالوفا ٹیلم 200

اسقاط کی طرف رجحان

ہمیشہ دوسرے ماہ میں اسقاط

ہمیشہ تیسرے ماہ میں اسقاط

عورتیں جو بائی کے درد میں مبتلا ہوں

رحم کی کنزوری کی وجہ سے اسقاط

اسہال

ایسا معلوم ہو کہ دست کسی وقت بھی آسکتا ہے

فاسفورس 30

ایلو ز 30 (رات یا بوقت ضرورت)

آر سینی کم 30

مرک سال 30 (ہر پاخانہ کے بعد)

اپیکاک 30

پوڈوفا نیلم 30

چائنا/کالی فاس (باری باری)

کالو سنتھ 200

دریٹرم البم 30

(ہر گھنٹہ بعد)

مرکیورس

نکس دامیکا 30

تھو جا (چند خوراکیں)

جیلی میم 30

ارجنیشم ٹائیٹرکیم 30

نکس دامیکا 30

دریٹرم البم 30

پوڈوفا نیلم 30

برائی اونیا 30

(کھانے سے پہلے)

ایلو ز 30- صبح

خاص طور پر ریاخ خارج کرتے وقت

بہت زیادہ پیاس، بے چینی درد اور جلن کے ساتھ

اگر سردی لگ جانے کی وجہ سے ہوں

پاخانے کا رنگ سبز زرد جبکہ مروڑا اور

درد ساتھ ہوں

پاخانے پانی جیسے درد یا بغیر درد کے

پر درد، شدید جبکہ مریض درد سے دھرا ہوا رہا ہو

پیٹ میں مروڑ، پانی کی طرح دست

جسم ٹھنڈا ہو جائے، ٹھنڈے پسینے

جکڑنے والی درد جو پاخانہ کے بعد بھی ختم نہ ہو

جکڑنے والی درد جو پاخانہ کے بعد ختم ہو جائے

چلتے چلتے تکلیف میں اضافہ

خوف یا ڈر کی وجہ سے اسہال

(امتحان یا تقریر کرنے کا)

زرد رنگ کے اسہال جو بعد میں رنگ بدل

کر سبز ہو جائیں

زیادہ کھانے کے بعد اور بار بار ہونے کے باوجود

یہ احساس کہ پاخانہ ابھی تک باقی ہے۔

درد کے ساتھ اسہال

بغیر درد کے اسہال

کمر کے بل لیٹنے پر افادہ اور بیٹھنے پر

تکلیف میں اضافہ

کھانے کے فوراً بعد تکلیف میں اضافہ

پوڈوفا - 30 - رات
سلفر 30
کروٹن ٹنگ 30

کھڑے ہونے پر تکلیف میں اضافہ
زرد رنگ کے پانی کی طرح اسہال جو
پچکاری کی طرح خارش ہوں۔

پہلٹا 30

مرغن غذا کے بعد اسہال۔ کوئی بھی دوا پانے
ایک طرح کے نہ ہوں۔ پیٹ میں گڑگڑاہٹ

آر سی کم 3x

ناموافق غذا کی وجہ سے اسہال اور نقاہت
ہرپاخانہ کے بعد کمزوری سے لڑکھڑانا

ایلو 3x 30

(نوٹ: اسہال کی حالت میں دوا کو اکثر ہر گھنٹہ بعد دہرانا چاہئے اور آرام کی صورت میں دوا فوراً
بند کر دی جانی چاہئے)

پائرو جی نم 200 رات
سورائینم 200 صبح

متعفن دست

اطراف

بائیں طرف سخت درد جبکہ تلی بڑھی ہوئی ہو

سینتھس 30 صبح رات
پہلٹا 30 صبح رات

نازک لڑکیوں کو بائیں طرف درد یا کمزوری

کالی کارب 200

لڑکیوں کو بائیں طرف کی درد جبکہ حیض بے قاعدہ ہوں

انا کارڈیم - رات
سلیشیا - صبح

اعتماد

اعتماد کا فقدان

اعصابی درد

حفظ ماتقدم

درد جبکہ مریض بے سکون ہو

کالی فاس 200

کالی فاس 200 صبح

مگنیشیا فاس 200 رات

کالسیا 30 (کھانے سے پہلے)

جو ہر روز دوپہر اور شام کو ہو، گردن کے پٹھوں سے

شروع ہو کر نیچے تک جائے

چیلینڈونیم 30، 200

کیستھر س 30 (کھانے سے پہلے)

دائیں آنکھ کے اندر یا اوپر اعصابی درد

سر اور چہرے کا اعصابی درد جو سردی لگنے

سے واقع ہو، اعضاء میں جھٹکے

کالی فاس 200 (4 روز بعد ایک خوراک)

غیر معمولی فکر کی وجہ سے اعصابی درد

ناجا 30

رحم میں سخت اعصابی درد جبکہ سوزش اور سوجن نہ ہو

شانی سیگریا 30

کندھوں اور بازوؤں میں اعصابی درد

کالوستھ 200

جب اعصابی درد کو دبانے اور ٹکڑے سے آرام آتا ہو

پلائینگلو 200 - صبح

جب کوئی دوا کارگر نہ ہو

کالی فاس 200 - رات

اعصابی کمزوری

ہر قسم کی اعصابی کمزوری جب علامات واضح نہ ہو

کالی فاس 200 - صبح

مگنیشیا فاس 200 - رات

(سات دن کے لئے)

(دو سہ ہفتہ)

کلکیریا فاس 200 - صبح

نیٹرم فاس 200 - رات

(سات دن کے لئے)

تیسرا ہفتہ

فیرم فاس 200 - صبح

(سات دن کے لئے)

جن سنگ MT ایسڈ فاس MT اور

ایونیا سائیو MT کے لگاتار استعمال سے

اعصابی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔

اعصابی ورم

اعصابی ورم جب ہاتھ اور بازو سن ہو جاتے ہوں

تازہ مرض کے بعد اعصابی ورم

جب سونے کے بعد تکلیف میں اضافہ ہو

جب ورم کی وجہ سردی ہو۔ مختلف تکالیف میں

سخت درد ہو۔

کالی فاس 200 - کھانے سے پہلے

سلفر 200 - کھانے سے پہلے

آر سینکم 30 - رات

لیکیس 200 - صبح

آر سینی کم 30 - کھانے کے بعد

اعضاء

اعضاء کا سوجانا خصوصاً حاملہ عورتوں میں

رشاکس 30 - صبح

فاسفورس 30 - رات

کاکولس انڈیکا 30 صبح، رات

اکیلاپن

جب اکیلاپن سے تکلیف میں اضافہ ہو

فاسفورس سٹرامونیم 30

جب اکیلا پن سے تکلیف میں افادہ ہو

بریشا کارب IM 200

اگزیمیا

اگزیمیا کی خارش خصوصاً "اعضاء تناسل پر

گرمی میں بہتر سردی میں بدتر

کروٹن 30

پٹرو لیم 200 - صبح

سلیشیا 1000، ہر ماہ ایک

خوراک کم از کم تین ماہ

سکوٹیا 200

گریفائٹس 30

ڈالی کس 200

فارمک ایسڈ 30

سورائینم 200، آر سینی کم 200

سر کا اگزیمیا

مقعد کا اگزیمیا

ذیابیطس کے مریض کا اگزیمیا

اگزیمیا جب تکلیف گرمیوں میں ظاہر ہو

کھنی اور گھٹنے کے جوڑ میں جو گرمی میں بہتر

ہو مگر سردی میں عود کر آئے

اگزیمیا کے بعد دمہ اور دمہ کے بعد اگزیمیا

سکروٹم کا اگزیمیا

درد اور جلن کے ساتھ

خون صاف کرنے کے لئے

مزمن اگزیمیا جو کئی سالوں سے ہو

رستا ہوا اگزیمیا

ہاتھ کے پیچھے اگزیمیا

ہاتھوں اور انگلیوں پر

ناک اور ہونٹوں پر

تھوجا 200

کروٹم ٹنگ لیم 30 - صبح

رٹاکس 200

اگنیشیا MT، گن پاؤڈر 3x

نیسلیم 200

گریفائٹس 1000

بووشا 30

مرکیورس IM 200

ایلو مینا 30 - صبح

کالی کارب 30 - رات

(نوٹ: آگزیما کے تمام کیسوں میں سلفر IM ہر ماہ اور آرٹھیکا پورنس 200 ہر ہفتے بطور درمیانی دوا کے استعمال کریں۔ ٹوبرکولینم اور سفلیئم 200 یا اونچی طاقتیں بھی انتہائی مفید ہیں)

الیومن

فیزلس MT- کھانے کے بعد

ٹیری بن تھم 6x

آر سینی کم 30

آپوساٹم 30

لائیکوپوڈیم 30

ایسڈ فاس 3x

ہیلونائس 30- صبح رات

ایسڈ فاس MT

پیشاب میں الیومن جب الیومن کے

ساتھ خون بھی ہو

جب الیومن کے ساتھ بدن کے کسی حصے میں سوزش

ہو اور پانی پڑا ہوا ہو۔

جب اس کی وجہ بد ہضمی اور نامردی ہو۔ پیشاب مقدار

میں کم ہو۔ ایک پاؤں گرم دوسرا سرد

جب الیومن عصبی اکساہٹ، حس

کی وجہ سے ہو

تپ دق کے دوران یا اس کے بعد الیومن

الرجی

فیرم میٹ 30

سلفر 200- صبح

نکس و امیکا 200- رات

(چند خوارکیں)

یوفرزیا 30

انڈے سے الرجی

انٹی بائیوٹک ادویات کھانے سے الرجی

بہار میں الرجی جب آنکھوں اور

ناک سے پانی بہت زیادہ آتا ہو

آر سینی کم 30

سلفر 200 صبح

جسم میں الرجی جب ٹھنڈک سے تکلیف میں اضافہ ہو

جسم میں الرجی کا ہونا جب وجہ معلوم نہ ہو

چینی سے الرجی

پھولوں سے الرجی

دودھ سے الرجی

گندم سے الرجی جس سے اگزیم ہو جائے

مچھلی سے الرجی

سکرم ایم ٹی

پیرو سیلیم 200

ارٹیکا یورلس MT

سورائینم 200

گریفٹائٹس 200

الر

معدے کا الر

نکس و امیکا 200 رات

سلفر 200 - صبح

کاربووٹیج 200 - دوپہر

(ار جنٹم نائٹرکیم 200) (کم از کم چھ ہفتے)

آر سینی کم 30

لیکیس 200

الر میں آگ کی طرح جلن - نیند میں بھی درد

بہت زیادہ خون کا اخراج - نیلگوں، ارغوانی کنارے

الکو حل

چھاتی کی شکایات پیدا کرے

معدہ میں درد پیدا کرے

شراب کی خواہش

شراب کی خواہش اور بھوک کا فقدان

انٹی مونیم ٹارٹ - کھانے کے بعد

آر سینی کم 30 - کھانے کے بعد

لیڈم پال 3x - کھانے کے بعد

نکس و امیکا 200 - رات

امتحان

امتحان کا ڈر اور

امتحان سے پہلے گھبراہٹ

اناکارڈیم 30 - صبح

ار جنٹم نائٹرک 30 - رات

جب بچے امتحان کے متعلق زیادہ سوچیں
 سکول کے امتحان میں اعصابی پریشانی
 کمرہ امتحان میں جانے کا ڈر

جیلی میم 30
 سیٹیا 30
 ار جسم ٹائٹرک 30
 (ایک خوراک کمرہ امتحان میں جانے

سے پہلے)

انتقال مرض

ایک مرض کے دہنے سے دوسرا مرض لاحق ہو جائے
 ایک علامت غائب ہو کر دوسری علامات نمودار ہو جائے
 علامات کی تبدیلی

ابرا ٹیم 200
 پلمیم 200
 پلٹا 200

اندام نہانی

خارش جبکہ فرج خشک ہو اور مریض بے آرام ہو
 شام کے وقت خارش - خارش جس سے سوجن ہو جائے
 اندام نہانی کی اینٹھن

کریازوٹم 200 کھانے کے بعد
 ایلومینا 30 - کھانے سے پہلے
 کریازوٹم 200
 پلمیم 6x
 ایلومینا 30

اندھاپن

موتیا کی وجہ سے

سیٹیا 200 - صبح رات
 (ہر تین دن بعد)
 جیلی میم 200
 چھ خوراکیں ہر گھنٹے بعد
 لائیو پوڈیم 200

اچانک

رات کو

جس کی وجہ روشنی ہو

بیلڈونا 200 صبح - رات
فاسفورس 200

اندھراتا

شب کوری

فائی سو سنگلما MT

انفلو سنزہ

حفظ ماتقدم

آر سینی کم 30 یا انفلو انزیم 200
بیٹیشیا 30x3

تمام جسم میں دکھن سر اور آنکھوں میں درد
بے آرامی اور غنودگی

یوپی ٹوریم پرف 200
جیلی میم 200
برائی اونیا 30x3

جب درد ہڈیوں میں نمایاں ہو
ریڑھ کی ہڈی کے ارد گرد درد - پیاس ندارد
انتہائی کمزوری - پیاس زیادہ - حرکت سے
تکلیف میں اضافہ

آر سینی کم 30x3
(ہر گھنٹے بعد)

سر میں درد، پیاس بار بار مگر پانی گھونٹ
گھونٹ پیئے

سپائی جیلیا 30
سباڈلا 30
رشاکس 30

مریض بائیں طرف نہ لیٹ سکے - دل پر درد
چھینکیں بہت زیادہ، تمام جسم میں زیادہ درد
کروٹ لینے سے درد

سورائینم 200x30 صبح
ٹوبر کو لینم 200 ہر جمعہ کو

انفلو سنزہ کے بعد کمزوری

میگنیشیا میور 3x
انٹی مو نیم ٹارٹ 1000

جب ذائقہ اور سو گھنے کی طاقت ختم ہو جائے
بروٹکو نمونیہ

آرسنک البم 10M

(تین دنوں تک دن میں دو مرتبہ)

انگلی (انگلیاں)

بھدی، انگوٹھا نما

فاسفورس 30- صبح

اگیریکس 30- رات

انٹی مونیم ٹارٹ 200

کلکیریا کارب 30 صبح

لیڈم پال 30- رات

سلیشیا 30، صبح- رات

کالوفانیلم 200- صبح

لیڈم پال 200- رات

روٹا 200- نیٹرم سلف 200

اتنی ٹھنڈی جیسے بے جان

کشارہ، سخت، اتنی سخت کہ موڑی نہ جاسکیں۔ اینٹھن

انگلیاں سو جائیں

انگلیوں میں بے طاقتی

انگلیوں کے جوڑوں میں درد

وقفے وقفے سے سکڑن

انگلی کے پور

جلن دار درد، سن ہو جائیں

ٹھنڈک محسوس ہو۔ نوکیں ٹھنڈی ہو جائیں

خشک، سخت، زرد داغ، بخ بستہ مکمل بے حس

سن ہو جائیں

سن ہو جائیں جب تکلیف صبح زیادہ ہو

ایسا معلوم جو جیسے انگلیاں کانغذ کی بنی ہوئی ہوں

کالی کارب 30

انٹی مونیم ٹارٹ 30- صبح

ٹیرک سیکم 30- شام

لیکیس 200- صبح

لیڈم پال 200- رات

ارجنٹم نائٹرک 200

لیکیس 30

سلیشیا 30

انٹی مونیم ٹارٹ 30
نیٹرم سلف 30

انگلیوں میں لرزہ

انگلی کے ناخن

بھر بھرے

گریفائٹس 200

بربرس 200 - صبح

نیٹرم سلف 30

انٹی مونیم کروڈم 30

سلیشیا 30

کوچھکم 200

ناخن کے نیچے اعصابی درد

ناخن کے نیچے درد جس کے ساتھ زخم بھی ہو

ناخن کا ٹوٹنا اور بدو وضع ہو جانا

ناخنوں میں سرسراہٹ

اینٹھن

خصوصاً "پنڈلیوں میں"

کیوپرم میٹ IM

رشاکس 200

سلفر 200 کبھی کبھی

کلکیریا کارب 30

کلکیریا کارب 30

کیوپرم میٹ 30

کیمفر 30

پاؤں یا ہاتھ میں

معمولی کام کرنے سے ہاتھوں میں درد اور کھچاؤ

پر درد اور بیرونی حصوں میں ٹھنڈک

دیکھئے "ہرنیا"

آنت اترنا

آنکھیں

آنکھ کے اوپر پھنسی

آنکھ کی پتلی (نڑگاں) اندر کی طرح افزائش

آنکھیں سرخ، پانی کا اخراج بہت زیادہ

آنکھوں سے جلن دار پانی کا اخراج

آنکھوں میں جلن، آگ کی طرح

شد کی مکھی کے کاٹنے جیسی جلن

آنکھوں میں سوزش، گرمی سے افاتہ

آنکھوں میں سوزش، خشک گرمی سے افاتہ

آنکھوں کا موتیا بند

آنکھ کھانا

آنکھوں کے گرد نیلے دائرے

پپوٹوں کی سوجن

ٹھنڈے پانی سے دھونے سے افاتہ

گرم پانی سے دھونے سے افاتہ

چوٹ کی وجہ سے درد

پپوٹوں کا نیچے لٹک جانا

دائیں آنکھ میں درد

بائیں آنکھ میں درد

روہوں میں کچھ زیادہ بہتا ہو

سٹیفنی سیگریا 200-رات کو

بوریکس

لائیکوپوڈیم 30

یوفرزیا 30

آر سینی کم 30

ایپس 30

تھوجا 30

آر سینی کم 30

زکم سلف CM

کلکیریا فلور 200

(نیز دیکھئے موتیا بند)

آرنیکا 30-صبح

لیڈم پال-30 رات

اینٹی مونیم ٹارٹ-30

گریفائٹس 30 (کھانے سے پہلے)

ہیٹلا 30 (کھانے کے بعد)

آر سینی کم 30 (کھانے کے بعد)

سمفائٹم 200

جیلی میم 200

آئیوڈین 30

کالی آئیوڈائیڈ 30

ار جنٹم نائٹرکیم 200

آنسو

آنسو بہت زیادہ

کلکیر یا کارب 30، صبح - رات

آواز

آواز کا بالکل ختم ہو جانا

لیکیسس 200

بولتے وقت گلے میں درد

بیلاڈونا 30، فاسفورس 30

جب آلات صوت میں فالج ہو جائے

فاسفورس 30

جب آواز بیٹھنے کا مرض مزمن کیفیت اختیار کر جائے

کاربوریج 30 - رات

پیرسلف 30 - صبح

کھانسنے یا زور سے پڑھنے کے بعد گلے میں جلن

کلکیریا فلور 30 - صبح، رات

گلا صاف کرنے کے لئے متواتر کھنکھناہٹ

کلکیریا فاس - کھانے کے بعد

ایڑی

ایڑیاں درد کریں اور ان میں چنڈیاں پڑ جائیں

اینٹی مونیم کروڈم 30

ایڑیوں پر چنڈیاں پڑ جائیں، انگلیوں اور پاؤں کی انگلیوں پر چمڑہ سخت ہو جائے

نیرم میور 30 - صبح

کاشی کم 30 - رات

ایڑیوں میں شدید درد ہو کھڑے ہوتے وقت بائیں ایڑی میں چھن پڑتی ہو

ایس کولس ہپ 3

(ہر چار گھنٹے بعد)

پاؤں میں مروڑنے کا سادرد جو ہر چار گھنٹے بعد ہو۔ تلوے اور انگلیوں بھی درد کریں

کاچیکم 3x

جب جوتی کی رگڑ سے ایڑیوں میں زخم ہو جائیں

ایلیٹم سیپا 30

جب بائیں ایڑی اور بڑی رگ میں درد ہو

کاشی کم 3x

(ہر چار گھنٹے بعد)

کھڑے ہوتے وقت ایسا درد کہ ایڑی زخمی ہوئی ہو }

برس 2x

(ہر چار گھنٹے بعد)

سائیکلیمن - صبح، رات

ہڈیوں میں دکھن، بیٹھنے یا کھڑے ہونے پر تکلیف
زیادہ مگر چلتے وقت دکھن غائب }

آہیں

نیٹرم فاس 6x

جب حیض کے دوران مریضہ لمبے لمبے سانس
لینے کی خواہش کرے اور آہیں بھرے }

اگنیشیا 30

جب مریض رونے اور چلانے کے بعد دیر تک
سکیاں بھرتا رہے }

اوپیم 3

جب دیر تک مریض کا آہوں کی طرح تنفس چلتا رہے

ب

بازو

فالٹی ٹوکا 200 (کھانے سے پہلے)

رشاکس 200 - صبح

کسی سی فیوگا 200 - رات

دائیں بازو کا سن ہو جانا

بائیں بازو کا سن ہو جانا }

بال

کالی کارب 30، گریفائنس 200

کالی کارب 30 - صبح

اولینڈر 30 - رات

گریفائنس 200 (ہر جمعہ کو)

بالوں کا گرنا جبکہ خشکی زیادہ ہو

بہت زیادہ خشکی }

بالوں کا گرنا جبکہ خشکی زیادہ

(پرانے درد سر کی وجہ سے)

بال گرنا (ڈپریشن کی وجہ سے)

بال گرنا (ڈیوری کے بعد)

بال گرنا (کنگھی کرنے یا ہاتھ پھیرنے سے)

بال گرنا (بوجہ کمزوری و بد اثرات)

بال گرنا (سر کی علالت کے بعد)

بال گرنا (وقت سے پہلے)

داڑھی اور مونچھوں کا بال چ

بالوں کا سفید ہو جانا

چہرے پر بال

بچہ

افزائش ٹھیک نہ ہو، ہر بات کا سمجھنا مشکل ہو

ایک گل گرم دو سر اٹھنا

سپیا 30

فاسفورک ایسڈ 1x

سپیا 30- صبح

لائیکو پوڈیم 30- رات

ہیٹلا 30، صبح

فاسفورک ایسڈ 30

میسلی نم 200

ایسڈ فاس 6x

فلورک ایسڈ 200

ایسڈ فاس 30

لائیکو پوڈیم 30

(اول بدل کر دیں۔ اگر تین ماہ میں

میں فائدہ نہ ہو تو IM میں اول بدل کر دیں)

ایپس 30

گریفائٹس 1000

(رات کو سوتے وقت ہر منگل کو)

ٹوبر کو لیم 200، ہر جمعہ کو

سفلیم 200- ہر منگل کو

کیمو ملا 3x

بغیر کسی وجہ کے دوسرے بچوں کے ساتھ
گستاشی سے پیش آئے۔ بہت زیادہ شرارتی

ٹوبر کو لیم 30- ڈائیلوشن

(ہر ہفتہ ایک خوراک دو ماہ تک۔ اس کے
بعد بھی حسب ضرورت استعمال کریں)

بہت زیادہ شرارتی، کپڑوں کو اٹھا پھینکے

بولنا اور چلنا دیر سے سیکھے

پہلی نیند میں پیشاب کر دے

جو زیادہ نہانا پسند کرے

جو عموماً "نہانا پسند نہ کرے

جس کا قد چھوٹا ہو

جسے دودھ پسند نہ ہو

چاہتا ہے کہ اسے اٹھایا جائے

چاہتا ہے کہ اسے جلدی اٹھایا جائے

جتنے (غصے میں)

دیر سے بولنا سیکھے

دانت بھینچنے کی عادت

سارا دن روتا ہے مگر رات آرام سے گزارتا ہے

سارا دن بالکل ٹھیک رہتا ہے جبکہ

ساری رات روتا رہتا ہے

شام کو چڑچڑاہو جاتا ہے

صرف اس وقت روتا ہے جب اسے اٹھایا جائے

صرف اس وقت خاموش ہوتا ہے جب اسے اٹھایا جائے

گہری نیند میں پیشاب کر دے

نیند میں ڈر جائے اور اٹھ جائے

نیرم میور 30

سپیا 30، کھانے کے بعد

پہلٹا

سلفر

کلکیریا فاس 200 ہر جمعہ کو

کلکیریا کارب (ہفتہ میں ایک خوراک)

پہلٹا۔ صبح

آر سینی کم 30

کیمو ملا 3x

اگیریکس

فاسٹولا کا 3x

لائیکوپوڈیم۔ صبح

سورائینم۔ صبح

زنم۔ صبح

برائی اونیا۔ صبح

کیمو ملا۔ صبح

بیلڈونا 30 (کھانے کے بعد)

ایتھوزا 30

نوزائیدہ بچوں کا یرقان

سر پر پیسنہ ہو

ایلیٹریم 3

برا ٹاکارب 30- صبح

سٹرامونیم 30- رات

بخار

پسینہ بہت زیادہ مگر درجہ حرارت کا کم نہ ہونا

مرکیورس 30

پاس بہت زیادہ مگر ہونٹ خشک

برائی اونیا 30

پاس بہت زیادہ، جلد خشک، مریض کروٹیں بدلتا رہے

آر سینی کم 30

پاس زیادہ مگر پانی گھونٹ گھونٹ پیئے

یوپی ٹوریم پرف 30

تکلیف میں زیادتی 7 سے 9 بجے کے دوران

نیٹرم میور 30

10 اور 11 بجے کے دوران

ایپس 30

1 اور 2 بجے کے دوران (دوپہر)

ایپس 30

3 بجے

لائیکو پوڈیم 30

4 اور 8 بجے کے دوران

ٹوبرکولی نم 200

6 اور 7 بجے کے دوران

سپانجیا 30

11 بجے رات

1 بجے سے 2 بجے کے دوران (رات) آر سینی کم

سڈرن 3x

روزانہ کسی خاص وقت

یوپی ٹوریم پرف

دوپہر سے پہلے

نیٹرم میور

ایپس 30

لائیکو پوڈیم 30

ٹوبرکولی نم

دوپہر کے بعد

شام کو

چائنا	ہر دو سرے روز
اناکارڈیم 30	درجہ حرارت بڑھتا ہی جائے
اناکارڈیم	درجہ حرارت رات کو بڑھ جائے
وریترم البم 30	جب پیشانی پر بہت پسینہ آئے
برائی اونیا 30	جب سارے جسم پر بہت زیادہ پسینہ آئے
کیمولا 30	جب سر پسینہ سے بھر جائے
جیلیسیم 30	جب غنودگی اور سستی نمایاں ہو
پوڈوفا نیلم 30	بخار کی حالت میں بکواس کرنا
بوو شا 200- صبح	بخار جس کی وجہ کا پتہ نہ چلے
پائیروجی نم 200- رات	
(ہفتہ میں ایک بار)	

اسٹونیا MT	بخار کے بعد کمزوری دور کرنے کے لئے خصوصاً "ملیریا"
ایکونائیٹ 30	بخار شدید، شدید خوف، شدید پیاس
بیلادونا 30	سرگرم، چہرہ سرخ، پاؤں ٹھنڈے، تیند میں جھٹکے
	بستر سے کود پڑنا
ہلٹا	مریض کا ہونٹوں پر زبان پھیرنا مگر پانی پینے سے انکار
ہلٹا 30	منہ خشک، پیاس غائب

بد ہضمی

فیرم فاس 6x	درد کے ساتھ اور چہرہ گرم
کلکیریافاس 6x	
اینٹی مونیم کروڈم صبح- رات	اعتدال سے زیادہ کھانے کی وجہ سے
کاربوووج 3x بتدریج طاقت بڑھائیں	جب بد ہضمی کی وجہ سے مریض کئی گھنٹوں

تک سونہ سکتا ہو

جب متلی بہت زیادہ ہو

جلن ہو اور منہ کا زائقہ کڑوا ہو منہ میں پانی آجائے

چمکدار خون کے ساتھ

سیاہ خون کے ساتھ

حاد یا مزمن

کھانے سے افاتہ کھانا کھانے کے تقریباً 3 گھنٹے بعد درد

گوشت پھل یا سبزیوں کے استعمال کے بعد

زیادہ آئیس کریم یا ٹھنڈی اشیاء کھانے سے

میٹھی اشیاء کھانے کی وجہ سے

مریض کھانا صرف ٹھنڈا کر کے کھا سکتا ہو

جب نشاستہ دار اشیاء کا استعمال زیادہ کرے

نشاستہ دار شے صفر پیدا کرے

معدہ میں پتھر کا احساس

برف

برف کا زخم

برف والی مشروبات کی خواہش

برص

عام طور پر

اپنی کاک 30

سلفر 200 صبح۔ رات

اپنی کاک 200 صبح۔ رات

ہما میل 30

نکس و امیکا 30

انا کارڈیم صبح۔ رات

آر سینی کم 30 صبح

پہلٹا 30 رات

پہلٹا 30 کبھی کبھی IM

اینٹی مونیم کروڈم 30 صبح

فانسورس صبح

اگنیشیا رات

نیرم فاس صبح

پہلٹا رات

نیرم فاس صبح۔ رات

برائی اونیا صبح رات

ایگریکس یا نیرم میور

نیرم فاس صبح۔ رات

ٹیوبرکولی نم IM

ط

آر سینی کم سلفیور یٹم فلیوم اوپچی طاقت

لیکبس 200

گریفائٹس 200

لائیکوپوڈیم 30

فاسفورس 30

جب نیلے داغ پڑ جائیں

زخم کے پرانے نشان

جلد پر سواری داغ

جب خون رسے

برانکائیٹس

بچوں میں برانکائیٹس نمونیہ

7 بلغم تاردار، چھاتی اور کھانسی خشک ہو

مکررات کوئندار اور متلی

بوڑھے لوگوں میں

7 بوڑھے لوگوں میں بہت زیادہ بلغم جس کو

خارج کرنے میں دقت ہو۔

بوڑھے لوگوں میں مزمن بروئکائیٹس

کمزوری کی وجہ سے بلغم نکالنا مشکل

پہلے درجہ میں جبکہ سردی محسوس ہو اور

بخار ہو اور تنگ کرنے والی کھانسی ہو

اینٹی مونیم ٹارٹ

اپی کاک 30

کاربووٹج 30، صبح۔ رات

سینگا

امونیم کارب

(ہر گھنٹہ بعد)

ایکونائٹ

(ہر گھنٹہ بعد) اس کے بعد

برائی اونیا

(ہر تین گھنٹہ بعد)

بیسی لی نم 200 (ہر ہفتہ)

برائی اونیا

تکلیف دہ خشک کھانسی، جب چھاتی دبانے سے

ورد میں اضافہ ہو، گرم کمرے میں داخل ہونے پر

کھانسی میں اضافہ

دائیں • ہسپرٹے میں تکلیف زیادہ	لائیکوپوڈیم
سر درد جبکہ چہرہ سرخ ہو، چھاتی میں درد محسوس ہو	بیلادونا 30
ہلکا بخار، ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے، مریض کو	اینٹی مونیم ٹارٹ
بلغم خارج کرتے وقت دقت جبکہ گلے اور چھاتی	
میں کھڑکھڑانے کی آواز آئے	
آواز بھاری، حلق میں کھردراپن، بالخصوص	کاشی کم 30 صبح
صبح کے وقت	
آواز بھاری، حلق میں خراش، شدید خراشدار	فاسفورس 30 رات
کھانسی خصوصاً "رات کے وقت زیادہ"	مرکیورس 30
دائیں جانب لیٹنے سے کھانسی زیادہ	
آواز بھاری بوجہ کھڑکھڑانے بلغم، جب بلغم خارج	کیمولا 30
ہو تو گلے میں خراش	
آواز بالکل بند ہو جائے، حنجرہ میں درد اس قدر کہ	فاسفورس 30
کہ مریض بات نہ کر سکے۔ جھاگ دار بلغم	
پیلی، سرخ یا زنگاری رنگ کی رطوبت کا اخراج	
برنگائی نالیوں میں بلغم بہت جمع ہو جائے جس کی	اینٹی مونیم ٹارٹ 30
وجہ سے سانس لینا مشکل ہو	
بدبودار بلغم کا اخراج	مرکیورس 30
حفظ ماتقدم موسم خزاں	کلکیریا کارب 200
حفظ ماتقدم موسم گرما	سلفر 200
(اگر مریض مرد ہو تو اسے داڑھی رکھنے کے لئے کہا جائے، کیونکہ اس سے آلات تنفس حرارت کی	
کمی بیشی سے متاثر نہیں ہوتے)	

کھانسی کے ہمراہ لیس وار بلغم جو پاؤں تک لمبا سا تار
 ہو کر گرے، کھانسی لمبے دوروں سے آئے

کھانسی خشک، رات کو بستر میں آئے، حلق میں خراش
 اور خشکی۔ گرم کمرے میں بھی سردی لگے

کھانسی سرد کمرے سے گرم کمرے میں
 جانے سے زیادہ ہو

برائی لونیا 3x

فاسفورس 30

کاربوونک 3x

گرم کمرے سے سرد کمرے میں جانے سے زیادہ ہو

شدید خراش ہو اور گلابیٹھ جائے بالخصوص شام کو

بستر

آرنیکا 30

پٹھیا MT (بعد میں) 200

لیکیس 30

بستر کے زخم چوڑوں پر

بستر کے زخم تپ دق میں

بستر کے زخم جن کا رنگ سیاہ پیلا ہو

بلڈ پریشر

برائیشامیور

انڈر لین 200 یا

گلوٹائن یا کریٹینکس

اگنیشیا 30

آرم میٹ

برٹیشامیور 3x (ٹریچوریشن میں)

کونیم 200

بوڑھے لوگوں کا ہائی بلڈ پریشر

جب علامات واضح نہ ہوں

جب وجہ کسی کی موت، کسی کا غم یا فکر ہو

جب مریض بہت حساس ہو

جب سٹالک اور ڈائیسٹالک پریشر میں

40-50 سے زیادہ فرق ہو

جب ذرا سی حرکت سے چکر آئیں

جب مریض کمزور ہوتا چلا جاتا ہو

ٹوبرکولی نم 200 (صرف تین خوراکیں)

(ہر ہفتہ ایک خوراک)

جب گرمی اور دھوپ میں تکلیف میں اضافہ ہو جائے

پیشانی میں درد، ایسا معلوم ہو جیسے سر بڑا ہو گیا ہو

گلوٹائن 30 اور اوپر کی طاقتیں

جب مریض کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو

برٹیا کارب 30

حاویس میں

بیلڈوٹا 30

(ہر آدھ گھنٹہ بعد)

عام طور پر ہائی بلڈ پریشر کے لئے

فیرم فاس، صبح

ایکونائٹ، رات

کیکیٹس

لو بلڈ پریشر

چند قطرے ہر گھنٹہ بعد)

لو بلڈ پریشر نارمل رکھنے کے لئے

ایمیر 200 دن میں دو دفعہ

وسکم البم 200

کیکیٹس 200، اس دن

اوپر والی ادویات نہ دی جائیں

کریٹیکس 10 قطرے

لائیکوپوڈیم 30

لو بلڈ پریشر جب پیٹ میں گیس بھی ہو

لو بلڈ پریشر جب کہ بہت زیادہ حیض ہوا ہو

کاربووتج 3x سے 30

لیکیس 1M

بلڈ پریشر (ہر قسم) کے لئے اکسیر دوا

بلغم

کالی بانسکروم صبح، رات

اخراج زرد، گاڑھا، ڈوری دار،

بعض اوقات نکلنا مشکل ہو

اخراج سفید، دُوری دار،

بعض اوقات نکالنے میں مشکل ہو

کالی میو 200 صبح

اینٹی مونیم ٹارٹ 200 رات

(ایک دن چھوڑ کر ایک دوا دیں)

سینگونیریا 30 صبح

فاسٹولا کا 30 رات

اینٹی مونیم ٹارٹ 200

بلغم موٹی زرد، لیس دار، بیٹھا ذائقہ، بلغم میں خونی مواد

چھاتی میں بلغم کا اجتماع

بانجھ پن

جب بہت گاڑھا، زرد، بدبودار اخراج ہو

جب مجامعت کے بعد منی کا اخراج ہو

عورتوں کا

نیٹرم کارب 30

نیٹرم کارب 30

کینتھرس، صبح، رات

(ہر جمعہ کو اونچی طاقت)

فاسفورس۔ صبح، رات

(ہر جمعہ کو اونچی طاقت)

مردوں کا

بو

جسم سے بہت زیادہ بو آئے

سلفر 200 یا

سورائینم 200

پائیدوجی نم 200 (کھانے کے بعد)

جسم، زخم اور پاخانہ کی گندی بو وغیرہ

بوسہ

مریض ہر کسی کا بوسہ لینا چاہیے

ایگر یکس 30

بھوک

بہت زیادہ بھوک مگر تسلی بخش طریقہ سے کھانہ سکے

بھوک ندارد نہایت کمزوری

بھوک ہر وقت

بھوک کا مکمل طور پر فقدان

لیکس

ایسے ٹک ایسڈ 30

سیلی نم 200 (کھانے سے پہلے)

تھو جا 200 ہر تیسرے دن (چند خوراکیں)

آئیوڈیم 3x کھانے سے نصف گھنٹہ پہلے

(ابلے ہوئے پانی میں)

جنتیانہ MT

سلفر 30

سائٹا 30

فاسفورس

پروٹس سپائی نو سا

لائیکوپوڈیم 30

بھوک کا فقدان (بیماری کے بعد)

بھوک 11 بجے لگے

بھوک بچے کو لگے مگر کوئی چیز دینے پر اسے پھینک دے

کھانے کے لئے رات کو اٹھنا پڑے

چند لقمے کھانے کے بعد ایسا محسوس ہو، جیسے

بہت زیادہ کھالیا ہو

مریض 3 اور 4 کے درمیان نہ کھائے

تو کمزوری کا احساس ہو

مریض نہ کھا سکے نہ پی سکے

بھوک کی کمی، بد ہضمی کی وجہ سے

بھوک، کھانے کے فوراً بعد

بھوک بہت لگے مگر کھانے کو جی نہ چاہے

بھوک ٹھنڈی خوراک کی

بھوک غائب، کھانا دیکھتے ہی

بھوک آدھی رات کو

آئیوڈیم 30

اگنیشیا 200 (ایک خوراک ہر تین روز بعد)

ٹکس و امیکا 30 (کھانے کے بعد)

چائٹا 30 صبح-رات

رشاکس 30-صبح، رات

سلیشیا 30-روزانہ ایک خوراک

سلفر 200 صبح نہار منہ (کبھی کبھی)

اگنیشیا صبح

چائنا رات

نیٹرم میور۔ صبح، رات
کلکیریا فاس (کھانے سے پہلے)
رشا کس 30۔ صبح، رات
سلفر 30 صبح

سمی سی فیوگا۔ رات
آیوڈین 30۔ صبح، رات
کلکیریا کارب 200
(ہر تیسرے روز ایک خوراک)

سباڈلا 30، صبح۔ رات
اگنیشیا۔ صبح، رات
چائنا MT

جنشیا نہ کوئن فلور MT
(کھانے سے پہلے 10 قطرے ملا کر دیں)
ہائیڈروکلورکیم ایسڈ
الفقا MT
اگنیشیا MT
(باری باری یا ملا کر دیں)

کلکیریا کارب 200 کھانے سے پہلے
ایک ماہ تک۔ سات دنوں کے بعد ایک
خوراک۔ دو خوراکیں کے بعد کلکیریا
فاس 200

بھوک مگر گھانے سے لطف اندوز نہ ہو
بھوک کھانے کا خیال آتے ہی بھوک لگ جائے
بھوک کسی چیز کی نہ ہو
معدہ ڈوبنے کا احساس

اکثر کھاتا رہے ورنہ نڈھال ہو جائے
نمکین اشیاء کی خواہش

خوراک سے نفرت
خالی احساس پیٹ بو جھل
بھوک بڑھانے کے لئے

ڈاکٹر السین ایم فطر DIK
B.Sc. D.H.M.S. R.H.M.P.

بھس

جب بھس کی وجہ سے حیض کا زیادہ مقدار میں
خارج ہوتا ہو یا خون یا حیض قبل از وقت آتا ہو

ایک ماہ تک
فیرم - میٹیکم 30

جب مریض کا چہرہ سرخ ہو لیکن درحقیقت کی خون
کاشکار ہو

جب کہ کوئی غذا معدہ میں نہ ٹھہر سکے اور مریض نے
ایلو پیٹھی کی ادویات استعمال کی ہوں

جب وجہ ماہواری کی خرابی ہو جبکہ حیض کھل کر آتے ہیں 30
جب لیٹنے سے دل دھڑکے، قبض اور کمزوری
جب قبض نہایت ہی شدید ہو

خنازیری مزاج اور ٹیڑھی ہڈیوں والے بچے
سیلیا 30 - صبح ایک ہفتہ تک
ایک دن چھوڑ کر ایک خوراک
کم از کم دو ہفتے

حیض کی تکلیف کے ساتھ جبکہ حیض کبھی زیادہ کبھی کم ہو
کلکیر یا فاس 30 پہلے دن
کلکیر یا فاس 30 دو سرے دن
(دو ہفتوں تک)

سبز بھس، چہرہ غیر صحت مندانہ معلوم ہو
سردرد کے ساتھ معمولی کام کرنے کے بعد بھی
مریض تھک جائے
سکول کی لڑکیوں میں بھس جبکہ اس کی وجہ کثرت مطالعہ

ہو۔ خوراک کے استعمال میں بے توجہی
موٹے بچے جن کا رنگ پیلا پڑ گیا ہو اور
جن کو اکثر گلے پڑ جاتے ہوں
کبھی کبھی کلکیر یا فاس 200
کالی فاس 200 چند ہفتے

عرصہ دراز سے دماغی کھچاؤ جس کی وجہ بعض
اوقات مایوسی ہو

عام تھکان اور کمزوری

چائنا آرسنک 3x

بواسیر

بواسیر کے ساتھ شدید قبض

کالسنوینا 200

بواسیر کے اثرات کو دور کرنے کے لئے

چائنا 30

بواسیر کے رجحان کو ختم کرنے کے لئے

ٹوبر کولینم 1M

پر درد، خون زیادہ

ہائی پرکیم 200

پر درد، جبکہ پھوڑے بھی ہوں

پاؤنیا 30

خون کم خارج ہو مگر درد شدت کے ساتھ ہو

ایسکولس 200

خونی بواسیر جب جریان خون والی رگوں میں

ہیما ملیس 30

سوزشی کیفیت ہو

خونی بواسیر جب جلن ہو

میکونایورنس MT (ایک قطرہ فی خوراک)

خون زیادہ آئے مگر شدت کم ہو

لائیکوپوڈیم 30

عام طور پر وقتی آرام کے لئے جبکہ

سلفر 30 صبح

سوزش ہو اور درد زیادہ ہو

نکس و امیکا 30 رات

مے انگوروں کی طرح باہر آئیں۔ ٹھنڈی چیز

ایلو 30 کھانے سے پہلے

لگانے سے افادہ ہو۔

عورتوں کی بواسیر، سخت درد، مے باہر نکل آئیں

ہلٹا 30

بہرہ پن

انسان کی آواز کے علاوہ بہت ساری اشیاء

اگنیشیا 200

کی آواز نہ سن سکے

جب مریض صرف انسان کی آواز نہ سن سکے

فاسفورس 30 سے 1M تک

بہرہ پن، کانوں میں شور اور گھنٹیاں بجنے کی آوازیں

جب کوئی وجہ معلوم نہ ہو

معمولی بہرہ پن

کان میں سخت قسم کی میل

کان میں زخم کی وجہ سے

دائیں کان کا بہرہ پن، آواز بائیں کان سے نکلتی

معلوم ہو حالانکہ وہ دائیں کان سے آتی ہو

جبکہ ہاتھوں پر کئی مے ہوں

انفلوئزہ کے بعد

اڈینائڈ غدود بڑھ جانے سے

باری کے بخار کے بعد

تپ دق کے بعد

ٹائفلز کے بعد

چچک کے بعد

خسرہ کے بعد

وجع المفاصل کی وجہ سے

مزمن یا پیدائشی بہرہ پن

بھنوس

بھنوس میں دکھن جبکہ درد بہت زیادہ ہو

فیرم پکڑک 30

کاشی کم 200 کبھی کبھی

کالی میور - صبح (اوپنی طاقت تک جائیں)

میگنیشیا کارب - رات

کلکیریا کارب 30

کونیم 200 کھانے سے پہلے

پیرسلف 200 1M

نیزم کارب 200

فیرم پکڑک 30

جیلی میم 200

ٹوبرکولیم 200 - کلکیریا کارب 30

کاربووٹیج 30، پلسٹا 30

پیرولیم 200

بیلادونا 30، مرکبوس 30

سلفر 200 یا مرکبوس 200

مرک سال - اوپنی طاقتیں

بیلادونا، پلسٹا 3 سے 1M تک

میفاٹس 30، بتدریج طاقت بڑھائیں

(علاج کم از کم چھ ماہ سے ایک سال تک)

میڈورنیم 1000 بعد ازاں

ایکونائٹ 30
اگیریکس 200 صبح
جیلی میم 200 رات

بھنوں کا پھر پھرانا

ہائیو سائٹس 30
سائی کلیم 200
جیلی میم 1M ہر منگل کو
نیٹرم فاس - صبح
جیلی میم - رات
کالوسٹھ - صبح رات
ٹیکیم 200'30

بھینگاپن
جھکوں کے ساتھ
مائل بہ مرکز
ایک آنکھ کا اندرونی بھینگاپن
کبھی کبھی
بیرونی بھینگاپن
پڑھتے وقت

بے خوابی

زیادہ جسمانی یا دماغی کام کرنے کی وجہ سے بے خوابی

کالی فاس 200 یا
میگنیشیا کارب 200 (رات کو سوتے
وقت)

جسمانی کام کرنے کی وجہ سے بے خوابی

آرینیکا 200 صبح
میگنیشیا کارب 200 رات
(چند خوراکیں)

منشیات کے مریضوں کی بے خوابی

نکس و امیکا 30- رات
ویریولا نٹم اور تھوجا (کبھی کبھی)

محرم اشیاء کی استعمال کی وجہ سے بے خوابی

نکس و امیکا 30- رات

کسی مرگ کی وجہ سے بے خوابی

کافیا کروڈم 200 رات

زیادہ دماغی کام کرنے کی وجہ سے بے خوابی

ہائیو سائٹس 30

اگنیشیا 200	بری خبر سننے یا کسی غم کی وجہ سے بے خوابی
کافیا 30	اچھی خبر سننے کے بعد بے خوابی
ڈفنی انڈیکا	ہڈیوں کے درد کی وجہ سے بے خوابی
ایمیر 30	دماغی فکر کی وجہ سے بے خوابی
کینسی بس انڈیکا 10 قطرے	ضدی قسم کی بے خوابی، نیند مطلق نہ آئے
سی سی فیوگا 3x	دانت نکالنے کے دوران بچوں کی بے خوابی
کیمو ملا 3x	درد کی وجہ سے بے خوابی۔ خصوصاً بچوں میں
اناکارڈیم 200، کافیا 30	حمل کے دوران بے خوابی (حاملہ عورتوں کی)
پسی فلورا	جب کوئی دوا کام نہ کرے اور بے خوابی بہت زیادہ نہ ہو
(20 سے 25 قطرے گرم پانی میں)	

بے چینی

آر سیکم الیم 30	دماغی اور جسمانی بے چینی، ایک بستر سے دوسرے بستر پر اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر
کلکیریا کارب 30	دماغی بے چینی اور فکر بچہ چڑچڑا، ضدی اور بے چین
ہیٹلا 30	دماغی بے چینی کی وجہ سے رات کو اٹھ کر بیٹھنے پر مجبور
سینفی سیکریا 200	نظام عصبی میں بے آرامی اور تحریک۔ مسلسل پاؤں کو ہلانا
ایکونائٹ 30	مسلسل پہلو بدلتے رہنا۔ ہر کام میں غلٹ
میگنیشیا کارب 30	بستر سے نکل کر فرش پر سکون حاصل کرنے کے لئے گھومنا
ایپس 30	مریض بہت مصروف مگر کوئی کام ٹھیک طور پر نہیں کر سکتا
کاشی کم 200	کبھی کوئی کام، کبھی کوئی کام بے چینی۔ مریض دوڑنا چاہتا ہو اور ادھر ادھر

چلنے کے لئے مجبور

اگنیشیا 200

لکھتے وقت ہاتھوں کا کانپنا، پہلو بدلنے سے

درد میں اضافہ اور بے چینی

اپریکاک 30

بخار میں بے چینی

رات کے وقت 'شام کو' 4 بجے سے 6 بجے تک بے چینی کاربوو تیک 30

پہلو بدلنا، ایک طرف زیادہ دیر تک نہ لیٹ سکرنا

رشاکس 200، 30

مریض جتنا آرام سے رہنا چاہے اتنا ہی

بے چین ہو جاتا ہے

آر سینی کم 30

رات کو 12 اور 2 بجے کے درمیان بے چینی

ایکونائٹ، آر سینی کم، رشاکس

بے چینی کی تین عظیم دوائیں

بے حرکتی

گریفائٹس 30- صبح، رات

درد سے زیادہ بے حسی

رشاکس 200 صبح

بائیں بازو کا سوجنا

سی سی فیوگا 200 رات

پہلٹا 30

کچھ وقت کھڑے ہونے پر ٹانگیں سوجائیں

اگیریکس 30

سردی کے ساتھ اعضاء کانپنے پڑ جانا اور سوجنا

سنا برس 30، صبح- رات

بائیں بازو کی کہنی سے لے کر چھوٹی انگلی کے

سرے تک بے حسی

بے سلیقہ

اگیریکس صبح

ہاتھ میں پکڑی چیز گرا دے فرنیچر وغیرہ میں

ایپس- رات

پاؤں کا اٹک جانا

بے ہودہ

غیر منذب جو ہر وقت گالی گلوچ دے

لائیکو پوڈیم 200 صبح
نکس دامیکا 200 رات

بے ہوشی

دکھ فکریا غم کی وجہ سے

اگنیشیا - صبح

کالی فاس - رات

نکس موسیکا 30 - صبح، رات

ما سکس 30

اوپیم 200

ما سکس 30

سپیا 30

چائنا 30 اور اونچی طاقتیں

خون کو دیکھنے پر یا کچھ دیر کھڑا رہنے سے بے ہوشی

اکثر بے ہوش ہو جانا، کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جانا

خوف کی وجہ سے بے ہوشی

جذبات کی وجہ سے بے ہوشی

ہسٹریا زدہ عورتوں کی بے ہوشی

رطوبات کے ضائع ہونے کی وجہ سے بے ہوشی

پ

پاخانہ

کسی کو موجودگی میں مریض پاخانہ نہیں کر سکتا

کھانے کے دوران پاخانہ کی حاجت

کھانے کے فوراً بعد پاخانہ کی حاجت

ایمبر 30 - صبح، رات

ایلو ز کھانے سے پہلے

لائیکو پوڈیم 30 صبح

آر سینی کم 30 رات

چائنا 30 صبح، رات

ایلو ز 30 - کھانے سے پہلے

اکیریکس 30 یا سینیکا 30

پاخانہ خاستری، ملائم، چمکدار زرد یا گرم

پاخانہ بڑا بوا سیر

صبح- رات

ٹائٹلک ایسڈ کھانے سے پہلے

صبح- سلفر

ریوم- صبح، رات

پاؤنیا 30- صبح، رات

نیرم فاس- صبح

ریوم- رات

سینی کولا- صبح، رات

مرک کار 30- صبح

ایلوینا 30- رات

ہیما ملیس 30- دن

کیپیکم 30- رات

ہلمم 3x سے 30

مرک سال 30

پاخانہ کے بعد درد، پاخانہ نرم یا قبض کے ساتھ

ہنٹے یا چھینکتے وقت پاخانہ

پاخانہ کرتے وقت کپکپاہٹ

پاخانہ کے دوران یا آخر میں سخت درد

پاخانہ سے کھٹی بو آئے

پاخانہ گول شکل میں

پاخانہ خون آلود (خفیہ خون)

پاخانہ خون آلود (ظاہر)

پاخانہ کے ساتھ آؤں آئے

پاگل پن

بہت زیادہ تفکرات کے بعد

پاگل پن جب جنون مجامعت ہو

آرم میٹ 200

برٹامیور 30 روزانہ

پلاٹینم 200 ہر تیسرے دن

ہائیو سائٹیس 200

سٹرامونیم 200

مریض زہر دیئے جانے کا خطرہ ظاہر کرے

یا کسی اور کو قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کرے

جب مریض میں مذہبی جنون پایا جائے اور

عجیب قسم کے خیالات کا اظہار کرے

خیالی آدمیوں سے گفتگو کرے

شدید جلن جس کے ساتھ سخت ہڈیاں ہو

مریض کبھی ہنسے کبھی روئے

ہائیوسائی مس 200

بیلادونا 200'1000

وریمہرم البم 200

پالی پس

ناک، کان یا بچہ دانی کا پالی پس

تھوجا 200 صبح

سینگونیریا 200- رات

کلکیریا کارب 200

سلیشیا 200

فاسفورس 200- ہر ہفتے ایک خوراک

ہائیڈراسٹس 30

فاسفورس 30

ٹیو کریم 200

جب مریض موٹا ہو یا اس میں موٹاپے کا رجحان

پایا جائے

جب خون آئے

کان میں

مقعد میں

جب سفید اور سبز اخراج ہو

پاؤں

ایسا معلوم ہو جیسے سوئے ہوئے ہوں

فاسفورس- صبح، رات

جیلی میم- صبح، رات

کلکیریا کارب 30-

انٹی مونیم کروڈم- صبح، رات

ٹائٹرک ایسڈ 200

سلفر 30- صبح

سلیشیا 30- رات

سورائینم 200'1000

ٹھنڈے دن اور رات درد ہو گرمی سے

تکوے پر دانے اور جلد سخت

پاؤں اور ہاتھوں پر متعفن پسینہ

پاؤں گرم اور پسینہ

پاؤں گرم اور بدبودار پسینہ

پاؤں اور ٹانگیں برف کی طرح ٹھنڈی
 بیٹھتے وقت پاؤں سو جائیں اور ٹھنڈے پڑ جائیں
 پاؤں کا پھیلا جانا یا کٹ جانا یا کچلا جانا یا
 ان پر اکڑیا خراش آنا
 پاؤں میں بہت زیادہ درد جس کی وجہ سے چلنا
 دشوار ہو

سلیشیا یا نیٹرم میور
 اینٹی مونیم ٹارٹ
 ہارڈیکم 200
 رشاکس 30

پاؤں کا سو جانا
 سوتے ہوئے پاؤں خود بخود ادھر ادھر حرکت کریں
 مریض پاؤں کو بستر سے نکال کر رکھے جلن

کالی کارب 30- صبح، رات
 زنکم میٹ 30
 کیمولہ 30- صبح، رات
 سلفر 200، ہر تیسرے دن

پاؤں کے انگوٹھے کی سوجن
 عام طور پر (جب سوجن اور دکھن ہو)
 بہت زیادہ سوزش

سلفر 30- صبح تھو جا، 30 رات
 بیلاڈونا 30- کھانے سے پہلے
 سلیشیا 30- کھانے کے بعد
 بریٹاکارب- صبح
 اینٹی مونیم کروڈم- رات
 ہائی پرکیم 200- کھانے کے بعد

جلن اور درد کیساتھ
 بہت زیادہ پردرد

ہیپر سلف 1000
 کریازوٹم 1000
 کالی کارب 30

پائسوریا
 مسوڑھوں کے پھوڑے
 اگر دانتوں کو کیرا لگا ہوا ہو
 جب مسوڑھے دانتوں سے الگ ہونے لگیں

مسوڑھوں سے آسانی سے خون نکلے
دکھن دار سوزش جس میں دونوں ٹھنڈی
اور گرم اشیاء سے تکلیف میں اضافہ ہو۔

پتھری

صفراوی۔ پتہ کی پتھری

پتہ کی پتھری کو نکالنے اور حفظ ماقدم
ناقابل برداشت درد

جب قونج اور مروڑ کی طرح کے درد ہوں
اور حرکت کرنے سے آفاقہ ہو
گھٹیا دی مریضوں میں
پتھری اور ریگ خارج کرنے کے لئے

جب پیشاب میں سرخ رتیلی تلچھٹ خارج ہو
جب پیشاب میں خون آئے
پتھری نکلنے وقت درد

پتھری کو گردوں سے مشانہ میں لانے کے لئے

سانی سیکریا 30
سلیشیا۔ ہر چار گھنٹے بعد

کلکیریا کارب 200
اگر چند گھنٹوں میں درد میں کمی
نہ ہو تو بربرس 200 دیں
چیو نہس

مگنیشیا فاس 200
بیلڈونا 1000 گرم پانی کے ساتھ
(زیادہ 16-20 قطرے گرم پانی
میں درد میں آرام کا باعث ہوتے ہیں)
ڈائیکوریا 30

(ہر پندرہ منٹ بعد دہرائیں)
ارٹیکا یورنس 200
بربرس 3x اور تھلاہسی MT
ویسی کیریا MT

لائیکوپوڈیم 6
او۔ سمیم 200
کلکیریا کارب 30 ڈالیوشن
بار بار دہرائیں
اپومویا

پتھری کو مثلاً سے نکالنے کے لئے
پتھری بننے کو روکنے کے لئے

لتھیم کارب 3x

کلکیریا فاس اور نیٹرم فاس

ہر گھنٹے بعد دہرائین ارٹیکا یورنس MT

پریرا بریو MT

پانچ قطرے گرم پانی میں، ہر آدھ گھنٹے بعد

جب درد کو روکنے کے لئے کوئی دوا کارگر نہ ہو

پستان

سوزش

اگر پیپ پڑ گئی ہو

فیرم فاس، برائی اونیا

ہپر سلف 3x سیلشا 3x

(ہر گھنٹے بعد)

کو نیم 30 یا آرنیکا 200

ہلٹلایا سپیا کھانے سے پہلے

کلکیریا کارب۔ کھانے سے پہلے

کو نیم یا ہلٹلایا کھانے سے پہلے

کلکیریا فلور۔ صبح اور سیلشا۔ رات

یا فاسٹولا کا۔ رات

بیلڈاڈنا کی دو خوراکیں دیں

بعد ازاں برائی اونیا۔ آخر میں فاسٹولا کا

سم فاسٹم سے گرم پانی کے ساتھ ٹکور

کلکیریا فاس۔ صبح، رات

ہلٹلایا۔ صبح، رات

سینٹس۔ صبح، رات

چوٹ جیسی درد

معمول کے مطابق حیض سے پہلے درد

بہت زیادہ درد

درد بہت کم

پستانوں میں سخت گانٹھیں

پستانوں میں سختی

پستان میں دکھن جبکہ پستان نرم اور ملائم ہو،

بائیں پستان کے نیچے تیز آہستہ

آہستہ درد جبکہ حیض کم آرہے ہوں

جبکہ یہ درد لیکوریا کے ساتھ ہوں

پستانوں کے درمیان جلنے والی درد

جبکہ دائیں طرف زیادہ متاثر ہو

بائیں پستان میں دباؤ

چھوٹے ہوتے جائیں یا افزائش ہی نہ ہو

سینگونیہ یا 1M

فاسفورک ایسڈ۔ کھانے سے پہلے

سیبل سیرولینا 3x۔ صبح، رات

سار سا پرلا MT دو قطرے پانی میں

ہر چھ گھنٹے بعد

کلکیریا کارب کھانے سے پہلے

کو نیم میک یا ہلٹلا

کلکیریا فلور۔ صبح

سلیشیا یا فانی ٹولا کارات

بیلڈوٹا۔ صرف دو خوراکیں دیں

اس کے بعد برائی اونیا اور

آخر میں فاسٹولا کا

سرپرہلا صبح

کروٹن ٹمک۔ رات

کلکیریا فاس۔ صبح، رات

سسی سی فیوگا صبح

سینٹھس۔ رات

ہلٹلا صبح، رات

سینٹھس۔ صبح، رات

سینگونیہ یا۔

سرپستان کا سکڑ جانا

سرپستان میں دکھن اور نرمی

بائیں چھاتی کے نیچے تیز درد یا

ہلکے ہلکے مسلسل درد

جبکہ حیض کم آئے

جبکہ حیض کے ساتھ لیکوریا بھی ہو

دائیں پستان میں تیز چیرنے والے درد

خصوصاً "سرپستان کے نیچے سانس لینا

مشکل ہو جائے اور درد کندھے تک جائے

بازو اوپر نہ کر سکے بعض اوقات یہ

کالی کارب

فرے گیر یاوسکا MT-صبح رات

دردیں معدہ تک جائیں

دودھ چڑھانے کے لئے دودھ کو خشک کرنے اور

پستان کے سائز کو چھوٹا کرنے کے لئے



پسینہ

تیز پسینہ اور گرمی باری باری

ایپس 200 صبح

کیمولٹا 200 رات

آر سینی کم 30-کھانے کے بعد

کالی فاس 6x

گریفائٹس 200 صبح

میگنیشیا میور 200 رات

کلکیریا کارب 30-صبح رات

فلورک ایسڈ 2

آر سینی کم 30 صبح

کالی فاس یا فاسفورس 30 رات

ہیٹلٹا 30 صبح

اینٹی مونیم کروڈم 30 رات

لیڈم پال 200 صبح

کلکیریا کارب 200 رات

آر سینی کم 30 صبح

ہیر سلف یا فاسفورس 30 رات

کلکیریا کارب 200 رات

فکر سے پسینہ آجائے

حیض سے پہلے پسینہ

یسدار پسینہ

یسدار پسینہ جب ہتھیلیاں تر ہو جائیں

کنزور کر دینے والا پسینہ

نیند کے دوران پسینہ

چلنے کے بعد خصوصاً "ماتھے پر پسینہ

کھانسی سے پسینہ

سردی میں یا ٹھنڈے کمرے میں پسینہ

سر پر مسلسل پینہ۔ مقدار میں زیادہ۔ بدبودار
بستر میں پینہ

کھلی ہوا میں پینہ

زیادہ تر ایک طرف جس سے کٹھی ہو آئے

تیل جیسا پینہ

ریوم 30۔ صبح، رات

کلکیر یا کارب 200 یا

رٹاکس 200 رات

سلیشیا۔ رات

سورائیم 200 صبح

ریوم 30 رات

چائنا 3 صبح

مرک سال، مرک سال۔ رات

اگر کوئی فرق نہ پڑے تو

برائی اوینا 30 صبح

میگنیشیا کارب 30 رات

کلکیر یا کارب 20 رات

سلفر 200 صبح فرق نہ پڑنے کی صورت میں

سلیشیا 200 صبح

کلکیر یا کارب 200 رات

پٹرولیم 30

پٹرولیم 30

سمبیو کس 30

نیٹرم فاس 200 کھانے کے بعد

شانی سیکریا 30 صبح

کلاڈیم 200

کاربوائنی میلس 30۔ صبح، رات

برٹاکا کارب 200 صبح

ذرا سی مشقت کرنے کے بعد پینہ

جب بغلوں میں بدبودار پینہ آتا ہو

جاگنے پر پینہ۔ سونے میں خشک گرمی

پینہ جس سے ترش ہو آئے

پینہ جس سے سڑے ہوئے اندوں کی طرح ہو آئے

پینہ جس سے میٹھی ہو آئے

پینہ جو زرد داغ چھوڑ جائے

کھاتے وقت پینہ

پینہ بالکل نہ آئے

سلفر 200 صبح

لیکس 200 رات

مرکیورس سال 200

پینہ مقدار میں زیادہ

پلورسی

ابتداء میں

ایکونائٹ 30- فوری طور پر

تین خوراکیں

اوگزالک ایسڈ

فاسفورس 30

برائی اونیا 30

درد چھاتی کے بائیں جانب

جب مریض بائیں طرف نہ سو سکے

جب علامات پیچیدہ ہوں اور معمولی حرکت

تکلیف میں اضافہ کا باعث ہو

ایپس 30

جب پیاس محسوس نہ ہو۔ ڈنگ مارنے والے درد ہوں

اور پانی جمع ہو جائے

رے نن کولس بلیوس 30

جب پانی جمع ہو جائے اور بہت زیادہ درد ہو۔

سانس چھوٹا اور دقت سے آتا ہو

آرینیکا 30- صبح، رات

بائیں جانب درد۔ ایسا معلوم ہو کہ پسلیاں ٹوٹ

گئیں ہیں

کالی کارب 30، براونیا 30

دائیں جانب درد (کالتے ہوئے)

سکوٹیل 6x

دقت تنفس کے ساتھ سانس یا کھانسی سے بائیں جانب

پھمن پڑتی ہو۔ مریض بائیں جانب نہ لیٹ سکے

سلفر 200

جب مرض نمونیا کے ساتھ ہو یا اچھی طرح تجویز شدہ

برائی اونیا

ادویات کارگر ثابت نہ ہوں

سینی گا 30

بچوں کی پلورسی، جب پلورسی

کام چھوڑ دے

پیاس

پیاس زیادہ مگر پانی گھونٹ گھونٹ پیئے

پیاس ندارد

آر سینی کم۔ کھانے کے بعد

ہلٹلایا انٹی مونیم ٹارٹ

کھانے سے پہلے

آر سینی کم 30 کھانے کے بعد

برائی اونیا

ہلٹلا 30

کھانے سے پہلے

آر سینی کم 30

کھانے کے بعد

روٹا۔ صبح

فاسفورس۔ رات

بیلڈونا

ایکو۔ شام

پیاس نمایاں

پیاس زیادہ اور پانی کا زیادہ پینا

عورتوں کی تمام تکالیف جب پیاس نہ ہو

مشروب کی خواہش کے بغیر جلن

برف جیسے بخ پانی کی نہ بجھنے والی پیاس

ٹھنڈے مشروبات کی پیاس

ٹھنڈے مشروبات کی پیاس مگر پانی پینے سے

معدہ میں خرابی

تپسخت

فوری طور پر قابو پانے کے لئے

بوڑھے اشخاص کی تپسخت

جب درد اور دکھن ہو۔ پاخانہ کرنے کے بعد

مریض کو سکون محسوس ہو مگر کچھ دیر

مرک کار 30

پیشیا

نکس و امیکا 30

کے بعد درد عود کر آئے

رشاکس 30

موسم برسات کی مہمیش

مرک سال 30

موسم گرما کی مہمیش جبکہ تکلیف رات کو

زیادہ ہو

مرک کار 30

جب پاخانہ میں خون زیادہ ہو

اپیکاک 30

جب متلی ہو

کالو سنٹھ 200

کھانے یا پینے کے بعد فوراً پاخانہ جھکے ساتھ

درد ہو اور قے آئے

ٹرام بیڈیم 6x

کھانے یا پینے کے بعد پاخانہ جس میں

خون ہو۔ پیٹ میں درد ہو

مرک کار 6

مہمیش کو عود کرنے سے روکنے کے لئے

اپیکاک 6

سلفر 200

مزمن مہمیش کے لئے جب قولنجی دردیں ہو

اپیکاک 200

مزمن مہمیش

سٹریٹو کسین 200

جب خون زیادہ آئے اور بخار بھی ہو

پیدائش

پیدائشی نشان

تھوجا 30 (شروع میں)

ریڈیم برومائٹم 200 (ہفتہ میں ایک

خوراک۔ اس دن تھوجا نہ دیں)

وکی سینم 200 (چودہ دن بعد)

نیٹرم میور 200

جب پیدائش میں وقفہ درکار ہو

(ہر حیض کے ختم ہونے پر متواتر تین دن

تک)

جب تک حمل درکار نہ ہو یا
 ہر حیض کی باقاعدہ تاریخ سے پہلے
 پہلے 200 متواتر چار دن تک دیں
 آخری حیض بند ہونے کی تاریخ
 کو اس مہینے کے آگے تحریر کردہ
 تاریخ میں جمع کریں۔ اسی روز
 بچہ پیدا ہو گا

جب بچہ ہونے کا دن معلوم کرنا ہو

تاریخ جس میں دن اضافہ کرتے ہیں	مہینہ جس میں حیض بند ہوا
7 اکتوبر	جنوری
7 نومبر	فروری
5 دسمبر	مارچ
4 جنوری	اپریل
4 فروری	مئی
7 مارچ	جون
6 اپریل	جولائی
7 مئی	اگست
7 جون	ستمبر
7 جولائی	اکتوبر
7 اگست	نومبر
6 ستمبر	دسمبر

اگر خون حیض 7 ستمبر کو بند ہو تو دسمبر کے آگے لکھی ہوئی تاریخ 6
 ستمبر میں 17 جمع کئے تو 23 ستمبر تاریخ تولد نکلتی ہے اگر خون حیض

30 جون کو بند ہوا تو جون کے آگے لکھی ہوئی تاریخ 7 مارچ میں
30 جمع کیا جائے تو تاریخ تولد 6 اپریل ہوگی

پیشاب

پیشاب کے خاتمہ پر زیادہ درد

مرک سال 200 صبح

سار سپرلا 200- رات

ایسڈ سلف 3x

کریازوٹم 200

بربرس کھانے سے پہلے

(اگر شدید درد ہو تو 200 پوٹینسی

استعمال کریں)

کو چیکم 30

(ہر دو گھنٹے بعد دہرائیں)

فاسفورس 30

بربرس- کھانے سے پہلے

آر سینی کم البم- کھانے کے بعد

اوسی میم 30 صبح

پریرا بریو 30- رات

بربرس کھانے سے پہلے

زنم

کریازوٹم 30 کھانے سے پہلے

اگر پیشاب فوری طور پر نہ روکا جائے تو درد ہو

اگر پیشاب فوراً نہ کیا جائے تو مٹانہ میں درد ہو

پیشاب کرتے وقت جلن دار درد جو کم اور

زیادہ ہوتی رہے

شاب سیاہی کی طرح سیاہ

پیشاب دودھ کی طرح سفید یا بالکل پانی جیسا

پیشاب گدلا اور زرد جبکہ اس کے نیچے سفید رنگ کی

تلچھٹ بیٹھ جائے جو بعد میں سرخی مائل ہو جائے

سیاہ بھورا جس میں گندی تلچھٹ ہو اور پیشاب اس خود

خارج ہو جائے

پیشاب خون آلود

پیشاب کارنگ سبز اور.....

صرف گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پیشاب کر سکے

صرف لیٹ کر پیشاب کر سکے

پاخانہ کرتے وقت پیشاب کرنے کے لئے زور لگانا پڑے۔ ایلیوینا۔ صبح۔ رات
 اخراج بار بار ہو اور بار بار رکے۔ کوئیم۔ کھانے سے پہلے
 پیشاب کرنے کی بار بار حاجت خصوصاً "حساس عورتوں میں کاشی کم 200
 صفراوی مریضوں میں پتھری۔ نیٹرم سلف۔ کھانے سے پہلے
 پیشاب کرنے کی زبردست خواہش کے باوجود پیشاب۔ کیتھرس 200
 کا ایک قطرہ بھی خارج نہ کر سکے
 پیشاب میں ایسومن کا اخراج۔ کالچی کم۔ کھانے سے پہلے
 سپرے کی شکل میں پیشاب کا اخراج۔ کریازوٹم۔ کھانے سے پہلے
 پیشاب زوردار دھار کے ساتھ خارج ہو۔ ہلٹلا 30۔ کھانے سے پہلے
 اور ہر دھار کے ساتھ درد
 پیشاب کرتے وقت بہت زیادہ درد۔ پیشاب میں۔ کلکیریا کارب 200
 پتھری کا اخراج
 استادگی کی حالت میں پیشاب جاری ہو سکے۔ تھو جاصح۔ رات
 استادگی کی حالت میں پیشاب جاری نہ ہو سکے۔ کیتھرس۔ صبح، رات
 کھانسی کرتے وقت پیشاب کا نکل جانا۔ کاشی کم 200
 مریض کسی کی موجودگی میں پیشاب نہیں کر سکتا۔ نیٹرم میور 30۔ صبح، رات
 پیشاب کرنے سے پہلے انتظار کرنا پڑے۔ پیشاب کا۔ سپر سلف 200 صبح
 اخراج مشکل اور پیشاب کرنے کے بعد احساس کہ کچھ
 پیشاب ابھی تک مثانہ میں باقی ہے
 غدہ قدامیہ میں سوجن کی وجہ سے پیشاب کرنے میں۔ شانی گیریا 30
 وقت بعض اوقات پیشاب کا اخراج ناممکن۔ سائل سیرولیٹا MT
 پیشاب صرف قطرہ قطرہ آئے اور پیشاب کے شروع۔ کوئیم 30

اور آخر میں درد ہو

درد کی وجہ سے پیشاب کرنے کی گھبراہٹ

سائل سیرویلینا 3x

ایک دم پھوٹ پڑنے کی بجائے پیشاب قطرہ قطرہ آئے۔

لائیکوپوڈیم 30

پیشاب کرتے وقت بچہ درد سے جھنجھے اور چلائے

اگزولیکم ایسڈم 200

پیشاب میں آگزلیٹ

تھلاپسی برسا MT

پیشاب میں ریت کے ذرات

کھانے سے پہلے

پہلے کھانے سے پہلے

پیشاب مقدار میں کم آئے مگر خواہش بار بار

کبھی کبھی خون آلود ہو

تھو جا۔ صبح رات

پیشاب کرتے وقت درد گھٹنوں تک جائے

کاشی کم۔ کھانے سے پہلے

رات کو بار بار حاجت

برس 3x سے 200 تک

جب دردیں پیچھے کر تک جائیں

کھانے سے پہلے

پیٹ

کاربوونج۔ کھانے سے پہلے

سانس ناخوشگوار۔ پیٹ میں ابھار

لیکس کھانے کے بعد

خصوصاً "نیند کے بعد

تھو جا۔ کھانے کے بعد

اچھار جبکہ ایسا خیال جیسے پیٹ میں کوئی

زندہ چیز موجود ہے

لائیکوپوڈیم۔ کھانے کے بعد

ابھار بوجہ تبخیر اور قبض خصوصاً

موٹے مریضوں میں

کلکیریا کارب۔ کھانے کے بعد

پیٹ میں تبخیر کی وجہ سے اچھار

یلیشیا۔ صبح رات

پتلے بچوں کا پیٹ پھولا ہوا

بیسی لینم 200- ہفتہ وار ایک خوراک
 آر سینی کم- کھانے کے بعد
 میگنیشیا فاس- کھانے سے پہلے
 کالی سلف- ہر دوسرے دن
 کھانے سے پہلے
 تھو جا 1000

ایلو ز 30- کھانے سے پہلے
 پلمبم- صبح، رات

لیکس- کھانے سے پہلے
 (حاد حالت میں ہر گھنٹہ کے بعد)

کالی کارب
 تھو جا 1000
 ٹوبر کو لینم IM کبھی کبھی
 اس کے تین ہفتے بعد
 گریفائٹس IM

میگنیشیا فاس 200 اور
 بیلاڈونا 200 گرم پانی میں ملا کر دیں۔
 شدید درد کی صورت میں ہر پانچ منٹ بعد
 دہرائیں حتیٰ کہ درد ختم ہو جائے

اپھار جس کے ساتھ تیز قولنجی درد ہو
 پیٹ ٹھنڈا اور بعض اوقات نرم

پیٹ کی نرم رسولی جس سے پانی کا اخراج ہو
 ہاتھ لگانے سے درد میں اضافہ
 پیٹ کے ایک طرف سے دوسری طرف رتخ کے پھرنے
 کا احساس

ریڑھ کی ہڈی سے رانوں تک درد- چھونے سے تکلیف
 کا بردھنا- مریض گھٹنوں کے بل کمر کو
 اٹھا کر لیٹنا چاہے

جب پیٹ کے ڈوبنے کا احساس ہو
 جگر کے علاقہ میں نرم ڈھیلا
 پیٹ کا گومڑ

پیٹ میں درد
 پیٹ میں درد

اناکارڈیم 30

آر سینی کم 3x

ایپس 30

لائیکوپوڈیم 30

کالو سنخس 30

(ہر گھنٹے بعد دہرائیں)

نکس و امیکا 30

میگنیشیا فاس 200

پانی میں آدھ گھنٹے بعد

دو گھنٹوں تک

دوسرے دن کلکیریا فاس 200

کھانے سے پہلے

کاربوو تچ 30

اگنیشیا 200

ڈائس کوریا 200

کیمو ملا 30

ہیٹلا 30 یا 200

ویٹرم البم 30

خالی پیٹ درد

جب درد جلن دار ہو۔ غذا قے کی صورت میں

خارج ہو جاتی ہو

درد کھانے کے بعد

جب درد کو کھانا کھانے کے بعد آرام ہو

ناف اور ناف کے ارد گرد درد جبکہ مریض درد

سے دہرا ہوتا جائے

جب درد کے ساتھ قبض بھی ہو

درد جو لیکوریا کے ساتھ ہو

خصوصاً "جب حیض شروع ہونے والے ہوں

جب درد کی وجہ شراب، قہوہ، جائے یا تمباکو

نوشی ہو

جب درد بہت زیادہ تھو کے رہنے کی وجہ سے ہو

جب درد پیٹ کے درمیان سے شروع ہو اور

مختلف حصوں تک جائے

جب درد ناف کے ارد گرد ہو اور درد میں

گرمی سے افادہ ہو اور رات کو

تکلیف بہت زیادہ ہو

مرغن غذا کھانے کی وجہ سے درد پیاس ندارد

جب رات کے کھانے کے بعد درد ہو

جب درد کے ساتھ گیس ہو اور قے آئے

آئرس 30

جب درد ایام حیض میں اٹھے

کاکولس 30

پلسٹا 30

ٹھنڈ لگ جانے سے درد

ڈکمارا 30

ٹھنڈے مشروبات کے بعد درد

رٹاکس 30، آرسینی کم 30

پھنسیاں

بڑی پردرد، دکھن کے ساتھ

یلس پرنس 30 صبح

جو بائیں سے دائیں پھیلیں

رٹاکس 200

جو دائیں سے بائیں پھیلیں

اناکارڈیم 200

زیادہ سوجن کے ساتھ

ایپس 30- صبح، رات

سرخ رنگ کے بڑے دانے جن میں چکنائی ہو

کریازوٹم 200- صبح، رات

بعض اوقات تمام جسم پر

پھوڑا

جب پھوڑا بننا شروع ہو

انسٹرم 200

پھاڑنے کے لئے

ہیپرفلف 3x ہر گھنٹے بعد

سرخ بے حد درد، سوجن کے بغیر پھڑپھڑاہٹ

بیلاڈونا 30

یا سوجن اور سرخی

(شروع میں ہر آدھے گھنٹے بعد چار

خوراکیں۔ بعد میں روزانہ کھانے سے پہلے)

بہت زیادہ سوجن، جلن، ڈنگ جیسا درد

ایپس 200

ہیپرفلف 200

چڈھے میں پھوڑا خصوصاً جو ریڑھ کی ہڈی کی

سیلیشیا 200 صبح

بیماری کے بعد ہو

چھاتی کا پھوڑا

بغل میں پھوڑا۔ پیپ سے بھرا ہوا اور سوجن

جلر کا پھوڑا

جب پھوڑا مکمل طور پر پھٹ چکا ہو

۰ پھسڑے کا پھوڑا

پستان کا پھوڑا جب پیپ بننے والی ہو

بغیر منہ کے جب دردناک سوجن ہو

جب منہ بن جائے

جب جلد کا رنگ نیلا ہو گیا ہو

جب پھوڑے کے ساتھ بخار ہو اور زبان سرخ ہو

کمزوری اور پیاس انتہائی چڑچڑاپن

پیپ کو مکمل طور پر خارج کرنے اور

ہائی پرکیم 200 رات

سلیشیا 200

ہیپر سلف 6x

(دن میں چار خوراکیں)

ایکونائٹ 30:30 خوراکیں

ہر گھنٹے بعد بعد ازاں لائیو پوڈیم اور سلیشیا

کلکیریا سلف 200-

کھانے سے پہلے دو دن تک

سلیشیا 200-

صبح۔ رات (ہر جمعہ کو)

فاسفورس 30

سلیشیا 200 ہر گھنٹے بعد

سمفائیٹم۔ ہر گھنٹے بعد

(چار خوراکیں دیں)

پیپ وغیرہ کو نکال کر کیلینڈولا

گرم پانی میں ملا کر صاف کریں

ہیپر سلف 200 یا کلکیریا سلف 200

دو خوراکیں۔ ہر خوراک ایک گھنٹے بعد

بعد ازاں ایک دو دن کے لئے ہر تین گھنٹے بعد

لیکیس 200

آر سینی کم 200 ہر گھنٹے بعد

چار خوراکیں۔ بعد ازاں حسب ضرورت

سلیشیا 200

- ختم کرنے کے لئے

پہلا 30

جب پھوڑے سے جلد خون نکل پڑتا ہو

اور مریض نرم مزاج اور جلد رو پڑنے والا ہو
بغل اور کانوں کے زیریں غدودوں میں پھوڑے
جبکہ ذرا سا چھونے سے بھی درد میں

رشاکس 30

اضافہ ہو اور خون پانی ملا خارج ہو

حرکت سے آرام

سلفر 200 صبح

کمزور اشخاص کے پھوڑے مریض کبڑے ہو کر

چلتے ہوں۔ پھوڑے سے بہت زیادہ رطوبت کا اخراج

چائنا 30

جب پیپ اور خونی مواد بکثرت خارج ہوتا ہو

جب کوئی دوا کارگر نہ ہو اور پھوڑا ختم ہونے کا نام

ہی نہ لے۔ عود کرنے والا پھوڑا۔ مزمن

سیلیسیا 200 کھانے سے پہلے

پہلے دن۔ بعد ازاں ہر منگل کو ایک خوراک

ت

تپ دق

سینگونیریا 30

کھانسی کھلی ہوئی مگر بلغم سخت اور بروقت خارج نہ

ہو۔ خون تھوکے، کھانسی لینے سے زیادہ

شیم 200

کھانسی کے ہمراہ پیلی سبز بد مزہ کھٹی یا نمکین

بلغم جو بکثرت خارج ہو۔ دائیں جانب لینے

سے درد زیادہ

چائنا 3x

سر کو نیچا کر کے لینے سے کھانسی میں اضافہ

بائیں طرف لینے سے بلغم زور سے کھڑکھڑا دے

کمزوری، کمی خون

جب نمونیا کا علاج صحیح طور پر دیا گیا ہو۔

لائیکوپوڈیم 30

ناک پچھے کی طرح حرکت کرے

خنازیری مریضوں میں جن کے غدد سو جے ہوئے ہوں

آئیوڈیم 6 سے 30

شدید تشنجی کھانسی جب مریض خون تھوکے اور

ڈروسرا 30

مریض چھاتی کو پکڑتا ہو

خنازیری مزاج کے موٹے افراد جب کھانسی شام کے

کلکیریا کارب 200

وقت خشک آتی ہو اور ٹھنڈک تکلیف دہ ہو

جب مریض دبلا پتلا اور لمبا ہو اور تھوک

فاسفورس 30

ساتھ خون کی آمیزش ہو۔ چھاتی میں جکڑن ہو

خاندانی سلی مادہ موجود ہو

خنازیری غدد جب بھوک زیادہ لگے

آرسنک آئیوڈائیڈ 30

آخری درجہ پھیپڑوں میں زخم

کالی کارب 200

بلغم سبز رنگ کا کھانسی جبکہ چھاتی میں

سلفر 30

بلغم کی کھڑکھڑاہٹ ابتدائی درجہ

(آخری درجہ میں استعمال سے

گریز کیا جائے)

(نوٹ: یاد رہے کہ تپ دق میں

ٹیوبرکولسٹم 1000 کا ہفتہ وار یا پندرہ

دن کے بعد ایک بار استعمال نہایت سودمند

ثابت ہوتا ہے

تسلی

تسلی دکھ کا باعث ہو

نیٹرم میور 200

تسلی سکھ کا باعث ہو

پہلٹا 200

تشخ

بچوں میں خصوصاً "دانت نکالنے کے دوران
بچوں میں دانت نکالنے کے دوران جب خون
کا دباؤ سر کی طرف ہو۔ سرگرم

چہرے پر سرخی

پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے

سردی کی وجہ سے

معدہ کی خرابی کی وجہ سے

نہ ہضم ہونے والے پھل کی وجہ سے

تصادم، بجلی کا جھٹکا لگنے یا

چوٹ کی وجہ سے

جب چہرہ نیلا پڑ جائے

ڈر یا خوف کی وجہ سے

تل

تل نکالنے کے لئے

کیمولہ۔ ہر آدھ گھنٹے بعد دہرائیں

بیلادونا 200

ہر چار گھنٹے بعد دہرائیں

سانٹا 30

بیلادونا۔ ہر گھنٹے بعد

آرام آنے تک

آرینی کم۔ کھانے کے بعد

اگنیشیا کھانے سے پہلے

نکس و امیکا 3x

(ہر پندرہ منٹ بعد دہرائیں)

آرنیکا 200

کیوپرم میٹلیکم 200

کالی فاس 6x

ہر گھنٹے بعد آرام آنے تک

کیتھرس 200- ہفتہ میں دو بار

تھو جالہ۔ کھانے سے پہلے ہر ماہ

کی پہلی تاریخ کو 200 یا 1000

چہرے پر بہت زیادہ تل
جلد پر بہت زیادہ تل

تھو جا 200
کاری نو سینم 1000
صرف ایک خوراک۔ بعد ازاں تھو جا 200

تلی

تلی میں درد۔ تلی کا بڑھ جانا

سینس 30۔ صبح، رات

تو تلا پن (ہکلاہٹ)
ہر قسم کا

کاشی کم۔ صبح
سڑا مو نیم۔ رات
کالی فاس۔ رات

تیزابیت

منہ میں ترش ذائقہ

ہر قسم کی خوراک تیزابیت پیدا کرے
چربی دار اور مرغن غذا کی وجہ سے

نیٹرم فاس 200
کھانے سے پہلے
نکس و امیکا۔ کھانے سے پہلے
ہلٹا 30۔ کھانے سے پہلے
کالی میور 200۔ ہفتہ میں دو بار
نیٹرم فاس
لائکو پوڈیم۔ کھانا کھانے سے پہلے

بچوں میں دودھ پینے کے بعد یا شکر کھانے کے بعد
معدہ ڈوبنے کا احساس جبکہ قبض ہو اور
پیشاب میں سرخ ذرات موجود ہوں
تبخیر بہت زیادہ

ارجنٹم نائٹرکیم یا کاربوئیج
(کھانا کھانے سے پہلے۔ کچھ دن)

تھکاوٹ

حاد یا مزمن

آر سینی کم یا میگنیشیا کارب 200

(کھانے کے بعد ہفتہ میں ایک

خوراک چار ہفتوں تک)

پکڑک ایسڈ 200

جیلی میم یا کالی فاس 200

دماغی تھکاوٹ اور ریڑھ کی ہڈی کی کمزوری

اعصابی تھکاوٹ۔ چلتے وقت ٹانگوں کا کانپنا

انگلیوں پر کنٹرول نہ رہے

ٹھنڈے پینے اور فکر کے ساتھ جسم میں جلن محسوس ہو

مزمن۔ بعض اوقات بہرہ پن کے ساتھ

آر سینی کم 200 کھانے کے بعد

پیر سلف 30۔ کھانے سے پہلے

کلکیریا فاس۔ صبح، رات

کالی فاس 6x

لیکسیس 200

لائکو پوڈیم

بیلاڈونا 30

شانی سیکریا 30

بریشا کارب 200 صبح

مرک سال 200 رات

برو میم 3x

تکلیف ایک دن چھوڑ کر

ارغوانی رنگ، بائیں طرف

ارغوانی رنگ دائیں طرف

سرخ، سوزش، جلن

سوزش، جلن جب ٹیس کانوں تک جائے

ہر قسم کے ٹانسلائٹس میں

اپریشن کے بعد

ٹ

ٹانسلنز

بڑھے ہوئے۔ دھن۔ سوزش، پیپ پڑ جائے

ٹانسلنز میں سوجن

عنفونی حالت

سلیشیا 200

پارو جی نم 200 یا

کالی فاس 6x
ہپر سلف 200

ٹانگن بار بار عود کر آئیں

ٹانگیں (پاؤں)

ٹھنڈے۔ نمدار ہونے کا احساس

بد نما

رات کو متواتر ملتے رہیں

کلکیر یا کارب۔ صبح

نیٹرم میور۔ رات

کاشی کم۔ صبح

زنم۔ رات

کلکیر یا کارب۔ صبح

فیرم۔ رات

(شروع میں کیوپرم میٹ 200 کی دو خوراکیں

سکٹا 200

ایسا معلوم ہو جیسے ٹانگیں اور پاؤں ہوا میں

تیر رہے ہوں

ہر وقت بے چینی۔ متحرک

بے چین اور کھینچنے والی دردیں

بوجھل معلوم ہوں

غیر ارادی طور پر ٹانگوں کا حرکت کرنا

زنم میٹ 30۔ صبح، رات

سلفر 200 صبح

زنم 30۔ رات

نیٹرم میور۔ صبح

آگیریکس۔ رات

زنم۔ رات

مرک سال 200

سنا برس۔ صبح، رات

آرنیکا 200 وراثت جلیسم 200 صبح

زنم۔ صبح، رات

سوتے وقت ٹانگوں میں جھٹکے

ٹانگوں کی سوجن

چلتے ہوئے بائیں ٹانگ دائیں ٹانگ سے چھوٹی معلوم ہو

فالج

ایسا معلوم ہو کہ خون گردش نہیں کر رہا

پنڈیوں میں کڑکن
سکر کے بل لینے وقت ٹانگوں کو دہرا کرنا پڑے

زکرم۔ صبح، رات
مرک کار۔ صبح، رات

ٹخنے

ابھاروں کے ساتھ درد اور خارش

نیٹرم فاس۔ رات
سلفر۔ صبح

آرنیکا 30، رشاکس 30
سم فائٹیم۔ صبح، رات
یاروٹا

جب موج آجائے

ایسا معلوم ہو جیسے موج آگئی ہو

ایپس۔ ہر چار گھنٹے بعد

نیٹرم کارب۔ صبح، رات

میڈورنیم 1000

سورائینم 200

سٹرونشیم کارب 200

نیٹرم میور 200

لیڈم پال 200

سٹرونشیم کارب 200

ہائی پرکیم 200

سوجن

سوجن اور جوڑ کمزور

مزمن وجع المفاصل

ٹخنے کا لہر

مزمن موج جبکہ سوجن بھی ہو

کمزور ٹخنے جب آسانی سے مڑ جاتے ہوں

(خصوصاً بچوں میں)

جب ٹخنوں میں آسانی سے موج آجاتی ہو

اور ان پر سوجن آجاتی ہو

ٹخنے کی پرانی موج

زخم۔ گھٹنوں میں درد

ج

جاگنا

صبح سویرے جاگ آجائے
 زیادہ محنت والا کام (دماغی) کرنے کی وجہ سے جاگنا
 نیرم کارب۔ صبح، رات
 کالی فاس میگنیشیا کارب
 صبح، رات
 آرنیکا۔ صبح
 زیادہ محنت والا کام کرنے (جسمانی) کی وجہ سے جاگنا
 میگنیشیا کارب۔ رات

جانور

جانوروں سے محبت
 کلکیریا کارب 200
 بیلڈونا 200
 گھوڑے میں بے چینی، زبان باہر نکل آئے
 ہر پندرہ منٹ بعد
 چوزوں کا ہیضہ
 آرسینی کم آئیوڈائیڈ 30
 (20 سے 30 گولیاں پانی میں)
 چوزوں میں دست
 آرسینی کم 30 روزانہ ایک خوراک
 کاچمکم 200
 گھوڑوں اور گائے میں قولنجی دردیں
 میگنیشیا فاس 200
 (گھوڑے کے کانوں میں تھوڑا سا پانی ڈالیں
 تھائیروئیڈیم 30
 فاسٹولا کا 3x
 ایسا فوئیڈا 3x
 بریٹا کارب 200
 سلفر 30
 یوفرزیا ایک اونس پانی
 گائے میں اسقاط حمل
 گائے میں دودھ کی مقدار بڑھانے کیلئے
 اگر کتا قالین وغیرہ پر پیشاب کر دے
 یا اجنبی کو دیکھتے ہی چھپنے کی کوشش کرے
 کتے کے کلن کا ایگزیرما
 آنکھوں سے پانی بہنا (جانور کے)

میں جو ابالا گیا ہو 10 قطرے

آرنیکا 200

آرنیکا 200، کلکیریا فاس 200

آر سینی کم 30

آرنیکا 200

رٹاکس 200

آر سینی کم 30

لائیکوپوڈیم 30 یا سلیشیا 30

کالی آئیوڈائیڈ

سلفر 200، مرک سال 200

گھوڑوں میں تھکاوٹ

چوٹ۔ ہڈی ٹوٹ جائے

جب بال کرنے شروع ہو جائیں

شکاری کتوں کے دست

جب جانور لنگڑا کے چلے

منہ کی تکالیف، سوزش وغیرہ

منہ کی تکالیف کے لئے حفظ ماتقدم

جلد سرخ، سوزش، منہ سے جلد کو

کو خارش کرنے کی کوشش

جبرے

اباسی لینے سے جبرے اپنی جگہ سے ہٹ جائیں

جبروں یا ان کے نیچے سوجن

اوپر والے جبرے سے درد ہر طرف جائے

جبروں کے پیچھے نرمی

رخسار کے نیچے سوجن

میگنیشیا فاس 200

کلکیریا فلور 200

سینگو نیریا 200

فاسفورس 200 صبح

سمفا ٹم 200

سینگو نیریا 200 رات

ہلاکالاوا 30

دانت نکالنے کے بعد جبرے میں سوجن

جذام

جذام مخدر

بسی لینم 1000 ہفتہ میں ایک بار

ایلو مینا 30	تانبے کی رنگ کی سسی گھٹلیاں
	لب اور ناک پر سفید داغ
اناکارڈیم 200	جب مقام ماؤف سرد اور سن ہو
آرسینک آئیوڈائیڈ 30	جب انگلیوں اور پاؤں کے انگوٹھے گل جائیں
کومو کلیڈیا	سفید کوڑھ
انڈیگو 3 سے 30	تمام جسم ماؤف، جلد موٹی، اعضاء بیکار یا
	گل سڑ جائیں
ہائیڈرو کوٹائیل 200	انگوٹھے، انگلیوں اور ناک پر سخت بدبودار زخم
لیکس 200	جب زخم بہت گرمے اور تکلیف دہ ہوں
سلیشیا 200	ناک پر زخم، ہاتھ سن، تانبے کے رنگ جیسے داغ
سلفر 200 ہفتہ میں ایک بار	درمیانی دوا

جسم

ایسڈ فاس 200	جسم کو بنانے کے لئے خصوصاً "باڈی بلڈرز" کے لئے
ہر منگل اور جمعہ کو	
سلفر 200	جسم میں الرجی ختم کرنے کے لئے
میگنیشیا فاس 200	جسم میں دردیں

جریان منی

سلی نیم 200	پاخانہ کرنے وقت پیشاب کے ساتھ منی کا اخراج
سلیشیا 30	پاخانہ کرتے وقت پیشاب کے ساتھ مذی کا اخراج
فاسفورک ایسڈ 1x	خواب میں منی کا اخراج۔ حافظہ کمزور
تھو جاتا MT	اخراج سے پہلے اچانک کاہلی

بغیر خواب کے انزال

جلسی میم 200

تھو جا MT

چائنا 30

زنگم میٹ 200 صبح

فاسفورس 200 رات

شانی سیکریا 30

ایگنس کاسٹس MT سے 200 تک

پہلٹا 30

جریان منی کہ وجہ سے کمزوری

سرعت انزال

مشت زنی کی وجہ سے جریان منی

بوڑھے اشخاص میں جو نامردی کا شکار ہوں

رات کو منی کا اخراج جب مریض ڈیپریشن کا شکار ہو

جگر

درد جو دائیں کندھے تک جائے

جگر کا سرطان جو آخری مرحلہ پر ہو

جگر کا بڑھ جانا اور استسقاء

چیلینڈونیم 200

کولسٹرینم 200

کارڈوس - صبح

چیلی ڈونیم - رات

کولسٹرینم 200

لائیکوپوڈیم 1000 کھانے سے پہلے

ہفتہ میں ایک خوراک

نکس دامیکا 30 - رات

آرم میور، تھرڈ ٹریچوریشن

لائیکوپوڈیم 30 - اونچی طاقتیں

مرک سال 200

لائیکوپوڈیم 30

میسریریم 200

جگر کے مختلف امراض

جگر پر خون

جگر کا بڑھ جانا یا سوکھ جانا

جگر کے مزمن پھوڑے

موروثی امراض

جگر صحیح کام نہ کرے - بھوک نہ اورد - قبض

پیٹ پر داغ

چھاتی اور بازوؤں پر جگر کی خرابی کی وجہ سے

سے کالے داغ

میگنیشیا میور 30

مریض کو کئی دن تک پاخانہ نہ آئے
(خصوصاً بچوں کو) جگر سخت اور پیٹ کی سوجن

پٹیل 30

جگر اور معدے کی ملی جلی علامات

جلد

نیزم کارب یا پٹرولیم 200

جلد خشک، کھردری

ہیپر سلف 200، 1000

خشک زخموں کی وجہ سے جلد گلنے لگے

اگنیکس 200

جلد کو جلد سردی لگ جائے جس کی وجہ سے جلد

سرخ ہو جائے۔ جلن اور خارش

سپانچیا 5 سے 6 قطرے روزانہ

جلد کی متفرق علامات کو جلد ختم کرنے کے لئے

جلد باز

ہیپر سلف۔ صبح

مریض ہر موقع پر جلد بازی کا مظاہرہ کرے

نکس و امیکا۔ رات

اگنیشیا 200۔ ہر جمعہ کو

کالی فاس 200۔ ہر بدھ کو

جلق

ایسڈ فاس 1x

جلق کے پرانے مریض

اور یگنیم MT

جلق کی عادت چھڑانے کے لئے

ایونیا سائیو MT

جلق کے بعد اعصابی کمزوری

جلن کے بد اثرات دور کرنے کے لئے
جلن کی وجہ سے معدہ کی خرابی
جلن کی وجہ سے دماغ اور جسم مفلوج
بہت زیادہ عادت عورتوں میں

شانی یوگیا 200
نکس و امیکا 200 رات
جلن میم 200
زنگم۔ صبح رات

جلن

گرمی، سرخی، سوجن، جلن کے ساتھ

جب ہاتھ اور پاؤں اکثر ٹھنڈے ہوں

پاؤں کے تلووں اور ہاتھوں کے اوپر جلن

کانوں، آنکھوں، چھاتی، تھیلیوں، تلوؤں

ہونٹوں، گلے، مقعد یا پیٹ میں جلن

جلن، غیر معمولی حدت اور تیزابیت

درد میں سردی سے آفاقہ

درد میں گرمی سے آفاقہ

تمام جسم ٹھنڈا مگر مریض کے جسم کے اندر جلن

جلن، خارش کے ساتھ

جلن، دکھن کے ساتھ

بیلڈو 30

کلکیریا کارب 200

سینگونیریا 200

روزانہ۔ ایک ہفتہ کے لئے

فلوریم ایسڈ 200

ایپس 30

آر سینی کم 30

کاربوونج 200

سلفر 200 صبح

کاشی کم 200

ہفتہ میں ایک دن صبح شام

ایپس

جلن اور ڈنگ مارنے والے درد

جلنا

جلنے والی جگہ پر پیپ پڑ جانا

ہیپر سلف 30

کلی میور 6x

اگر جلنے والی جگہ گہری ہو جائے اور جلد گلنی

کالی بائیکرو میکم 30

شروع ہو جائے

ہر دو گھنٹے بعد

جلنے کے ہر مرحلے کے لئے

کیتھر س 30

جب گیٹگریں کا خطرہ ہو

آر سینی کم البم

جلنے کی وجہ سے حادثہ

کپسی کم 30

درمیانی دوا

ارٹیکا پورنس

جنسی خواہش

بہت زیادہ عورتوں میں

زنکم۔ صبح، رات

بہت زیادہ دونوں مرد اور عورتوں میں

فاسفورس۔ صبح

نکس و امیکا رات

بہت کم عورتوں میں

اوسی موڈیم 1000

بہت کم دونوں مردوں اور عورتوں میں

ایگنس کاسٹس MT

جسمانی کی نسبت دماغی طور پر زیادہ

کلکیریا کارب 200

کھانے کے بعد یا شام کے وقت خیزش زیادہ

ایلیوز۔ صبح، رات

مریض جسم کے کپڑے اتار پھینکے

برائیشامپور

ہائیوسائنس۔ صبح، رات

جوڑ

جب درد کم ہو اور سوجن زیادہ ہو

ایپس 200

جب حرکت کرنے اور ہاتھ لگانے سے درد میں اضافہ ہو

فیرم فاس۔ صبح

برائی اونیا۔ رات

مزمن جوڑوں کی سوزش (آرتھرائٹس)

فارمک ایسڈ 30

فاسفورس 30- صبح، رات

جوڑوں میں طاقت کا فقدان۔ فالج جیسی کیفیت
کندھوں، کہنیوں، ہاتھوں، گھٹنوں یا پاؤں کے
جوڑوں میں درد

لیڈم 200- صبح
کالوفائیلیم 200- رات

چھوٹے جوڑوں میں درد یا ان میں موج

کلکیریا فاس 6x
ایگمنس کاسٹس 2x

جوڑ کا اتر جانا

رشاکس 200

انگیوں، جوڑوں، گھٹنوں، چوڑوں، کندھوں
کے جوڑوں میں سختی

سلفر۔ صبح، پہلا ہفتہ
کاشی کم۔ صبح، دوسرا ہفتہ
برائی اونیا۔ صبح (تیسرا ہفتہ)
رشاکس رات
فیرم فاس (چوتھا ہفتہ)
نیٹرم سلف

جوڑوں کی سوزش (مزمن) جب کوئی دوا
کارگر نہ ہو

چ

چائے

فیرم 6

چائے پینے کے بعد معدہ میں مروڑ

تھو جا 30

جب ذرا سی خوراک ناموافق ہو

تھو جا 200

چائے پینے کی وجہ سے عصبی درد

ہر ہفتہ ایک خوراک

چائے پینے کی وجہ سے مزمن خرابیاں

چھین

رات کے وقت تمام جسم پر مھین جھنجھناہٹ
کپڑے اتارتے وقت اور بستر میں جاتے وقت
کپڑے اتارتے وقت

برٹاکا رب 30- صبح
نیٹرم میور 30- صبح، رات
ریوم 30- صبح، رات

چڑچڑا

ہر وقت تسلی کی خواہش

ہلٹلا 3x سے 30 تک۔

کھانے کے بعد

نیٹرم میور 30- کھانے کے بعد

نکس و امیکا 30- کھانے کے بعد

کیموٹلا 30- کھانے کے بعد

لیکبیس 200 رات

بیلاڈونا 200

تسلی ناپند

بد مزاج جبکہ مریض کو خود بھی معلوم ہو

بد مزاج جبکہ مریض کو خود علم نہ ہو

شکی مزاج۔ حامد

مزاج میں غصہ

چڑچڑاپن

متنفر

اعصاب کمزور

جب اٹھتے وقت سر درد شروع ہو جائے

اور دوپہر کو شدت اختیار کر جائے اور رات تک رہے

نکس و امیکا 30- رات

کیموٹلا 30- صبح، رات

لیٹم کلرینیم 3x سے 30 تک۔ صبح، رات

چکر

سر کی طرف اجتماع خون۔ درد اور چہرے کا رنگ بدلنا

فیرم فاس 6x

نیچے دیکھنے پر چکر

اوپر دیکھنے پر چکر

ادھر ادھر دیکھنے پر

چکر کا خیال آتے ہی چکر۔ ایسا معلوم ہو جیسا

کہ بستر الٹ دیا گیا ہو

جب مریض اکثر چکر آنے کی شکایت کرے

جب زمین ہلتی ہوئی معلوم ہو

سلفر۔ صبح

ہلٹا 30 یا کلکیر یا کارب

اولی اینڈر 3x سے 30 تک

برائی اونیا 30 صبح

چیلڈونیم 30 رات

نیٹرم میور 30

سلفر 30۔ صبح

نکس و امیکا 30۔ رات

ہیکلا۔ صبح

برائی اونیا 30

آرم میٹ صبح

مرک سال رات

پوڈوفائلم

کاکولس 30

ہر چیز اوپر نیچے جاتی معلوم ہو

بیٹھنے کے بعد کھڑے ہونے پر چکر

چکر میں بائیں طرف گرنے کا احساس

کھلی ہوا میں کھڑے ہونے سے چکر

ایسا احساس ہو کہ آگے گر جائے گا

چکر کی وجہ کوئی بھی ہو

چوڑا

چوڑے گھٹنے تک شدید درد

چوڑے جوڑے کی ہر تکلیف کے لئے

چوڑوں میں کھچاؤ خصوصاً رات کو

چوڑوں کی ہڈیوں میں بعض اوقات درد

یہ درد نیچے پاؤں تک جائے

کالی کارب 6x 30۔ صبح رات

بیسی لینم 200

کالی کارب 30۔ صبح رات

سلیشیا۔ صبح رات

ارجنٹم میٹ۔ رات

(اول بدل کر)

چوٹ

- عورتوں کے پستان پر چوٹ
3x، کو نیم 3x
دو دنوں دن میں تین دفعہ
ہائی پر یکم 200
جب چوٹ کی وجہ سے انگلیوں یا ناخنوں
کے نیچے کا حصہ ماؤف ہو جائے
جب چوٹ کے بعد زخم ٹھیک نہ ہو
سیلیشیا 200
جب چوٹ ہڈیوں پر ہو
روٹا 200
کسی قسم کی چوٹ حتیٰ کہ دس سال پرانی
آرنیکا 200
کیوں نہ ہو
جب چوٹ کے ساتھ کیل وغیرہ پاؤں میں گھس جائے
لیڈم پال 200
جب اعصاب کچلے جائیں
ہائی پر یکم 200
جب تیز دھار والے آلے سے زخم پیدا ہو جائے
شانی سیکریا 30، 200
سر پر چوٹ، سر بھاری، پوٹے بھاری
جلیسیم 30
ایسا معلوم ہو کہ مریض نشے میں ہے
سر پر چوٹ۔ ایک طرف سے دوسری طرف سہارے۔
ہائیوسا۔ خمس 30
خونی قے، خراٹے دار سانس اور ہچکی
سر پر چوٹ۔ بالکل بے ہوشی اور تشنج
سائیکو ٹاوائی روسا 30
بشکل سانس لے سکے
شدید چوٹ سر پر۔ نہایت ہی بے قراری
چہرہ سرخ، تنفس بے قاعدہ
بیلارڈوٹا 30

چنبیل

شروع میں جب کوئی دوا سمجھ میں نہ آئے

آر سی سی کم 200 یا

کالی فاس 200 یا تھو جا 200

کھانے کے بعد

فاسفورس - صبح

سورانیٹم 200

سلفر 200 صبح

پٹرولیم 30

ابرو پر

گرمیوں میں کھلی وغیرہ

خٹک کھلی جو رات کو اور نہانے دھونے پر بڑھ جائے

کھلی سردیوں میں تیز گرمیوں میں غائب

چہرہ

مثیلا

نیٹرم میور - صبح، رات

کالی فاس - صبح، رات

کسی وجہ کے بغیر چہرہ کا رنگ سرخ ہو جانا

(مردوں میں)

سی سی فیکو - صبح، رات

برٹاکارب - صبح، رات

سلفر - صبح

ہائیو سائمنس - صبح، رات

فلینڈرم 30

بات کرتے کرتے چہرہ سرخ ہو جائے

چہرہ گرم - کانوں میں شور کی آواز

پیلایا نیلے رنگ کا

چہرے کا رنگ سات اور آٹھ بجے کے درمیان شام

کو نیلا ہو جانا

بیلادونا 30 - صبح، رات

برٹاکارب 200 صبح

کالی فاس 200 - رات

ورنیٹرم البم - صبح، رات

آرنیکا 200

سرخ

چہرے کا فالج

سوتے ہوئے سرخ، بیٹھے وقت مثیلا

کانپے وقت سرخ ہو جانا

سرخی گرمی کے ساتھ

سرخی بغیر گرمی کے

پھڑکنا

زرد

چہرے پر دانے

چہرے پر بہت زیادہ تل

چہرہ خوبصورت بنانے کے لئے

سلفر 20 صبح

گلوٹائن - صبح رات

اکیریکس 200

سلفر 200

بررس ایکی فولیم MT

(فائدہ مسلسل استعمال سے ہوگا)

تھوجا 200

آیوڈیم 1M - چودہ دنوں کے بعد

کم از کم چھ ماہ کے لئے - اگر یہ کارگر نہ

ہو تو کاشی کم 200 صبح

لائیکوپوڈیم رات، ہر منگل کو

چچک

حفظ ماتقدم

ویرولی نم 200، ویکیسی نم 200

ہر ہفتہ ایک خوراک

ویرولی نم 30

انٹی مو نیم ٹارٹ 30

انسولین 3x

انٹی مو نیم ٹارٹ 30 - صبح

مرکیورس 30 - رات

آر سینی کم البم 30

کچھ دن بعد فاسفورس - لیکیس

رشاکس 30، تھوجا 30

جب زور چہرے پر ہو

جب ابھار گردن اور چہرے پر زیادہ نمایاں ہو

جب پیپ پڑ جائے

جب خون نکلے - سیاہ خونی چچک

جب نقاہت اور پیاس بہت زیادہ ہو

جب ابھار ظاہر ہو جائیں

جب پھپھرے متاثر ہونے لگیں
شدید درد سریا ہڈیاں
دوسری ادویات کے ساتھ کبھی کبھی
جب دوا اثر کرنا چھوڑ دے

وریٹرم ورائیڈ، اینٹی مونیم ٹارٹ
بیلادونا 30
سر سپرلا 30
سلفر 200

چیننا

معمولی بات پر چیخ پڑنا

پہلٹا 200 صبح

کالی فاس 200 رات

کاربووٹیج اینی میل 200 صبح

کھاتے وقت چیننا

چھاتی

تنفس میں تنگی۔ سانس کی تنگی
کی وجہ سے رات کے وقت اٹھ کر بیٹھنا پڑے
تیز درد جس سے سانس لینے میں تکلیف
ہوتی ہو

کالی کارب 200

کھانے سے پہلے

برائی اونیا 30

کھانے کے بعد

پہلٹا 30

کھانے سے پہلے

سی سی فیوگا 200

کھانے کے بعد

کالوسن تھس 200

کھانے سے پہلے

بائیں چھاتی کے نیچے درد جب کہ حیض

دیر سے آئیں

چھاتی کندھوں اور گردن میں

بائی کی در دیں

بائیں طرف درد حیض بہت زیادہ اور

عام طور پر وقت سے پہلے

چھالے

انٹی مونیم ٹارٹ
نیٹرم میور

منہ کے چھالے جب دودھ سے الٹی ہو جائے
منہ کے چھالے زیادہ لعاب کے ساتھ

چھپاکی

رشاکس 200
سورانیٹم 200
کلکیریا کارب 200
روٹا 30
انٹی مونیم کروڈم 30
کلورل ہائیڈریٹ 1x
رشاکس 30
ارٹیکا یورنس 200
تھائیرو آئیوڈینم 200
سپیا 30
کاشی کم 30

ہر سال ظاہر ہو
گرمی میں غائب سردی میں شروع
جب سرد ہوا کے لگنے سے غائب ہو جاتی ہو
گوشت کھانے کے بعد
بد ہضمی کی وجہ سے
بڑے بڑے داغ جو ابھرنے ہوئے ہوں
تمام بدن پر خارش۔ کھجلائے کے بعد جلن
ناقابل برداشت خارش۔ ہر وقت خارش کی طلب
جسم کے زیادہ حصے پر چھپاکی
کھلی ہوا میں تکلیف میں اضافہ۔ گرم کمرے میں آرام
مزمن چھپاکی کی جو سرد ہوا میں زیادہ
واضح ہو۔ شدت کی خارش

ح

حمل

سپیا 200
میک کو نیم 30
مرک کار 30
کیموملا 30

حاملہ عورتوں کی قبض
حاملہ عورتوں کے دانت میں درد
جب پیشاب میں ایسومن آئے
قولنجی دردیں

مٹی یا چونا کھانے کی خواہش

کالوسستھ 30

ٹائٹریک ایسڈ 200

کلکیریا کارب 30

ٹیرن ٹولا 30

الومینا 30

سائی کلیمن۔ ہر دو منٹ کے بعد دہرائیں

سمفوریکارپس 200

سپیا 30 صبح

نیرم میور 30 رات

ایپس 30

لیکس 200

سپیا 200

پارو جینم 200

بیل 30

سی سی فیوگا 1x

(ڈیلوری سے دو ماہ قبل

استعمال کرنا شروع کر دیں)

کاربوائی میل 30

کاکولس 30

کو نیم 30

کالوفانیلم 200

ریت اور راکھ کھانے کی خواہش

چاک یا کوئلہ کھانے کی خواہش

دوران حمل ہچکلی

تکلیف صبح سویرے بڑھ جائے۔ مایوس کن حالت

بہت زیادہ بال گرنا شروع ہو جائیں

جب پاؤں اور چہرے پر سوجن آجائے

پانچویں سے ساتویں مہینے کے دوران خون آئے

حمل کے بعد بخار خصوصاً "عضونتی

دوران حمل مریضہ چل نہ سکے

وہ عورتیں جو عموماً "مردہ بچے جنم دیں

تے جو رات کو بہت زیادہ آئے

دوران حمل چکر

پستانوں میں عصبی دردیں

جھوٹی دردیں

حیض

زرد

برائی اونیا۔ صبح، رات

سیاہ۔ گندی بو

پائی روجینم۔ صبح، رات

دیرے سے آئیں۔ بے قاعدہ

سینی شواورس 3x۔ صبح، رات

مشکل۔ دیرے سے آئیں۔ کم مقدار میں

اور پردرد

پہلٹلا۔ کھانے سے پہلے

ہر ہفتہ ایک خوراک

بہت زیادہ۔ اکثر اور زیادہ دیر تک رہیں

کلکیر یا کارب۔ کھانے سے پہلے

(ہر ہفتہ ایک خوراک)

صرف رات کو یا آرام کے دوران جاری ہو

لیٹنے پر خون جاری ہو جائے اور

میگنیشیا کارب۔ کھانے سے پہلے

کریازوٹم۔ صبح، رات

اٹھ کر بیٹھنے یا چلنے پھرنے سے رک جائے

صرف چلتے وقت خون جاری ہو اور چلنا بند

لیٹیم ٹمک لیٹیم۔ کھانے سے پہلے

کرنے پر خون بھی بند ہو جائے

پہلٹلا۔ کھانے سے پہلے

خون ٹھہر ٹھہر کر جاری ہو۔ ایک دن رکنے کے بعد

پھر جاری ہو جائے

سپیا۔ کھانے سے پہلے

حیض صرف ایک دن رہے

آر سینی کم البم۔ کھانے کے بعد

حیض جلن دار۔ حیض کی بجائے پتلا سفید

بدبودار اخراج خون ہوتا ہو

گرفائٹس۔ صبح، رات

خون حیض بہت دیر سے آتا ہو۔ زرد اور مقدار میں

کم ہو۔ اس کے ہمراہ جگر کے مقام پر پھاڑنے والے درد ہوں۔

جیلی میم۔ کھانے سے پہلے

حیض کے دوران آواز کا بیٹھ جانا

لیکیس۔ کھانے سے پہلے

خون جاری ہونے پر درد میں افاقہ

سی سی فیوگا۔ کھانے سے پہلے

حیض کے دوران درد میں زیادتی

حیض کا درد سے آتا جبکہ درویش تشنجی ہوں

میگنیشیا فاس۔ کھانے سے پہلے

(بہت زیادہ درد کی صورت میں یہ دوا

200 پوٹینسی میں نیم گرم پانی میں دیں)

فاسفورس۔ کھانے سے پہلے

خون حیض کا رنگ زرد جبکہ مریضہ خون جاری

ہونے سے پہلے روتی ہو

حیض کم عرصے تک رہے

خون حیض کچھ زیادہ جس میں جھلیاں خارج ہوتی ہوں

جبکہ مریضہ بد مزاج اور چڑچڑی ہو

ختم ہونے کے چند دن بعد خون حیض پھر جاری ہو جائے

جس کا رنگ زرد اور سرخ ہو

خون حیض دب جائے اور اس کی جگہ نکسیر جاری ہو

کئی ماہ تک خون جاری نہ ہو

مقدار میں بہت زیادہ یا بہت کم جبکہ خون کا

رنگ زرد ہو۔ اکثر حیض سے پہلے پیٹ میں اور

سر میں درد

زیادہ دیر تک اور سیاہ خون کے ساتھ

مقدار میں زیادہ

حیض کا ختم ہونا

دل ڈوبنے کا احساس جسم کے مختلف حصوں کا سوجنا

ایسا معلوم ہو جیسے گلے میں گیند پھنسی ہو

سیلان الرحم۔ کم میں درد جسمانی اور

ذہنی نا آسودگی۔ نیند کی کمی

اگنیشیا 200

(ہر منگل اور جمعہ کو)

سپیا 30- صبح

نیرم میور 30 رات

بات بات پر غصہ۔ دم گھٹنے کا احساس
تھوڑی دیر نیند کے بعد نیند اچاٹ

لیکس 200 صبح
(یہ دوا بہت سی علامات کا
احاطہ کرتی ہے)
سی سی فوگا 200

کمر درد کے ساتھ سیلان الرحم اور بے خوابی
رحم کے مقام پر نیچے دبائے والے درد
پستان میں درد

کان میں درد

ہاتھوں اور پاؤں کے چھوٹے جوڑوں میں
درد۔ وجع المفاصل

جلسیم 200
کالوفانیلم 200 صبح
لیک کینینم 200 رات

خ

خارش

جب تمام جلد پر کھجلی کے ابھار پیدا ہو جائیں
سر پر خارش بہت زیادہ پھنسیاں
پھنسیاں جو دانوں کی مانند ہوں
جن میں پیپ بھری ہو

سورانیسم 200
لیڈم صبح، شام
مرکیورس 30
(دن میں ایک بار)

نائٹرک ایسڈ 30

جب کنجران اور جنگاسہ پر پھنسیاں ہوں
اور ان سے بدبودار رطوبت خارج ہوتی ہو
ترخارش جس میں پانی کی طرح سیال بنے
خارش جو علاج کے باوجود ختم نہ ہو
پیپ نکلتی ہو اور جلن ہو

گریفائیٹس 30
سلیشیا 200

لائکوپوڈیم 30

جب پھنسیوں میں سے گاڑی زرد رنگ کی بدبودار

رطوبت خارج ہوتی ہو اور تکلیف نصف شب

کے بعد زیادہ ہوتی ہو

لیکیں 200

جب پھنسیوں کی رنگت سیاہی مائل ہو یا نیلگوں

یا ارغوانی رنگ کی ہو گئی ہو۔ خواب سے

بیدار ہونے پر تکلیف میں اضافہ

ایلو مینا 12 یا 30

ناقابل برداشت خارش جو تمام جسم پر ہو اور

بستر میں گرم ہونے سے بڑھے۔

تھو جا 200

حجام کی خارش

سلفر۔ صبح، شام

خارش جس کی وجہ سے خون رسنے لگے

پیر سلف 200 (ہر اتوار کو)

خالی پن

مکمل خالی پن کا احساس جبکہ کھانے سے

کاربووٹیج۔ صبح، رات

افاقہ ہو

مکمل خالی پن کا احساس جبکہ کھانے

کاربوائی میل۔ صبح، رات

سے افاقہ نہ ہو

خراٹے

رات کو خراٹے مارنا

سیٹیا 200 کھانے کے بعد

(ہر جمعہ کو)

خراش

عام طور پر

آرینیکا 30

لیڈم پال 30	آنکھوں پر
روٹا 200	ہڈیوں پر
ہیما ملس 30	رگوں پر
کونیم 200	غددوں پر
ہیر سلف 200	ریڑھ کی ہڈی، مسوڑوں، انگلیوں کی نوک پر

خسرہ

بیلادونا۔ ماربی لیسنم یا	عام طور پر اور بطور حفظ ماقدم
پہلٹلا (پوٹینسی 30)	
سلفر 30۔ صبح، شام	جب جسم سے بھوسی اتر جائے
(ایک ہفتہ کے لئے)	
برائی اونیا 30۔ صبح، رات	دانوں کے دب جانے کی وجہ سے چھاتی میں دردیں
آر سینی کم البم 30 کھانے کے بعد	خونی اور سیاہ خسرہ

خشکی

ایلومینیا۔ صبح، رات	ناک۔ گلے۔ مقعد یا اندام نہانی کی خشکی
سپونجیا۔ صبح، رات	سردی یا کھانسی کی وجہ سے
برائی اونیا۔ صبح، رات	چکنے بالوں میں
سورائیم 200، صبح	چکنے بالوں میں جب مریض متعفن ہو کا شکار ہو
نیٹرم کارب۔ صبح، رات	خشک بالوں میں
سلفر 200 صبح	سر میں خشکی

خلوت نشینی

عموماً بہت مشکل

سی سی فیوگا 200- صبح، رات

(ہر جمعہ کو)

کلکیریا فاس 200- صبح، رات

(ہر بدھ وار کو)

خناق

آدھی رات سے پہلے خناق کا ہونا

مرض کا حملہ آہستہ آہستہ ہو

خناق آدھی رات سے پہلے واقع ہو

چھاتی میں مسلسل خرخراہٹ

ایکونائٹ 30

سپانچیا 30

پیرسلف 200

خواب

کالے کتوں کے خواب

مردہ لوگوں کے خواب

اپنے آپ کو سمندر میں پانا

لوگوں کو پانی میں ڈوبتے ہوئے یا مچھلی

پکڑتے ہوئے دیکھنا

جذباتی اور ڈراؤنے خواب

آرنیکا صبح

بیلادونا- رات

تھوجا 200 ہفتے میں ایک خوراک

سینگویریا- رات

ورٹیرم ورائڈ- صبح

کالی فاس- رات

نکس و امیکا 30 رات کو

کالی فاس 6x صبح

مرکیورس 30

چیلی ڈونیم 200 ہفتے

میں ایک خوراک

جانوروں کے اور سانپ کے خواب

جنازے کے خواب

آگ کے خواب

کاروبار کے خواب

رونے اور مجمع کے ناخوشگوار خواب

ہر رات خون کے تلاب دیکھنا

خواب میں چونکنا

خواب میں اپنے آپ کو ہشاش بشاش دیکھنا

زیادہ کھانے یا خوراک میں بے احتیاطی کی

وجہ سے رات کو ڈراؤنے خواب یا رات کو

چنچ پڑنا

چوروں اور ڈاکوؤں کے خواب

بچوں میں رات کو ڈراؤنے خواب

اپنی موت، جوانی یا گذشتہ واقعات کے خواب

شہوانی خواب۔ سانپوں کے خواب

بلا ڈونا 30

رٹاکس 200 صبح

ایپس 30۔ صبح، رات

سولینم ٹب۔ صبح، رات

نیرم فاس۔ صبح، رات

کلکیریا فاس۔ رات

ٹکس و امیکا 200 صبح، رات

نیرم میور 30

ٹکس و امیکا۔ رات کو کچھ دن

کلکیریا کارب۔ صبح، رات

سلیشیا۔ صبح، رات

لیکس 200

(تین خوراکیں ایک ماہ میں)

خواہش

ٹھنڈی چیزوں کی خواہش (عموماً طعام)

گرم چیزیں پینے کی خواہش

ٹھنڈے مشروبات کی خواہش

الکوحل کی

برف والی مشروبات کی

فاسفورس۔ کھانے سے پہلے

چیلی ڈونیم 200

لیکس۔ کھانے سے پہلے

ایسڈ سلف۔ کھانے سے پہلے

نیرم فاس۔ کھانے سے پہلے

کلاڈیم کھانے سے پہلے
کلکیر یا کارب۔ کھانے سے پہلے
نکس و امیکا 30

سگرٹ نوشی
اندوں کی غیر معمولی خواہش
مرغن اشیاء کی خواہش

خود کشی
خود کشی کا ڈر
آرم میٹ۔ صبح رات

خوف (ڈر)
معمولی شور سے ڈر جانا۔ اکیلے رہنے کا ڈر
بہت زیادہ خوف
کالی کارب۔ رات
کالی فاس۔ رات

(ہر جمعہ کو 200 پوٹینسی میں)
ڈر کی زیادتی دن کے وقت
ڈر صبح کے وقت
بیلادونا 30۔ اونچی طاقتیں
گریفائٹس

لائیکوپوڈیم 30
معمولی سے شور سے ڈر
موت کا ڈر، بادل گرجنے میں ڈر
مستقبل کا ڈر
فانسورس 30
ڈی جی یٹلس

ایکونائٹ 30
مجمع سے ڈر، اندھیرے کا ڈر
سڑک عبور کرنے کا ڈر
ایکونائٹ

اناکارڈیم 30، 200
امتحان کا ڈر
بیلادونا 30
پانی سے ڈر

چائنا۔ صبح، رات
کتوں اور دوسرے جانوروں کا ڈر۔ خصوصاً رات کو
بیسی لینم 200، صبح
کتوں کا ڈر

ایگنیشیا۔ صبح
آسانی سے ڈر جانا

کالی فاس۔ رات

فاسفورس۔ صبح، رات (ہفتہ وار)

فاسفورس 6

فائی سو گھما 200

خوف اضطراب کے ساتھ جس کی ابتدا معدہ سے ہو
ٹھنڈے پانی سے ڈر

خون

گلے کے پیچھے سے خون کا گرنا

خون کا زیریلا ہونا جبکہ بخار ہو

ہائیڈراسٹس یا سپیا

بپشیشیا۔ ہر آدھے گھنٹے

بعد چار سے چھ گھنٹے تک

پارو جن 200

فیرم فاس صبح، ایکو نائٹ رات

سلفر۔ بیلاڈونا

بنزینیم

زخموں سے خون کا زیریلا ہونا (کسی وجہ سے بھی)

بلڈ پریشر کا بڑھ جانا

خون کا سر کی طرف چڑھنا

خون میں سرخ اجزاء کی کمی

خون بہنا

جسم کے کسی بھی حصے سے خون بہنا

خون آہستہ آہستہ بہے۔ چمکدار اور سرخ ہو

معدہ سے خون کا نکلنا

شانم

سینی شیواورس۔ صبح، رات

فاسفورس۔ (ہر گھنٹے بعد

کم از کم چھ خوراکیں)

لیکیس۔ ہر گھنٹے بعد

سلفورک ایسڈ 200 صبح

دبے ہوئے حیض کے ساتھ خون آنا

چھوٹے زخموں سے زیادہ چمکدار خون کا اخراج

چھوٹے زخموں سے زیادہ سیاہ سرخ خون کا اخراج

جلد کے نیچے نیلا پن

آرنیکا 200 رات

خون تھوکنا

خونی تے معدہ کی خرابی کی وجہ سے
جب حیض کی جگہ خون خارج ہو

نکس و امیکا 200
ہائوسا۔ نمس 200 صبح
لیکبیس 200 رات

فیرم 30

اپیکاک 30

ہیما میل 3x

چائنا 200

آرنیکا 200

جب خون تھوک یا کھانسی کے ساتھ خارج ہو
جب خون سرخ رنگ کا چمکیلا ہو۔ بلغم خون آمیز
شرابی جریان خون خواہ کسی عضو سے کیوں نہ ہو
جریان خون کی وجہ سے کمزوری
کسی حادثہ یا کثرت محنت کی وجہ خون تھوکنا

خونی پیشاب

سوزاک کی وجہ سے گاڑھا لیسدار خون
خارج ہونا

چمافیلا امیلاٹا 30

کینا بس انڈیکا 30

فاسفورس 30

ٹیری بن تھینا 30

کینتھر س 30

جب کوئی دوا تجویز نہ ہو سکے
جس اس کی وجہ کثرت مجامعت ہو یا کمزوری
خون آمیز پیشاب جس کے ساتھ درد ہو
جب پیشاب میں خون آئے اور ہاتھ میں
درد ہو اور پیشاب قطرہ قطرہ آئے
گردے اور کمر میں درد ہو

او ممیم 6

ملی فولیم

درد گردہ میں جبکہ سرخ تلچھٹ تہ نشین ہو جائے
خونی پیشاب کی خاص دوا

خیالات

خیالات میں گم سم۔ مردوں کے لئے

فاسفورس 200 رات
نکس ماسکیٹا۔ 200 صبح
ہلٹا 200 صبح
(ایک ہفتہ کے لئے)

مستورات کے لئے

و

داو

وہ بچے جو موٹاپے کی طرف مائل ہوں اور
ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے اور بھیگے بھیگے ہوں

کلکیریا کارب۔ صبح، رات
سیلینم 200۔

(ہر جمعہ کو صبح)

بھس والے کمزور مریض جن کے سر اور پاؤں پر
بہت زیادہ پسینہ ہو

سلیشیا۔ صبح، رات
سیلینم 200۔ صبح

(ہر جمعہ کو)

عام ساخت کے بچے

سلفر۔ صبح، رات
سیلینم 200۔ صبح، رات
(ہر جمعہ کو)

داڑھی

داڑھی کے نیچے نرم دانے جن میں سے کچھ نہ کچھ
نکلتا ہو

کلکیریا سلف۔ صبح، رات

داڑھی کے بال گرنا

انٹرکینم 30، سفٹرس

دانت

دانت گر جانے کا احساس

دانت نکلوانا

سورائینم۔ صبح، رات

ہائی پرکیم۔ صبح، رات

(نکلوانے سے دو دن پہلے اور

دو دن بعد استعمال کریں)

تھو جا۔ صبح، رات

کیمولما۔ صبح، رات

شانی سیکریا۔ صبح، رات

ٹھنڈی چیز سے تکلیف

گرمی سے تکلیف میں اضافہ

دانتوں کے کنارے ختم ہونا شروع ہو جائیں

اور ان کو صاف رکھنا ممکن نہ ہو

دانت کا درد

گلے سڑے دانت۔ رات کو تکلیف زیادہ

مریض کو اٹھنے پر مجبور کر دے

کھائے ہوئے یا اچھے دانتوں میں درد جب

گرم شے سے درد میں اضافہ ہو۔

کرم خوردہ دانت میں درد جو رخسار کی

ہڈی اور کپٹھیوں تک جائے

عورتوں اور بچوں کے دانت میں درد

کرم خوردہ دانت میں درد

دانت بھر بھرے سیاہ ہوں

کرم خوردہ دانت یا ٹوٹے ہوئے دانت

میں درد جو تھپکن والے ہو

میگنیشیا کارب۔ صبح

برائی اونیا 30

میزیریم 3x

نکس ماسکٹا 30

شانی سیکریا 200

سپائی جیلیا 30

سلفر 200	کھائے ہوئے دانت میں کوندتے ہوئے درد
شانی سیگریا 30	حیض کے دوران
کلکیریا کارب 30- صبح	حاملہ عورتوں میں
نکس و امیکا 30- رات	
کریازوٹم 200- صبح	جو دانت کھائے ہوئے ہوں۔ ان میں شدید درد
شانی سیگریا 200- رات	جو سر تک جائے
بیلادونا 30	دانتوں، چہرے اور کانوں میں کھینچنے اور
	پھاڑنے والے درد رخسار سو جا ہوا
	درد سرد ہوا میں بڑھیں
آر سینی کم 30	دانت ہلنا اور درد کرتا ہو جو ناقابل برداشت ہو
کافیا 30	ناقابل برداشت درد جو مریض کو ہلکان کر دے
	منہ میں برف کا ٹھنڈا پانی رکھنے سے آرام۔
مرکیورس 30، 200	ایک ہی وقت میں کئی دانتوں میں درد
	جو کانوں تک جائے
ڈکامارا 30	ترمو سم یا نمی میں سردی لگنے سے دانت درد
	سردی سے تکلیف میں اضافہ

(نوٹ): دانت درد میں عموماً "پلانسیگو 200" کریازوٹم 200 اور شانی سیگریا 200 کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ پلانسیگو MT کو دانتوں اور مسوڑوں پر لگانے سے درد سے فوری نجات حاصل ہو جاتی ہے۔

دانے (ریش)
سرخ دانے جو بہت تنگ کریں
ارٹیکا یورن 200

پیٹ میں درد جو نیچے کی طرف جائے
 تمام دردوں کا رخ اوپر کی طرف ہو مقعد
 اندام نہانی، جسم اور سر کی دردیں
 ایسا معلوم ہو جیسے لوہے جیسے ہاتھ نے دل کو
 کو جکڑ رکھا ہو۔ چھاتی میں سکڑاؤ کا احساس
 انتڑیوں یا کسی اندرونی اعضا میں نچوڑے جانے جیسے درد
 دردوں میں گرمی سے آفاقہ اور سردی میں
 اضافہ

ہڈیوں میں درد
 یو پیٹوریم پرف
 سمفاٹم اور روٹا
 آرنیکا۔ صبح، رات
 آرسینی کم۔ صبح، رات
 ایپس۔ صبح، رات
 آرسینی کم۔ رات
 فاسفورس۔ صبح
 کیکٹس
 پہلٹلا۔ صبح، رات
 ٹوبر کولینم 200 ہر جمعہ کو
 لیک کینیم 30 کبھی کبھی
 ایسڈ فاس۔ صبح
 ہائی پرکیم۔ کھانے سے پہلے
 خراش یا چوٹ کے ساتھ دردیں
 جلن دار دردیں
 ٹھنڈی مشروبات سے آفاقہ
 گرم مشروبات سے آفاقہ
 دردیں دل میں جکڑن ہو
 منتقل ہونے والی دردیں
 دردیں جو سوتے میں ہوں مگر جاگنے پر غائب
 دانت نکلوانے کے بعد دردیں یا انگٹھوٹے
 یا انگلیوں میں درد

آگزی۔ ملک ایسڈ۔ صبح، رات	بائیں + پھپھڑے میں یا چھاتی میں
کالی کارب۔ صبح، رات	چھاتی کے دائیں طرف جو پیچھے کی طرف جائے
سینتھس۔ کھانے سے پہلے	بائیں کی طرف در دیں
کالی بانکرو میکم	چھوٹی جگہوں پر۔ درد انگلی کے نیچے آجائے
ایپس۔ لائیکو پوڈیم	معدہ میں جب ٹھنڈے مشروبات سے آفاقہ ہو
کالی برومائیڈ 200	دائیں کندھے میں لنگڑا دینے والی در دیں جس کی وجہ سے ہاتھ سر تک نہ اٹھایا جاسکے
ایپس 20۔ صبح، رات	شہد کی مکھی کے کاٹے جیسے درد
شانی سگیا۔ صبح، رات	کندھوں اور بازوؤں کے اعصابی درد
یوپوٹوریم پرف۔ صبح	چھاتی سے لے کر کندھوں کے کونوں تک درد
لیکس۔ رات	
سمفانی ٹم 200	زخم کے بعد چھین دار در دیں
بیلادونا 200	اور زور سے دھڑکنے والی در دیں
زخم 30	جب مریض درد سے چیختا ہو
کیمو ملا۔ کافی 30	درد سے حساسیت
سپائی جیلیا۔ کھانے سے پہلے	گولی لگنے اور خنجر گھونپنے کے سے درد
کالی کارب، لیڈم پال 30	چھین دار در دیں
کیکٹس	چھین دار در دیں جبکہ دل کی تکلیف بھی ہو
کاشی کم یا کلکیریا کارب	پھاڑنے والی در دیں
کھانے سے پہلے	
برائی اونیا۔ صبح	کنزور چوڑیوں میں در دیں
اینٹی مو نیم ٹارٹ۔ رات	
ہلسٹلا۔ کھانے کے بعد	منقل ہونے والی در دیں

کالوسٹھ-200

اعصابی درد جبکہ دبائے اور گرم ٹکڑے سے افادہ ہو

درد زہ

کالوفانیلم 1x سے 200 تک

درد زہ کے دوران

پیسی فلور MT

ناقابل برداشت درد

کالوفانیلم 200

جھوٹے درد زہ کو روکنے کے لئے

دیکھے سر کا درد

درد سر

درد کمر

رشاکس 200- کھانے سے پہلے

مزمن

کلکیریا فلور- صبح، رات

آرام کرنے کے بعد تکلیف میں اضافہ

کالی کارب- صبح، رات

آرام کرنے کے دوران تکلیف میں اضافہ

آرنیکا 200

زیادہ کام کرنے کی وجہ سے

ایس کولس 30، 200

کھڑانہ ہو سکے چلنا تقریباً ناممکن

سی سی فوگا 200

کمر میں شدید درد

نیفا-یلیم 200

مزمن درد جس میں حرکت میں اضافہ ہو

اور کمر کے بل سونے سے آرام

کاربوائی میل- کھانے کے بعد

چلنے کے دوران کھڑے ہونے پر یا لیٹتے وقت

ایسا کمر درد جیسے کمر ٹوٹ گئی ہو

کالی کارب 200- صبح، رات

کمر کے بل لیٹنے سے افادہ

رشاکس- کھانے کے بعد

باغبانی کرنے کے بعد یا زیادہ کام کرنے کی وجہ سے

آرنیکا- کھانے سے پہلے

نمی کی وجہ سے

اینٹی موئیم ٹارٹ۔ کھانے سے پہلے

برائی اونیا۔ صبح، رات

درد کمر جو چھوٹی کمر تک جائے خصوصاً "حیض کے وقت
کمر کے بل لیٹنے سے آرام جبکہ چھاتی پر گدی رکھی ہوئی ہو نیٹرم میو 30

کمی سی فیوگ۔ صبح، رات

بربرس۔ صبح، رات

ایس کولس۔ کچھ دنوں

کے بعد سلفر

رٹاکس۔ کھانے سے پہلے

رٹاکس۔ صبح، رات

آرنیکا۔ صبح

وریولائی نم

آرجینی ٹم ٹائزکیم۔ صبح، رات

کافیا 200 IM

درد کمر پیشاب کی تکلیفات کی وجہ سے

درد کمر جس کے ساتھ بوا سیر بھی ہو

درد کمر بغیر کسی ظاہری وجہ کے

جھکنے پر کمر میں درد دوبارہ سیدھا ہونا مشکل ہو

کمر درد جو کمر پر پھیلی ہوئی ہو

درد کمر پیٹ کی طرف منتقل ہو

روزانہ دوپہر کے وقت درد کمر

کمر کے مہروں میں فاصلہ کم ہو جانے سے

مہروں میں شدید درد

دست

دیکھئے اسہال

دقیانوسی

دماغی طور پر دقیانوسی

بیسی لینم۔ کالی فاس

دکھن

ہونٹوں سے مقعد تک کسی بھی جگہ

کاشی کم۔ فیرم فاس

دل

حرکت قلب کبھی کبھی بند ہو جانا

حرکت قلب اتنی زوردار جس سے سارا

جسم ہل جائے۔ جس دم کے حملے

سانس لینا مشکل ہو۔ چھاتی میں جھین دار

در دیں۔ ایسا معلوم ہو کہ دل بند ہو جائے گا

دل کی پھر پھر اہٹ اختلام قلب

چلتے وقت اور بائیں جانب لیٹنے سے

تکلیف میں اضافہ

کمزور اور نازک مستورات میں جن کا دل کمزور ہو

حرکت قلب بند ہو جانے کا احساس۔ ٹھنڈی

کھلی ہوئیں اور آرام کرنے سے افاتہ

درد دل کو چھوڑ کر دائیں بازو میں چلی جائے

ست، کمزور، غیر باقاعدہ اور نبض رک رک کر چلے

جب نبض بہت کمزور ہو

دل کمزور اور پردرد

دل کو طاقت پہنچانے کے لئے بطور ٹانک

جب اعضا کا سن ہو ناپایا جائے

دل کا بڑھ جانا جب دل میں اجتماع خون ہو

اوگزالک ایسڈ (صرف تین خوراکیں دیں)

سین تھس۔ کھانے سے پہلے

کیکٹس۔ صبح، رات

کیکٹس۔ صبح، رات

کوو۔ یلیریا 200

(دو خوراکیں۔ ہفتے کے بعد دہرائیں)

فائٹولا کا۔ صبح، شام

ڈیجی ٹیلس۔ صبح

کریٹیکس۔ رات

کیوپرم میٹ

کیکٹس

کر۔ ٹیکس۔ رات

کیکٹس۔ صبح

کریٹیکس۔ رات

رشاکس۔ صبح

کالیا۔ رات

آرم مثیلکیم 30

مریض کو کھانا کھانے کے بعد آرام ہو اور

آسٹوڈیم 30

پہلو لیٹنے پر افادہ ہو

کیکٹس 200

نوجوان مریضوں میں دل کا فعل بے قاعدہ

استسقا چہرہ نیلگوں

سپونجیا 30

دل کی ساخت کا عارضہ رات کے وقت دم

گھٹنے کا احساس

کیکٹس۔ صبح، رات

جب بائیں ہاتھ یا دونوں ہاتھوں میں سوجن پائی جائے

کریٹیکس۔ صبح، رات

حد درجہ نقاہت اور جسم کا ٹھنڈا ہونا

(نوٹ) دل کے مریضوں کو کبھی بھی ہائیڈراسٹس MT یا نیچی پوٹینسی نہ دیں۔ کیونکہ یہ دوا MT یا چھوٹی پوٹینسیوں میں حرکت قلب کو تیز کر سکتی ہے۔

دل کی جلن

کھٹے ڈکاروں کے ساتھ

ایسڈ سلف کھانے سے پہلے

ارجنٹم نائٹریم۔ کھانے کے بعد

(کئی ہفتوں تک جاری رکھیں)

نیٹرم فاس۔ صبح

آرتھ۔ رات

وہ کیس جو بہت خراب ہو چکے ہوں

دل ڈوبنے کا احساس

11 بجے دن

سلفر۔ صبح، رات

لائکو پوڈیم۔ صبح، رات

4 بجے بعد دوپہر

کلکیریا کارب۔ صبح، رات

ہر وقت

دماغ

دماغی کمزوری

کالی فاس 200- صبح

فیرم فاس 200 رات

(ہر جمعہ کو بیسی لینم 200 کی ایک

خوراک دیں)

اناکارڈیم 30 یا چائنا 30

نکس مو سیکٹا۔ صبح

اناکارڈیم 200 صبح، رات

(چند دنوں کے لئے)

امونیم میور۔ صبح، رات

کلکیریا فاس 200 صبح

اگنیشیا 200-IM صبح

کالی فاس 200- صبح

کلکیریا کارب۔ صبح، رات

برٹا میور۔ صبح

میگنیشیا میور۔ رات

اگنیشیا 200- صبح

سلفر۔ صبح

کلکیریا کارب۔ صبح، رات

کثرت جماع کی وجہ سے دماغی خرابی

ایسا محسوس ہو جیسے ایک طرف سے دوسری

طرف گر رہا ہو

حافظہ کمزوری امتحان سے پہلے یا کسی خاص کام کرنے

یا کسی کاروبار شروع کرنے سے پہلے

شام کو اکثر خیالات کا ہجوم

اثرات بعد از مایوسی

اثرات بعد از مرگ

اثرات بعد از ڈر

بے ہوشی کے حملے

بند جگہ میں دماغی اضطراب میں اضافہ

اور کھلی فضا میں سکون

موسیقی سے نیند غائب ہو جائے

پریشان کن خیالات جن کی وجہ سے نیند نہ آئے

ہر قسم کے خیالات کا ہجوم جن کا تعلق ماضی سے ہو

نیند نہ آنا

کھلی فضا کی خواہش۔ باہر سانس لینے پر نفاہت

اور دماغی اضطراب ختم

مریض شام یا رات کو منصوبہ بندی کرتا ہے

شام اور رات کو ناخوشگوار خیالات کا ہجوم

شام کو سوچ و بچار یا گفتگو کرنا مشکل ہو

بے خبری کا عالم

چلنے پر چکر۔ دماغی اضطراب اور دل کی دھڑکن

عجیب و غریب تصورات

دو دلیلوں کا مالک۔ ایک دوسرے پر غالب

جب گرنے یا چوٹ لگنے سے دماغ پر فتور ہو

جب کوئی چیز یاد نہ رہے

مینجائٹس

گردن توڑ بخار

دماغ کو چوٹ لگنا

دماغ کی شریان پھٹ جانا اور دماغ کے اندر

خون جمع ہو جانا

اگر مریض بے ہوش ہو جائے اور سانس میں

خراٹے لے

دماغ میں رسولی

چائنا۔ صبح، رات

کاشی کم۔ صبح، رات

انگیشیا۔ صبح، سلیشیا۔ رات

سپیا۔ صبح، رات

کالیا۔ صبح، رات

کینا بس انڈیکا

اناکارڈیم۔ صبح، رات

آرنیکا 200

زنکم 30

زنکم میٹ 200

مرکیورس 200

آرنیکا 200۔ صبح، ہائی پرکیم 200 رات

آرنیکا 1M

اوپیم 1M

ٹیوبریکول نم 1M

(ایک خوراک بعد ازاں

بریناکارب 200 صبح، کوئیم 200 رات

دومہ

بوڑھے مریضوں کا دمہ جو گرمیوں میں بڑھ جائے

سردی کی الرجی کے ساتھ

بیسی لینم 1M۔ علاج مکمل کرنے کیلئے

سورانیٹم 1M

حملہ کی شدت کو کم کرنے کے لئے
رات کو حملے سے بچنے کے لئے
آدھی رات کو حملہ یا ایک اور دو بجے کے
درمیان تکلیف میں اضافہ
چڑھائی چڑھتے وقت سانس میں تکلیف

ایکونائٹ۔ اپی کاک
مرک بنی ایڈ 3x
آر سینی کم 30۔ کھانے کے بعد
آر سینی کم 30۔ کھانے کے بعد
اس کے بعد تھو جا 30 چند دن

مرطوب موسم میں تکلیف میں افادہ
مرطوب موسم میں تکلیف میں اضافہ
سانس میں تنگی محسوس ہو۔ مریض کو
رات کو اٹھنا پڑے۔

ہیپر سلف
نیٹرم سلف 200 یا ڈاکٹار 200
سیمبوکس 200۔ کھانے سے پہلے

سانس تیز تیز ایسا معلوم ہو کہ یہ آخری سانس ہو گا
دمہ کھانسی اور پرانے نزلے کے ساتھ
جب بلغم بہت زیادہ ہو

ایپس 30
اینٹی مونیم ٹارٹ۔ کھانے سے پہلے
کاربووٹیج۔ کھانے کے بعد
کیمولٹا۔ صبح، رات
ہیپر سلف۔ کھانے کے بعد
کیوپرم 30

جب چھاتی میں دباؤ ہو جیسا کہ ہوا بھری ہوئی ہو
جب بلغم کا اخراج تھوڑا ہو
اعصابی کمزوری کی وجہ سے دمہ

دم بند کر دینے والے دورے۔ خصوصاً "شام کے وقت
بستر میں تکلیف میں زیادہ بیٹھے کے بعد زیادتی

سپانجیا 200۔ صبح، رات
فاسفورس 200۔ صبح

جب زیادہ تکلیف گلے میں ہو
جب تکلیف چھاتی میں ہو

سانس چھوٹا اور تکلیف دہ۔ ذرا سی حرکت سے شدت ہو اپیکاک 30۔ صبح

نیٹرم سلف 30۔ رات

کالی کارب 200

نشہ دمہ جو صبح تین بجے زیادہ ہو آگے جھکنے اور

سرگھٹنوں پر رکھنے سے آرام۔ مریض اکیلا رہنا
گوارا نہ کرے۔ 2 اور 4 بجے کے درمیان تکلیف
میں اضافہ

لیکسیس 30 محنت کا کام کرنے کے بعد تنفس چھوٹا، سونے کے
بعد آرام کرنے کے بعد تکلیف میں اضافہ

سلفر 200 جب دورے سونے میں یا شام کے وقت شروع ہوں
سر کی چوٹی پر متواتر گرمی کا احساس

کابووتج۔ صبح، رات بوڑھے لوگوں کا دمہ جب مرض کا دورہ رات کو ہو

سیمبوکس 200 مزمن دمہ جبکہ گھٹن ہو اور منہ سے سانس لینا پڑے

نیٹرم سلف 200 مزمن دمہ جبکہ مرطوب موسم میں اضافہ ہو

(نوٹ) (1) دمہ دراصل سورایا سائیکوٹک اور ٹوبرکولر میازم کی وجہ سے ہوتا ہے لہذا ہمیشہ مزاجی دوا

کا انتخاب کرنا چاہیے۔ (2) دمہ کی تکلیف میں ہر مہینے پہلی تاریخ کو ہمیشہ بیسی لینم 200 اور 15

تاریخ کو نیٹرم سلف 1M دیں

دودھ

لیکس۔ صبح، رات

دودھ کی بہت زیادہ خواہش

کابووتج۔ صبح، رات

دودھ سے نفرت

فرے گیرا دوسکا۔ کھانے سے پہلے

دودھ چھڑانا۔ دودھ کو خشک کرنے کے لئے

رسی نس MT

دودھ آنے میں رکاوٹ۔ دودھ کو بڑھانے کے لئے

سکٹا۔ کھانے سے پہلے

دوڑنے والا

اگر یکس۔ کھانے کے بعد

جن کو دوڑنا ہو

یا آرسینی کم۔ کھانے کے بعد

(دوڑنے سے دو دن پہلے)

دیوانے کتے کا ہکاؤ

قوت مدافعت پیدا کرنے کے لئے

دیوانے کتے کا کاٹنا

جب مریض بہت بے چین ہو۔ بکواس کرے،

چہرہ سیاہ نیلگوں مائل ہو

جب منہ تھوک سے بھرا ہو اور کوئی چیز نگلنا مشکل ہو

بے حیائی پاگل پن

جب مریض بھونکتا ہو۔ چیختا اور چلاتا ہو

پانی کو دیکھتے ہی تشنج شروع ہو جائے

ہائڈروفونیم 200

بیلڈونا 30 (یہ دوا مجرب ہے)

لیکسیس 200

ہائوسائٹمس 200

وائرنوروا 200

ڈ

دیکھئے ”خوف“

ڈر

ڈکار

گڑے سڑے اندوں کی طرح

کھائی ہوئی چیزوں کی ڈکاریں

گرم ترش ڈکاریں

ترش اور کڑوی ڈکاریں

کڑوی ڈکاریں

پوڈوفالیم 30، کاربووتج 30

کاربووتج 30

پوڈوفالیم 30

نکس و امیکا 30- رات کو

مرک سال 30، صبح- رات

ڈنگ

بچھو کا کاٹنا

لیڈم پال 200

ایپس - آرنیکا - لیڈم پال	مکھیوں اور بھڑوں کے ڈنگ
لیڈم - ایپس	چھروں کا کاٹنا
گولنڈرینا	سانپ کے ڈنگ - زہر کو دور کرنے کے لئے
بیلادونا 30	مقام چھونے سے درد کرے
آرنیکا	آنکھ پر ڈنگ

ذ

دیکھے ہیلوریسی

ذات الجنب

دیکھیے نمونیا

ذات الریہ

ذائقہ

نیزم میور صبح، رات	کھانے سے پہلے ترش
کاربووتج - صبح، رات	کھانے کے بعد ترش
نکس دامیکا - رات، پہللا - صبح	صبح یا کھانے سے پہلے یا بعد میں خراب
نیزم فاس - صبح، رات	چلتے وقت خراب - تانبے سا
آر - سینکم - کھانے کے بعد	ذائقہ خراب، معدہ میں جلن کا احساس
ریوم - صبح، رات	کھانے کے بعد ذائقہ کڑوا، میٹھی اشیاء
	بھی کڑوی لگیں

نکس دامیکا 30 - رات کو	ذائقہ کڑوا، پانی کے علاوہ ہر چیز کڑوی
میگنیشیا سلف - صبح	ذائقہ کڑوا یا میٹھا کڑوا خصوصاً صبح کے وقت
میگنیشیا کارب - رات	
برائی اونیا - کھانے سے پہلے	ذائقہ کڑوا اور پیاس

خون جیسا زائقہ

سرے ہوئے انڈوں جیسا زائقہ

ہیما میل کھانے سے پہلے

آرینک یا کاربووتج

کھانے سے پہلے

ہٹلا۔ کھانے سے پہلے

زائقہ مفقود جبکہ منہ خشک ہو اور پیاس

بالکل نہ ہو

زائقہ مفقود ہونے کے ساتھ سونگھنے کی قوت ختم

منہ میں نمی اور پیاس کی زیادتی

دھات جیسا زائقہ

دودھ پینے کے گھنٹوں بعد تک دودھ کا زائقہ

لعاب کھٹا

ہٹلا۔ کھانے سے پہلے

مرکیورس۔ کھانے سے پہلے

مرکیورس کھانے سے پہلے

اگنیشیا۔ کھانے سے پہلے

نیرم میور۔ صبح، رات

یا اگنیشیا۔ کھانے سے پہلے

کیمولما۔ کھانے سے پہلے

مرکیورس۔ کھانے سے پہلے

(اگر یہ دوا کارگر ثابت نہ ہو)

تو ہٹلا۔ کھانے سے پہلے۔

ہٹلا 30 صبح، نیرم فاس 30 رات

کلکیر یا کارب۔ صبح، رات

کھانے یا پینے کے بعد زائقہ ٹٹھا

ٹٹھا زائقہ

زائقہ کھٹا

ذہنی ابتری

اگر دماغ میں پانی ہو

کلکیر یا فاس 200۔ کالی فاس 200

(دو ہفتوں کے لئے)

کلکیر یا فاس 200 صبح

کالی فاس 200 رات

بہت زیادہ کمزوری، دماغی کمزوری،

اعضا کا ٹھنڈا ہو جانا

دماغی کام کرنے کی وجہ سے

کلکیر یا کارب۔ کھانے سے پہلے

کالی فاس۔ کھانے کے بعد

اناکارڈیم۔ کھانے سے پہلے

فاسفورس۔ کھانے کے بعد

ایسڈ سلف۔ کھانے کے بعد

میگنیشیا فاس 200 صبح

کالی فاس 200 رات

اینٹی مونیم کروڈم 30

ٹو نیکم۔ کھانے سے پہلے

جیلی میم۔ کھانے کے بعد

بیلادونا 30

کالی فاس 6x

یا 200 صبح۔ جمعہ اور منگل

برائی اونیا 30

نکس موسیکاٹا 200 صبح

فاسفورس 200۔ رات

پہلٹا 200۔ صبح

سونے کے بعد

الکو حل پینے کے بعد

دماغی ابتری کے ساتھ تشنج

زیادہ کھانے کے بعد

سگرٹ نوشی کے بعد

جب دماغ میں اجتماع خون کے ساتھ شدید بخار ہو

جب اعصابی طاقت مفقود ہو گئی ہو۔ کام کی زیادتی

کی وجہ سے دماغی کمزوری۔ نیند کی کمی یا

یادداشت کی کمزوری، حیض بند ہو جانے کی وجہ سے

ذہنی طور پر غیر حاضر (مردوں کے لئے)

(عورتوں کے لئے)

ذیابیطیس

عام طور پر شوگر کم کرنے کے لئے

سائزیمیم MT اور 3x

سی فنڈرائڈیکا، یورانیم نائٹرک 3x

ڈالی کس 30

تھائی روڈیم۔ کھانے سے پہلے

خارش کے ساتھ

موٹاپے کے ساتھ

ٹخنوں پر سوجن لے ساتھ

نیٹرم سلف۔ صبح

ار جٹنم میٹ۔ کھانے سے پہلے

نیٹرم سلف۔ رات

کالی میور۔ صبح، کالی فاس۔ رات

آئرس وریکولر۔ کھانے سے پہلے

سکوٹلامارٹیم۔ کھانے سے پہلے

نیٹرم سلف۔ صبح، کالی فاس۔ رات

لیکٹس ایسڈ 30

گریفائٹس 30

پلمبم 30

میڈورنیم 200

ایسڈ فاس MT

آر سینکم البم IM

پیشاب زیادہ آئے اور اس میں شکر ہو

گلائیکوسوریا

بے رنگ پیشاب جس میں شکر نہ ہو پیشاب کی زیادتی

زیا نیٹیس شکر کے ساتھ۔ بہت زیادہ پیشاب

بہت زیادہ بھوک

زیا نیٹیس

قبض کے ساتھ

کھانے کے فوراً بعد پھر بھوک لگ جائے

اعصابی زیا نیٹیس

جب پیاس بہت زیادہ ہو

رحم

رحم کا ٹل جانا اور حیض کم مقدار میں

رحم کا ٹل جانا اور حیض زیادہ مقدار میں

کلکیریا فلور۔ سیپیا

کلکیریا فلور اور میورکس

(باری باری)

کلکیریا فلور۔ کھانے سے پہلے

کلکیریا فلور۔ کھانے سے پہلے

ہیلونائس MT۔ کھانے سے پہلے

رحم پتھر کی طرح سخت

رحم ڈھیلا۔ نرم

رحم کا ٹل جانا۔ رحم کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا

مریضہ کو اس بات کا ہر وقت احساس رہے

فیرکیسی نس امیریکانہ MT
للیئم ٹگریئم 20

رحم کا بڑھ جانا
رحم کے نیچے گرنے کا احساس ساتھ ساتھ
پاخانہ کی حاجت

رحم کی جاری شدہ خون کو روکنے کے لئے (کسی بھی وجہ سے) اپنی ہسٹرن 200 یا
1000 ہفتہ میں ایک بار

رخسار

چباتے چباتے اپنے گالوں کو اندر سے کاٹ دینا یا
زبان کو کاٹ دینا

پہلا۔ بیماروں کا سا چہرہ۔ پھولا ہوا
ایک گال گرم۔ دو سر اٹھنڈا
کالی کارب 30
کالی کارب 30

رگوں کا پھول جانا

رگوں کا پھول جانا

مزمن

نوجوان مریضوں میں

سوزش یا نیلی رنگت

حاملہ عورتوں کی

پہلٹا 30، ہیما میل 30

آرنیکا 200

فیرم فاس 6x کھانے سے پہلے

پہلٹا 30، کھانے سے پہلے

پہلٹا 30 کھانے سے پہلے

رعشہ

دائیں بازو اور دائیں ٹانگ میں خصوصاً جب

خوف اور غم کی وجہ سے ہو

آنکھوں کا ہر وقت حرکت کرنا مگر نیند میں

ٹرنٹولا ہسپانیکا 200

ایگر یکس 30

حرکت بند ہو جائے

دائیں ہاند اور بائیں ٹانگ میں ریش

بائیں ہاند اور دائیں ٹانگ میں ریش

باقیوں اور پاؤں کی انگلیوں سے شروع ہو کر

لوہے اعضاء کی طرف جائے

ریش کی طرف کی وجہ سے ریش

چہرے کے عضلات میں ریش

نیند میں ہاند اور ٹانگیں حرکت کریں

ریش میں معمول کی دوا

رات کو زیادہ

صبح کو زیادہ

کیڑوں کی وجہ سے

اگر یکس 200

کیڑوں میں شیشیم 30 سے 1M تک

کیڑوں میں 30

میکل

کاشی کم 200

میکل 200

ریش میں 30

مائی کیل 30 سے 30 تک

کیڑوں اور 30 صبح 30 رات

رنگ

پانی کی مانند افراج

دوا اور سبز افراج

نیرم 30

ہلکے 30 نیرم 30

ریاح

تلف سے لوہ

تلف سے لوہ

سارے وقت میں

(افراج کے اور پچھلے تھوڑے عارض ہو)

کڑو 30

کڑو 30

30

ارحتم 30

(کھانے کے ایک گھنٹہ بعد)

ریفے نس 30	بہت زیادہ ہونہ اوپر خارج ہونہ نیچے
اگنیشیا 200	کھانے کے بعد پیٹ کا ریا ح سے پھول جانا
پہلٹلا 30	مرغن اشیاء کھانے کے بعد
ایسا فوئڈا 30	ریا ح کا اوپر کو اٹھنا باؤ گولہ
نکس موسکیٹا 30	ذرا سی غذا کے بعد پیٹ کا پھول جانا
(دوپہر کے بعد نہ دیں)	
نکس و امیکا 200- کھانے کے بعد	ادویات، مصالحہ دار غذا کے بعد ریا ح
میگنیشیا فاس 200- کھانے سے پہلے	مشروبات کے بعد
کالی کارب 200	پیٹ میں ریا ح اور قونچی درد۔ خصوصاً "موٹے اور
	پلپے مریضوں میں
کالی کارب 30	بوڑھے اشخاص میں
سلفر 200- صبح	مزمن

ریڑھ کی ہڈی

ہائی پرکیم 30	ریڑھ کی ہڈی کے درد جبکہ چلنا دو بھر ہو جائے
ناٹرک ایسڈ- صبح، رات	جب ہاتھوں اور پاؤں پر پسینہ ہو
زنکم- صبح، رات	درد اور جلن
ہائی پرکیم- صبح، رات	سخت چوٹ جسکی وجہ سے کمر میں درد ہو
زنکم- صبح، رات	دھیمی دردیں جن میں بیٹھنے اور آرام کرنے
	پر تکلیف زیادہ ہو
فاسفورس- کھانے سے پہلے	ریڑھ کی ہڈی میں درد- ہڈی گرم

دیکھیے "اینڈی سائنس"

زبان

زبان میں اینٹھن

روٹا۔ کھانے کے بعد

زبان کی سوزش

کریا زوٹم

زبان پر بالوں کا احساس

نیٹرم فاس

زبان پر سرطانی پھوڑے

کالی سائی نیٹم۔ کھانے سے پہلے

زبان کی نوک میں ڈنگ مارنے کادرو

نیٹرم فاس

زبان پر پھوڑے

مرک سال 200

سلیشیا 200

زبان کے پچھلے حصے پر زرد تہ

سباڈلا

کسی گرم چیز کے لگنے کا احساس اور گلے میں بہت زیادہ جلن سینگو نیریا۔ سباڈلا

زبان کھردری۔ زرد میل، سفید یا بھوری زرد

کاربوو تاج 3x

زبان ہلانا مشکل ہو

اینٹی مونیم کروڈم 30۔ کھانے سے پہلے

زبان پر گاڑھی سفید تہ یا جیسے زبان پر سفیدی

کردی گئی ہو

مرک سال 200

نوک سیاہ۔ سوڑھے سفید

سباڈلا 30

نوک پتلی

سباڈلا 30

نوک میں دکھن۔ جیسا کہ زبان چھالوں سے بھری ہو

آر سینی کم 30

زبان سیاہ

برائی اونیا 30، کالی میور 6x

زبان پر سفید تہ

آر سینی کم 30، اپیکاک 30

زبان بالکل صاف

زخم

سوئی کے چھبنے سے زخم۔ پتکچر وغیرہ
 زخم کی وجہ سے زہریلی پیپ
 زخم کی وجہ سے اعصاب کچلے جائیں
 پیپ پڑنے سے پہلے حفظ ماتقدم
 زخم جو چھونے سے زود حس نہ ہو
 زخم جن سے بو آئے
 تیز دھار آلہ سے زخم
 سادہ زخم

لیڈم 3x، ہر گھنٹے بعد
 پائیروجن 200
 ہائی پرکیم 200
 ہیر سلف اوپچی پوٹینسی
 ہائی پرکیم۔ کھانے سے پہلے
 کریازوٹم۔ پااونیا یا لیکس
 سٹیفنی سیگنیریا 30
 کیلنڈولا

زردی

آنکھوں کے ارد گرد زردی
 چہرہ زرد

زرد پانی کا اخراج

جسم کے کسی حصے سے زرد سبز گندی پیپ کا اخراج
 زکام

جسم میں سردی کا احساس شروع ہونے پر

سلفر IM صرف ایک دن دو خوراکیں
 چیلی ڈونیم
 نیٹرم سلف
 نائٹرک ایسڈ 200

ایکمفر (چار خوراکیں) ہر آدھے
 گھنٹے بعد ایکونائٹ ہر گھنٹے
 بعد چار خوراکیں

بعد ازاں علامات کے مطابق ایلیم سیپا،
 جیلی سیمیم، برائی اونیا،
 آر سینی کم البم (پوٹینسی 200)

پیشانی میں شدید درد اور آنکھیں سرخ

بیلڈونا 30

جب تکلیف سردی کی وجہ سے ہو اور چھینکیں بہت زیادہ . مرکب کورس سال۔ ہر گھنٹہ بعد
ناک سے گاڑھی رطوبت کا اخراج

بہت زیادہ ناک سے تیلی رطوبت کا اخراج

آر سینی کم۔ ہر گھنٹہ بعد

ہٹلٹا۔ کھانے سے پہلے

گرم کمرے میں تکلیف میں اضافہ

سٹٹا۔ کھانے سے پہلے

زکام جو ہمیشہ چھاتی پر حملہ آور ہو

سینگونیریا۔ کھانے سے پہلے

زکام جو کھانسی میں بدل جائے اور آواز کبھی کبھی

کالی کھانسی کی طرح ہو۔

ٹکس و امیکا 30

زکام جو بند ہو

کالی کارب۔ کھانے سے پہلے

زکام جو گرم کمرے سے باہر آنے پر ہو

کالی سلف 200

جب تکلیف میں اضافہ شام کو ہو

بیسلی لینم 200

جب مریض ہمیشہ زکام میں مبتلا ہو

(کھانے سے پہلے صرف جمعہ کو)

برٹاکارب 200

کبھی بھی اس میں کمی واقعی نہ ہو

کھانے سے پہلے (صرف منگل کو)

آر سینی کم۔ کھانے کے ایک

جب ناک اور گلے سے پانی کی طرح کاجلندار اخراج ہو

گھنٹہ بعد

بیلڈونا۔ صبح، رات

جب زکام بال کٹانے کے بعد ہو

فیرم فاس 200

جب زکام کے ساتھ بخار بھی ہو

بعد ازاں نیٹرم میور 200۔

(ہفتہ وار خوراکیں دیں)

جیلیسی میم۔ کھانے کے بعد

بخار کے ساتھ فلو یا اس جیسی کیفیت

پیشیا۔ کھانے سے پہلے

بخار کے ساتھ زکام اور منہ سے بدبو آئے

حاذزلہ اور زکام اور کھانسی

چھٹکیں اور ناک اور آنکھوں سے پانی کا اخراج

ناک میں مزمن نزلہ۔ موسم سرما میں حلق کا نزلہ۔

کھنکھارنے کی مسلسل خواہش

جسٹیشیا 30

۱۔ یلیم سیپا۔ کھانے سے پہلے

کاربونیم سلفوریکم۔ صبح، رات

۲۔ پنٹھورم سڈیوڈس MT

(اس دوا کو کافی عرصہ استعمال کرنا چاہئے)

برائی اونیا۔ ہر تین گھنٹہ بعد

آر سینی کم۔ کھانے کے بعد

ہیٹلا۔ کھانے سے پہلے

فیلنڈر نیم 30

پیاں زیادہ جبکہ مریض ایک ہی دفعہ پانی پی جائے

پیاں زیادہ مگر مریض گھونٹ گھونٹ پانی پیے

جب رطوبت کا اخراج مشکل ہو

زکام جو سرد موسم میں بڑھے اور گرم موسم میں کم ہو

س

سانپ

زہریلے سانپ کے کاٹنے پر

سڈرن 200۔ ہر آدھ گھنٹے بعد

سانس

بدبودار

نکس و امیکا۔ رات

کالی فاس۔ صبح

کلکیریا کارب 200

مرکیورس۔ صبح، رات

مرکیورس۔ صبح، رات

ہیٹلا 200۔ کھانے کے بعد

ناک کے نتھنوں میں بہت زیادہ بدبودار

بدبودار جبکہ منہ میں کوئی تکلیف نہ ہو

بدبودار جبکہ سوڑھوں میں تکلیف ہو

بدبو جس کے بعد نزلہ ہو جائے

سانس لینا

جھکتے وقت، لیٹتے وقت یا ہوا کے خلاف
چلتے وقت سانس لینا مشکل ہو
سیڑھیاں چڑھتے وقت سانس لینا مشکل ہو
صبح سویرے سانس میں سیٹی بجنے کا احساس
کھانے کے بعد سانس میں تکلیف اور سانس رکنا
سانس لینا مشکل اور اینٹھن کے حملے
کھاتے یا پیتے ہوئے دم گھٹنا
کلکیر یا کارب۔ صبح، رات
آر سیٹکم کھانے کے بعد
لیکس 200
نکس و امیکا۔ کھانے سے پہلے
کیوپرم میٹ۔ چند خوراکیں ہر گھنٹہ بعد
میفاٹس۔ کھانے سے پہلے

سختی

بوڑھے اشخاص کے اعضاء میں سختی
گردن میں سختی۔ ایسا معلوم ہو کہ سر پیچھے
کی طرف جھک گیا ہو
فاسفورس 200۔ رات
رشاکس 200۔ صبح
سی سی فیوگا۔ صبح
انٹی مونیم ٹارٹ۔ رات (پوٹینسی 200)

سر

سر ہمیشہ پسینے سے شرابور۔ تکیہ پسینے سے بھر جائے
بال پسینے میں چکے ہوئے
سر میں اور سر پر برف جیسی ٹھنڈک
احساس کہ سر کا پچھلا حصہ برف کی طرح ٹھنڈا ہے
سر میں جلن، باقی جسم ٹھنڈا
احساس جیسا کہ کھیاں بھنھنار ہی ہوں
احساس جیسا کہ پیشانی پر جوڑوں کا قبضہ ہو
سر کا کانپنا جو مزمن ہو
کلکیر یا کارب
ریوم۔ صبح، رات
کلکیر یا کارب
جلسی میم۔ صبح، رات
آرنیکا۔ صبح، رات
شاہرس 30۔ صبح، رات
لیڈم پال۔ صبح، رات
انٹی مونیم ٹارٹ۔ صبح

سر کے ٹوٹنے کا احساس جس سے مریض ڈر جائے

میگنیشیافاس۔ رات

کالسیا۔ صبح، رات

کلکیریا فلور بھی مفید ہے

سکٹا۔ صبح، پہلا۔ رات

کلکیریا

سلیشیا۔ صبح، رات

سلفر 30۔ صبح

کلکیریا کارب۔ صبح، رات

سلفر 200۔ صبح

بیلاڈونا۔ 30 سے 1M تک

سپیا 30۔ صبح، رات

اگر افادہ نہ ہو تو لائیکوپوڈیم 30

سباڈلا 30۔ صبح، رات

سباڈلا 200۔ منگل اور جمعہ کو

جیلی میم 200

احساس جیسے سر تیر رہا ہو

سر کو نگار کھنے سے تکلیف میں افادہ

سر کو نگار کھنے سے تکلیف میں اضافہ

سر اور چہرے میں گرمی

سر کے اوپر والے حصے میں درد

سر کے اوپر والے حصے میں درد جبکہ پاؤں ٹھنڈے ہوں

سر گرم مگر ہاتھ پاؤں ٹھنڈے

غیر ارادی طور پر سر میں جھٹکے لگنا

سر میں خارش جس سے خون نکل آئے

سر میں چوٹیں

سر میں شور کا احساس

سر اب

سانپوں کا

لیک کینا۔ منہ۔ زیادہ سے زیادہ

چھ خوراکیں دیں

کینا بس انڈیکا 30

کھانے کے بعد

ہر چیز اپنے حجم سے زیادہ نظر آئے

فاصلہ طویل اور وقت بہت زیادہ معلوم ہو

سردرد
آدھے سر کا درد

آئرس 200- صبح
سائی کلیم 200- رات
ارجنٹیم نائٹرکیم 30

پیشانی میں درد جو نیچے اترنے سے شروع ہو اور

بعض اوقات سارا دن رہے

استری کرنے کے بعد سردرد

ناک بہنے سے سردرد کو آرام

سر کرنگار کھنے سے آرام

جھکنے سے سردرد میں افاقہ

سر کو ڈھانپنے سے درد میں آرام

سر کی چوٹی میں شدید درد

ہمیشہ کسی خاص دن درد ہو

خرید و فروخت سے پیدا شدہ سردرد

پریشان کر دینے والا درد۔ گردن کے مہروں

میں درد

چلنے پر سردرد

درد سر تاریکی میں اور لیٹ جانے سے بڑھ جائے

سردرد جو ہریدھ جمعرات اور جمعہ کو ہو۔ صبح سویرے

شروع ہو اور دوپہر تک رہے اس کے بعد آہستہ آہستہ

ختم ہو جائے

عموماً "سر کی چوٹی سے آنکھوں کے اوپر تک

سر کے بائیں جانب گولی مار درد جبکہ پیشاب زیادہ آئے

گھن گرج کی وجہ سے سردرد

سردرد اور ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے

برائی اونیا۔ 30

لیکس۔ 30

لائیکو پوڈیم 30

اگنیشیا 200

سلیشیا 30 اور اونچی طاقت

کلکیریا کارب 6 سے 30

سلفر 30- صبح (ایک ہفتہ)

ایپی ٹیکس 30

ہیلی بوریس 6

نیزم میور۔ صبح، رات

اونس موڈیم 1M

سینگونیریا 200- صبح

سائبرس 30- صبح، رات

فاسفورس۔ صبح، رات

وریولائیم۔ صبح، رات

غلاب آور ادویات کے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے ۱۔ سنگ ایسڈ 30
عصبی سردرد
(بار بار نہ دہرائیں بلکہ خوراک کے
اثر کا انتظار کریں)

سردی

مریض پیٹ میں سردی محسوس کرے
مریض معدہ میں سردی محسوس کرے
کمر میں درد۔ مریض سردی سے کانپے یا سردی سے
اس کے دانت بجیں

معدہ میں سردی اور درد
کھلی ہوا میں تکلیف میں زیادتی
کھلی ہوا میں تکلیف میں افادہ
ایسا معلوم ہو کہ سردی معدہ میں سرایت کر رہی ہے
کھلی ہوا میں کانپنا اور تکلیف میں بہت زیادہ اضافہ
سردی کی وجہ سے چھوٹی کمر میں درد۔ ایسا معلوم ہو جیسے
ہر ہڈی ٹوٹ رہی ہو۔

سردی ناقابل برداشت۔ گرم مکان میں بھی سردی لگے
۰ مپنی نیلا سیکسی فریگ
MT سے 30 تک

مریض کسی کھڑکی کو کھول دینے کو بھی برداشت نہ کر سکے
سردی اور سرد اشیاء سے تمام علامات کا بدھنا
آسانی سے سردی لگنا

سبڈالا 30
فریم فاس۔ صبح، رات
اگنیشیا۔ کھانے سے پہلے
مریض اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لئے
کپڑے اوڑھنا چاہیے مگر پھر بھی

- ٹھنڈی خوراک اور ٹھنڈے پانی کی طلب کرے
بیرونی طور پر سردی مگر جسم کے اندر گرمی محسوس ہو
اپیکاک 200 یا
جیلی میم 200- کھانے سے پہلے
جسم کو سردی محسوس ہو جبکہ چہرے کی رنگت زرد ہو
بیلادونا 200
یا سرگرم ہو
ہاتھوں اور پاؤں میں سردی جس کا مریض کو احساس نہ ہو
اپیکاک 200- کھانے سے پہلے
پرانی تکلیف میں سردی
کاربووٹیج- رات، لینڈم پال- صبح
ہر وقت سردی محسوس کرے اور آگ کے نزدیک
آر سینی کم- کھانے کے بعد
بیٹھنا چاہئے
پاؤں، گھٹنوں اور ہاتھوں کو سردی لگے اور یہ تکلیف
فاسفورس- کھانے کے بعد
بستر میں بھی ہوتی ہو
مریض سرد مزاج- سردی سے تکلیف کا بڑھنا
آر سینی کم 30
تکلیف کا سرد مرطوب موسم اور مرطوب جگہ میں
ڈکمار 30
رہنے سے پیدا ہوتا- نزلہ، زکام، کھانسی اور
اعصابی درد کا سردی سے بڑھنا
مریض حد سے زیادہ سرد مزاج، نزلہ، ہڈیوں میں اور
گریفائٹس 200
معدے میں درد کا سردی سے بڑھ جانا مگر جلدی تکلیف
کا گرمی سے بڑھنا
مریض سرد مزاج، معمولی سا ہوا کا جھونکا ناقابل برداشت
ہیرسلف 30
ٹھنڈی ہوا اور ٹھنڈے مشروبات سے تکلیف میں اضافہ
مریض گرم مزاج مگر معدے کی، کھانسی، حلق اور
لائیکوپوڈیم 30
سرکی تکلیفات کا سردی سے اضافہ
تمام جسم ٹھنڈا- کھلی ہوا ناقابل برداشت- کھانسی اور
نکس و امیکا 30

سر درد کا سردی سے بڑھ جانا

جسم پر سردی، سر میں سردی، معدہ ہاتھ پاؤں میں
فاسفورس 200
سردی، درد، کھانسی، اور دست کا سردی سے بڑھ جانا

اندرونی سردی، سردی سے، مرطوب، کھلی ہوا،
رشاکس 200
ہوا کے جھونکے، ٹھنڈا پانی پینے سے
تکلیف میں اضافہ

ٹھنڈا موسم۔ ٹھنڈا پانی اور سردی سے تکلیف میں اضافہ
سلیشیا 30
سردی اور گرمی دونوں ناقابل برداشت ٹھنڈی اشیاء
اپیکاک 30
پینے سے درد شکم میں اضافہ

سر خباو

ابھار نکلنے سے پہلے جب بخار کی ابتدا ہو۔
ایکونائٹ 30
بے چینی اور موت کا خوف ہو

چہرے پر جو دائیں سے بائیں طرف جائے
ایپس 30
سر خباو کا اکثر ہوتے رہنا
آرنیکا 30 یا 200
چہرے کا سر خباو خصوصاً "بائیں طرف جلد پر ابھار
لیکس 200
نہاں مگر سوزش

سرخ رنگ کی اور چمکتی ہو۔ مرض دماغ کی طرف
بیلادونا 30
بڑھ رہا ہو

رخساروں کا سر خباو خصوصاً "چہرے کے بائیں جانب
بوریکس 30 C3x
چہرے کا سر خباو جب بالوں کے نیچے تک جائے
چیلی ڈونیم 200
جب مریض جلد جلد ایک جگہ سے دوسری
ہیٹلا 30

جگہ ہٹ کر نمودار ہو۔ جب ابھار دب جائیں
تو بد ہضمی شروع ہو جائے

کینتھر س 30

آر سینی کم 30

سرخاب جس کے ساتھ خارش بھی ہو، بدن جلے
سرخاب کی سوزش جب پرانے ابھار دب جائیں
اور اس جگہ نئے ابھار نمودار ہونے لگیں

لیڈم 30

نکس و امیکا 30

ر شاکس 200'30

کیڑوں کے کاٹنے کی وجہ سے سرخاب
جب وجہ بد ہضمی ہو

جب ابھاروں سے خون نکلے اور

ابھار بڑے بڑے ہوں

سرطان

موٹاپا اور موٹاپے کا رجحان

فائٹولا کا 200- صبح، رات، روزانہ

طبیعت مضحل اور کاہلانہ، غدودوں کی سوجن

چہرے پر اداسی کے آثار، چہرہ زرد، جلد کا رنگ غیر صحتمندانہ ہائیڈرا سٹس 200

مریض آسانی سے تھک جائے۔ شدید قبض اور چڑچڑاپن کھانے سے پہلے

ہفتہ میں تین دن۔ ایک دن ناغہ کے ساتھ

آر سینی کم 200

مریض کمزور اور پتلا، چڑچڑا متفکر، خوف زدہ، مایوس

کھانے کے بعد ہفتہ میں دو دفعہ

بھوک کم، کمزور ہاضمہ، پیٹ میں شدید تکلیف

ہر تیسرے دن

کلکیریا فلور۔ ہلکا لادایا

ہڈی کا سرطان

فاسفورس۔ صبح، رات روزانہ

کو نیم 200، فائٹولا کا 200

چھاتی کا سرطان

(کبھی کبھی ہائیڈرا سٹس کا استعمال بھی کریں)

چھاتی یا کسی اور جگہ کا سرطان
جب کہ اُمّی رنگت نیلی ہو

ہونٹوں کا سرطان
جگر کا سرطان

جگر کا سرطان اور عام ڈراپسی

جگر کا سرطان جس کے ساتھ اسہال ہوں، جن میں
خون کی آمیزش ہو

سرطان کے درد کو کم کرنے کے لئے
گلے کا سرطان

زبان کا سرطان

مذی کے غدودوں کا آکلہ

جسم کے کسی حصے پر موٹے ابھار

پستانوں میں سخت گلیاں

سرطان جس سے سیاہ خون بے

سرطان جس سے اکثر خون نکلتا رہتا ہو

سرطان جس میں جلن دار یا تیز درد ہو

لیکس 200- صبح (روزانہ)

لیپس البم 200- صبح، کو نیم رات

چیلڈونیم 200 صبح (روزانہ)

کولیس ٹیرنیم 200 رات (روزانہ)

کارڈواس 200- صبح، رات

نائٹرک ایسڈ 200- صبح، رات

ارجنٹم نائٹرکیم 200

وائی اولادراٹا MT- صبح، رات

کالی سائی نٹم 200 (روزانہ)

صبح اور رات کو جمعہ کو نانہ

(ایسڈ میور 1x اور

ایسڈ نائٹرک بھی آزمائیں)

کیڈیم فلوریکا

تھوجا (آہستہ آہستہ 1M

تک استعمال کرائیں)

کلکیریا فلور- اس دوا کو 1M

تک استعمال کرائیں، فائٹولا کا 200

کروکس 200 روزانہ (جمعہ کو نانہ)

نائٹرک ایسڈ 200 صبح، رات

ہردو سرے دن (جمعہ کو نانہ)

ایپس یا آرسینی کم 200

وائی اولاد اور انا 200 کا استعمال

زیر غور آنا چاہئے

کیلنڈر 200 روزانہ

کھانے سے پہلے

سرطان جس میں خون کم یا زیادہ نکلے

(نوٹ) (۱) کینسر کے ہر کیس میں کارسینوسینم 200 ہر منگل اور جمعہ کو دیں۔ اور ان دنوں میں کوئی اور دوا استعمال نہ کرائیں۔ (یاد رہے اس دوا کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔) باقی ایام میں کالی سلف 6x (پانچ گرین) دن میں دو بار دو ہفتے تک اور اس کے بعد ہفتے میں چار دن روزانہ دو دفعہ دیں۔ (2) یاد رکھیں سرطان کے مرض میں کسی ایک دوا کا استعمال کارگر ثابت نہیں ہو سکتا۔ لہذا ضروری ہے کہ مریض کا قیام ڈاکٹر کے قریب ہو تاکہ ہر ہفتے علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے دوا کو تبدیل کیا جائے۔ مندرجہ ذیل ادویات بھی سرطان کے علاج میں سودمند ہیں
آر سینکم، ایسڈ میور، کلکیریا فلور، آئیوڈین، کیلنڈر، کارسینو سینم (کبھی کبھی 200 کی خوراک رات کو دیں)

سفر

کشتی، ریل، بس کے سفر کی وجہ سے متلی، قے وغیرہ سے سرچکرانا

ہوائی سفر سے تکلیف

کاکولس انڈیکا 30 اور

پٹرولیم 30۔ ہر گھنٹے بعد دہرائیں

بیلادونا 30 یا بوریکس 30

جہاز اڑنے سے پہلے دو تین خوراکیں دیں

پٹرولیم 30

بحری جہاز سے سفر میں تکلیف

سکتہ

آرنیکا۔ صبح، رات

اوپیم 30

چوٹ لگنے کے بعد سکتہ

سانس خراٹے دار۔ بے ہوشی

ایکونائٹ 30

شدید بے چینی

بے ہوشی اور تشنج۔ آنکھیں سر اور پتلیاں پھیلی ہوئی

بیلڈونا 30

بریشا کارب 30

بوڑھے لوگوں میں سکتہ

آرنیکا۔ ہر آدھ گھنٹے بعد

بوڑھے لوگوں میں سکتہ جو سر پر خون کا دباؤ ہو

یا بیلڈونا 30 یا فاسفورس 30

سکون

دماغی سکون کے لئے

نکس و امیکا 1M

کالی فاس 12x

ہائڈر نیچیا 30

گردوں کے درد میں سکون کے لئے

عام طور پر سکون کے لئے

میلز پرنس MT سسی سی فیوگا

اور ہائی پرکیم ہر ایک کے 5 قطرے

سگرٹ نوشی

خواہش روکنے کے لئے

کلاڈیم 200- صبح

شانی سیکیریا 200- رات (اول بدل کر)

نکس و امیکا 200

سوچنا

سوچنے سے تکلیف میں زیادتی

سوچنے سے تکلیف میں کمی

اوگزالک ایسڈ

کیمفر

سوزاک

تازہ سوزاک

اعضائے تناسل پر موچکے

چھونے سے درد میں اضافہ

مواد کے پک جانے پر پیپ کا رنگ گاڑھا

سبز ہو، جلن نہ ارد

پہلٹا 200

خواہش جناع بہت زیادہ۔ پیشاب کرتے وقت شدید جلن

کیتھر س 30

سلفر 200

ہاتھ پاؤں میں جلن

پیپ گاڑھی، سبز رنگ کی جبکہ جلن میں کوئی کمی نہ ہو

مرکیورس 1M یا CM

پہلٹا 200

سوزاک کی وجہ سے وجع المفاصل

سوکھاپن

بچوں میں سوکھے پن کی بیماری

کالی آئیوڈینم۔ صبح، رات

بیسسی لینم 200۔ کھانے کے بعد

ہر ماہ ایک خوراک

سوکھاپن ٹانگوں سے اوپر کو جائے یعنی گردن سے شروع ہو ابرا۔ ٹیم 30۔ صبح، رات

سوکھاپن اوپر سے نیچے ٹانگوں کی طرف آئے

نیرم میور۔ صبح، رات

آئیوڈینم 30

زیادہ بھوک کے باوجود سوکھاپن

کلکیریا فاس 6x

سوکھاپن کی وجہ سے بچہ بیٹھ نہیں سکتا اور جھک کر

دہرا ہو جائے

بریٹاکارب 200

بچے جو دماغی اور جسمانی دونوں طرح کمزور ہوں

ش

شب چراغ

کیلنڈولا MT 20 قطرے گرم پانی میں ڈال کر اچھی طرح صاف کریں۔

جلن بہت زیادہ۔ آدھی رات کے بعد تکلیف کا بڑھنا آرسینی کم

جلن کو گرم ٹکڑے سے آرام

(اگر آرسینی کم ناکام ہو جائے تو

انتھرا سینم 200 کا استعمال مفید ثابت ہو گا

لیکس 200

زخم کے گرد چھوٹی چھوٹی پھنسیاں، شدید جلن جسے

سرد پانی سے افادہ ہو، رنگ نیلی

جب پیپ پڑ جائے

زخم کو مندمل کرنے کے لئے

سلیشیا 6x

سلیشیا 200 یا 1M

ہیر سلف 1M

آرنیکا 200

پارو جینم 200

اگنیشیا MT

کیلنڈولا۔ کھانے سے پہلے

جب زخم گتے سڑنے لگے

جب زہر جسم میں پھیل جائے

کھلے اور ضدی زخم کے لئے

شریان

شریان سخت ہو جائیں

تمام شریانوں میں دھڑکن

کلکیریا فلور۔ صبح، رات

کالی کارب۔ صبح، رات

شک

شوہر کو بیوی پر اور بیوی کو شوہر پر ناجائز شک

لیکس 200

شور

مختلف قسم کی آوازیں خصوصاً "گر بنے اور گانے
جیسی آوازیں

گر بنے جیسی آوازیں جس کے ساتھ بہرہ پن ہو جبکہ
سماعت شور میں بہتر ہو

ص

صفرا

جب صفرا کے حملے کا امکان ہو
قبض کے ساتھ دائیں طرف درد، زبان جیسے چمڑے
کو صاف کیا گیا ہو

عزیز و اقربا پر شک کہ وہ زہر دینا چاہتے ہیں
لیکس 200

ط

طاعون

حفظ ماقدم
اگیشیا x 1 یا 30 اور پمکسینم 30

بائیں جانب کے غدود زیادہ پھولے ہوئے
لیکس 200

غدود سوجے ہوئے۔ شدید بے چینی
رٹاکس 30

جب نمونیا کے ساتھ واقع ہو
فاسفورس 30

جب بلغم کی زیادتی ہو
اینٹی مونیم ٹارٹ 200

تیز بخار اور ہزیان
بیلادونا 30 اور اوپچی طاقتیں

جسم کے تمام سوراخوں سے خون نکلے
کروٹیلیمس 30

طوفان

ناٹرک ایسڈ 200

سلیشیا 30

طوفان کے دوران تفکر

طوفان کی آمد پر بے ہوشی

طوفان کے دوران بہت زیادہ ڈر خصوصاً رات کے وقت نیرمور۔ کالی فاس
فکر اور بے چینی کی وجہ سے پسینہ آجائے جو مریض کو (ہر دو گھنٹے بعد دہرائیں)
بستر چھوڑنے پر مجبور کر دے

ع

عرق النساء

چوڑے گھٹنے تک گولی مارنے سی پھاڑتی ہوئی درد
جب تکلیف میں تین بجے بعد دوپہر زیادتی ہو
جب تکلیف میں زیادتی دوپہر کے بعد مگر درد والے حصے
حساس ہوں

بستر میں آرام کرتے وقت درد میں اضافہ
سرد مرطوب موسم میں درد میں زیادتی

رشاکس۔ کھانے سے پہلے
روٹا۔ کھانے سے پہلے
اگنیشیا۔ صبح، رات
برائی اونیا۔ صبح
رشاکس۔ رات
ٹانگ میں کبھی درد ہو کبھی سن ہو جائے
نیفا یلم 30

دردیں یک دم شروع ہوں۔ یکدم بند ہو جائیں
دردیں رات کے بارہ بجے کے بعد شروع ہوں
دردوں کو ٹکڑوں سے آرام ہو

انگیوں کے جوڑوں پر گانٹھیں اور ہاتھ مڑ مڑ کر
بد شکل ہو گئے ہوں
امونیم فاسفوریکم 3x

(بہتر ہے کہ عرق النساء کے ہر کیس میں نیفا یلم 200 کا استعمال ضرور کروائیں)

غ

غدد

حاد سوزش

بیلاڈونا۔ مرکورس، بریٹاکارب میں

کوئی ایک ہر گھنٹے بعد دہرائیں

سفلی نم 200

ہیپر سلف

سورائیم 200

کلکیریا فلور۔ کھانے سے پہلے

فائٹولا کا۔ کھانے کے بعد

مرکیورس 200 یا کالی میور 6x

کلکیریا فلور یا فائٹولا کا (پوٹینسی 200)

بیسلی لینم 200 کھانے کے بعد

کلکیریا فاس کھانے کے بعد

کلکیریا فاس۔ کھانے سے پہلے

سلیشیا۔ کھانے سے پہلے

عذہ مشانہ کی تکالیف۔ عذہ بڑھا ہوا۔ پیشاب مشکل سے آئے بل سیرو لینا 3x

جب سراور گردن کے غدد میں سخت سوزش ہو

حاد سوزش جبکہ پیپ پڑ جائے

غدد پر ابھار جبکہ جلدی مرض بھی ساتھ ہو

گردن یا پستانوں پر غددوں میں سختی جن میں

پیپ پڑنے کا خطرہ ہو

سوجن

سخت غدد اور سوجن

سوجن جبکہ مرض مزمن ہو

سرد پانی سے دھونے پر افاتہ

گرم پانی سے دھونے پر افاتہ

غم

غم کے اثرات

اگنیشیا (صبح) یا کالی فاس (رات)

غصہ

غصے کے دورے۔ غصہ بہت آتا ہے
جب غصے کی وجہ سے بخار چڑھ جائے
غصہ جس سے یرقان ہو جائے
غصہ کی وجہ سے مریض اپنے سے باہر ہو جائے
نکس دامیکا۔ کھانے کے بعد
ایکونائٹ 30
نکس دامیکا۔ رات
چیلی ڈونیم۔ کھانے کے بعد
شانی سیگیرا۔ صبح
غصہ کی وجہ سے زرد کو ب بھی کرے اور بعد میں افسوس بھی کرے کروکس 30
چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہ ہو۔ شدید غصہ
ٹوبر کو لینم 200

ف

فلج

چہرے کا فلج جو سردی لگنے سے واقع ہو
بازوؤں کا فلج خصوصاً "بایاں بازو
آنکھوں کے پٹھوں کا فلج
کانپے والا فلج
روٹا، جیلی میم۔ رات
کلکیریا کارب۔ کھانے سے پہلے
آرنیکا۔ کھانے سے پہلے
کالی فاس 200 یا مرک سال 200 صبح
(اول بدل کر)

میگنیشیا فاس 200۔ رات

تمام قسم کے فلج جو پانی بھیگ جانے سے واقع ہوئے ہوں رشاکس 200

ضجرہ کا فلج، زبان کا فلج، مثانہ کا فلج کاشی کم 200

فلج اور غنودگی جیلی میم 200

فلج اور عضو سوکھتا چلا جائے پلمیم 30

دماغ سے خون گرنے کے بعد فلج برٹیا کارب 200

(نوٹ) فلج کا علاج شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ آرنیکا 200 کھانے سے پہلے تین دن تک دیں۔ اس

کے بعد جیلی میم 200 اور کالی فاس 200 دو ہفتے تک استعمال کروائیں۔ بعد ازاں حسب علامات

فکر

جاگنے پر فکر

مستقبل کے بارے میں فکر

3 بجے صبح

صبح کے وقت

4 بجے اور 8 بجے کے درمیان

حیض کے بعد

حیض سے پہلے یا حیض کے دوران

مختلف خیالات کی وجہ سے

فکر اور موت کا ڈر۔ سوتے وقت اور اکیلا ہونے پر فکر

شام کو

فکر جس کے بعد مریض چیخ پڑے

ہسٹیریا کے ساتھ

رات کو بائیں طرف لیٹنے پر

سیرھیاں چڑھتے ہوئے مریض فکر مند ہو جائے

جب مریض سے کوئی توقعات وابستہ ہوں

جب کہ اس کی ابتدا معدہ کی خرابی کی وجہ سے ہو

لگاتار فکر کا شکار

سلفر۔ صبح یکس۔ رات

کلکیریا کارب۔ صبح، فاسفورس۔ رات

آرسینی کم البم۔ کھانے کے بعد

آرسینی کم۔ کھانے کے بعد فاسفورس۔ صبح

لائیکو پوڈیم۔ صبح

کاکولس 200 یا فاسفورس۔ کھانے کے بعد

نیٹرم میور۔ کھانے کے بعد

کلکیریا کارب۔ صبح، رات

آرسینی کم۔ کھانے کے بعد

کلکیریا کارب۔ صبح، سپیا۔ رات

نیٹرم میور۔ کھانے کے بعد

اگنیشیا۔ کھانے کے بعد

فاسفورس۔ صبح

ٹائٹرک ایسڈ کھانے کے بعد

آرسینی کم یا

برٹاکا کارب کھانے کے بعد

فاسفورس۔ کھانے کے بعد

کونیم 200۔ کھانے کے بعد

فکر مند

اندھیرے یا رات کی روشنی میں فکر مند
فکر مندانہ دماغی کیفیت

فاسفورس 200- کھانے کے بعد
سلفر 30- کھانے کے بعد

ق

قبض

علاج شروع کرنے سے پہلے

جب علامات واضح نہ ہو

پاخانہ کھڑے ہو کر کر سکے

صرف پیشاب کرتے ہوئے پاخانہ کر سکے

بچوں کی قبض

جب انتڑیاں غیر فعال ہو جائیں

پاخانہ پرورد اور مشکل سے خارج ہو

پاخانہ کا اخراج ہمیشہ مشکل

ہفتہ ہفتہ پاخانہ کی خواہش ہی نہ ہو

میگنیوں والا پاخانہ

پاخانہ واپس چلا جائے

قبض جبکہ پاخانہ ہر چار دن کے بعد آئے

پاخانہ کرتے وقت پیشانی اور چہرے پر پسینہ

دائمی قبض خصوصاً بچوں میں

قبض اور پاخانہ کرتے وقت کانپنا

نرم پاخانہ بھی تھوڑی مقدار میں اور وقت سے خارج ہو

سفر کرنے کے بعد قبض

سلفر 30- صبح، ناکس و امیہ کا 30- رات

سلفر 30 (چند ہفتے)

کاسٹی کم 30- رات (ایک ہفتہ کے لئے)

ایلو ز- صبح، رات

سینی کیولا- رات (ایک ہفتہ کے لئے)

میگنیشیا کارب- صبح، رات

ناٹرک ایسڈ- صبح، رات

نیٹرم میور- صبح، رات

اوپیم 200

ہلمیم 200

سلیشیا 200- رات کو

سینی کیولایا ہلمیم- صبح، رات

ورنیٹرم الیم 30

ریوم- کھانے کے بعد

ایلو مینا 200- کھانے سے پہلے

پلائینا 200

قوت شامہ

قوت شامہ ندارد

کلکیر یا کارب۔ صبح

میگنیشیا میور۔ رات

ریوم۔ صبح، رات

کالچیکم۔ صبح، رات

جسم سے کھٹی بو

کھانے کے پکنے کی خوشبو سے زبردست متلی

قونج

مریض کو دہرا ہونے سے اور کسی سخت چیز

پر پیٹ رکھنے سے آرام اور پیٹ میں

گیس

کالوسنتھ 200

چند خوراکیں ہر گھنٹے بعد

بعد ازاں کالی فاس 200

میگنیشیا فاس 6x کھانے سے پہلے

کالی فاس 6x کھانے کے بعد

شانی سیکریا 30

کھانے سے پہلے

ڈائیکوریا 200

کالوسنتھ 200

کلکیر یا فاس 6x۔ صبح

نیٹرم فاس 6x۔ رات

وہ مریض جن کے دانت کالے ہونے لگے ہوں یا

سر ہونے لگے ہوں

پچھے جھکنے سے افادہ

آگے جھکنے سے اور پیٹ کو ٹکڑے دینے سے آرام

بچوں میں جو دانت نکال رہے ہوں

اور جن کے پاخانے کا رنگ سبز ہو یا جن سے

کھٹی بو آئے

شانم۔ کھانے کے بعد

بچوں میں جو ہر وقت اٹھانے کی ضد کریں اور اپنے

پیٹ کو اٹھانے والے کے کندھے پر لگائے رکھیں

بودشا 200 (ہر گھنٹہ بعد)

ہلمیم 30

شدید درد۔ سخت سردی کا احساس جس میں دانت بچیں

جبکہ شدید قبض ہو

بچوں میں کیڑوں کی وجہ سے

بچوں کا شدید پیٹ درد

سانا 30

کیمو ملا 30، بیلاڈونا 30

(باری باری دیں)

قے

علامات کے واضح نہ ہونے پر

اپیکاک 30

اپیکاک 30

متلی ہی متلی۔ قے میں خوراک خارج ہو۔ زبان سرخ ہو

کلکیریا کارب۔ صبح، رات

دودھ پینے کے فوراً بعد بچہ دودھ قے کر دے

جس میں ترش بو ہو۔

انٹی مونیم کروڈم۔ صبح، رات

جب زبان پر سفید موٹی تہ ہو۔

روبی نیا 30

جب کھٹی قے آئے

ایتھوزا 30

جب بچوں میں دودھ پینے کے بعد قے ہو جس میں دودھ

خارج ہو جائے اور اس کے بعد وہ سو جائیں

حمل کے دوران یا پسٹیریا میں قے

کریا زونم

ہیما ملیس

سیاہ خون کی قے

کیڈمیم سلف

سیاہ رنگ کی قے

ملی فولیم

سرخ خون کی قے

شانم

خون کی قے (معدہ سے)

آرنیکا 30

سر پر چوٹ کی وجہ سے قے

کاکولس 30

جہاز (بحری) کشتی، بس، ٹرین یا کار میں قے

فاسفورس 30

ٹھنڈا پانی معدہ میں جا کر گرم ہونے کے بعد قے

ٹھنڈے پانی کی شدید خواہش

بیلاڈونا 30

دماغی تکلیف کی وجہ سے قے

آئرس وری کالر 30

شدید کھٹی قے جس سے دانت تک کھٹے ہو جائیں

کار میں پٹرول کی بوتل سے تے
ماں کے دودھ سے تے اور اسہال

پٹرولیم 30
سلیشیا 30

ک

کالی کھانسی

خشک کھانسی۔ بلغم باہر نہ نکلے۔ کھانسنے کے بعد
تے آدھی رات کے بعد تکلیف میں اضافہ
کھانسی جس کے ساتھ ناک سے خون نکلے، تھوک میں
خون آئے

برائے کوی کھانسی۔ چھاتی میں آوازیں۔ غصہ کی
وجہ سے کھانسی

لبا پسدار بلغم۔ بلغم کا رنگ زرد

جب دورے اس قدر جلدی سے ہوں کہ مریض کو
سانس بھی نہ لینے دیں۔

جب بلغم کا رنگ سفید ہو

(نوٹ) مرض کی ابتدا میں کینیا و مکا MT کو کیول 30 یا ڈروسرا 30 ضرور استعمال کروائیں۔

رات کے بارہ بجے کے بعد دورے

ڈروسرا 30

کارنبکل دیکھیے ”شب چراغ“

کان

کانوں میں گھنٹال بجنے کی آوازیں

نیرم سلف۔ صبح

میگنیشیا کارب۔ رات

کانوں میں درد اور جلن، شہد کی مکھیوں جیسی آواز

سینکڑوں نیریا 200

چہرہ سرخ، سرہ پن

بھنھناہٹ جیسے کان میں کیڑے ہوں

لیکس 200

بھنھناہٹ

ایسا معلوم ہو جیسے کان بند ہو گیا ہو

سورائیم۔ صبح، میگنیشیا کارب۔ رات

نیٹرم کارب۔ صبح

میگنیشیا کارب۔ رات

سلیشیا۔ صبح، رات

ایسا معلوم ہو جیسے کان میں کوئی زندہ چیز موجود ہو

ایلو

گلاس کے ٹوٹنے جیسی کڑکڑاہٹ

مزمن سوزش، سوزش اور پیپ کا اخراج

مزمن آوازیں (کسی قسم کی بھی)

سلفر IM کھانے کے بعد

ہر ماہ کی پہلی کو دس دن

اور بیس دن بعد میگنیشیا کارب IM

کالی سلف۔ کھانے سے پہلے

پہلٹا۔ کھانے سے پہلے

کاربووٹیج۔ کھانے سے پہلے

پہلٹا۔ صبح، کیموٹا۔ رات

کانوں کے نیچے کاٹتی ہوئی دردیں

خرہ کے بعد کانوں سے پیلا سبز اخراج

کان سے اخراج اور شام کو درد میں اضافہ

بچوں کا کان درد

میگنیشیا کارب۔ کھانے کے بعد

کپسکیم۔ کھانے سے پہلے

کالی آئیوڈینم

پہلٹا۔ صبح، رات

لیکس 200

کوئیم۔ صبح، رات

بستر میں جانے کے فوراً بعد کانوں میں دھماکے جیسی آواز

کانوں سے گلے تک درد

کان میں گھنٹی جیسی آوازیں

کان میں کالے رنگ کی میل

کان میں زرد سفید رنگ کی میل

کان میں سرخ رنگ کی میل

کلی آنت کا ورم دیکھئے ”اڻڌی سائٽس“

کانڀنا

سرديءَ کي بعد اکر اڻڀٽ يا سختي اعضاء	کيمفر۔ هر آدھي گھنٽي کي بعد
اعضاء سي شروع هو کر تمام جسم ميں کيکيا ڀٽ	ايکونائٽ 30
اگر جسم ٽھنڊا هو اور رنگ پيلا پڙگيا هو	کاربووٽيچ 30
گيلا هو جانے کي وجه سي	ڊاڪٽار 200
ٽھنڊي مشروبات پيئنے سي جبکہ جسم گرم هو	بيس 30
سوتے وقت کيکيا ڀٽ	ٽوبر کو ليئم 200
اندر سي ڏر کي وجه سي کانڀنا جب مريض موٽا هو	کلکيريا کارب
اندر وٺي طور پر بيجاني کيفيت	رشاڪس۔ کھانے سي پہلے يا
	کالوفائيلم (کھانے سي پہلے)
تمام جسم کاندر وٺي طور پر کانڀنا	کليريا کارب 200
کثرت جماع کي وجه سي کانڀنا	فاسفورس 200 (هر منگل اور جمعہ کو)

کانڻا

چوہے، کٽوڻ يا مچھروں کا کانڻا	ليڊم پال يا ڀائي پرکيم يا ليڪس
	هر آدھي گھنٽي بعد۔ کٽي کي زخم کو
	فور اڇير اڊي دينا چاهئے

کانچ ٺڪلنا

ميتھس کي ساٿھ	مرکيورس سل 30
اگر خون زياده اور آؤں کم هو	مرک کار 30

جب تیز چا تو لگنے کا سادرد جو مقعد سے اوپر کو جائے
 قبض اور کانچ نکلنا
 اگنیشیا 30
 نکس و امیکا 200
 پاخانہ کے ساتھ کانچ نکلنا
 پوڈوفانیلم 30
 (یہ کلیدی دوا ہے)
 جب کوئی دوا اثر نہ کرے
 لائیکو پوڈیم 30
 اگر خون آئے
 فاسفورس 200
 ان بچوں میں جو رات کو خواب دیکھیں
 ایکونائٹ 6
 مزمن کیسوں میں
 سلفر

کٹی پھٹی جگہ
 کٹی پھٹی جگہ مثلاً ہاتھوں کی جلد میں
 گریفائٹس۔ کھانے سے پہلے
 مقعد میں انگلیوں کے پور۔ پوٹوں کے اطراف کٹے پھٹے
 نیٹرم کارب۔ کھانے کے بعد
 جوڑ کٹے پھٹے

لکڑے
 لکڑے
 ار جنتیم تاثریکم IM ہر پندرہ دن بعد
 بیسی لینم IM کبھی کبھی

کمردرد "دیکھئے درد کمر"

کمزوری باہ
 خواہش کی کمی
 (نامردی بھی دیکھئے)
 اگنیشیا 200
 اگر یکس 200
 کثرت جماع کے بد اثرات

قوت باہ مکمل طور پر غائب
اگنس کاسٹس 200

کثرت جماع کے بعد اعصابی کمزوری
ایونیا شائیو MT

کثرت جماع اور مشت زنی کے مریض جن کا پیشاب لسی
ایسڈ فاس MT
کی طرح سفید ہو اور انہیں رات کو پیشاب کے لئے
(مزمن کیسوں میں IM) اٹھنا پڑے

جماع کے بعد جسمانی اور دماغی کمزوری خصوصاً

موٹے اشخاص میں

خواہش بہت زیادہ مگر عملاً صفر

خود اعتمادی کا فقدان

جنسی خواہشات کے دب جانے کے بد اثرات

عمر رسیدہ اشخاص میں مکمل نامردی

دماغ ہر وقت جنسی خیالات میں پھنسا ہوا

عورت یا مرد میں خواہش جماع قطعاً مفقود

اور سرعت انزال

مشت زنی کی عادت کو چھڑانے کے لئے

شدید خواہش جماع

جب فوطے سکڑ جائیں

جماع کے دوران سرعت انزال

جماع کی حد سے زیادہ نفرت اگر جماع کے لئے

کہا جائے تو مزاج بگڑ جائے

دیکھئے ”بھس“

کمی خون

کن پیڑے

عام طور پر (حفظ ماتقدم)

پیروٹی ڈنیم۔ کھانے سے پہلے

یا کالی میو یا پھلٹا

بیلڈوٹا 30۔ صبح، رات

جب سوجن دائیں طرف ہو اور بخار ہو

منہ خشک، چہرہ سرخ

مریکورس 200

منہ سے بدبو۔ رال کا بہت زیادہ بہنا

جب لڑکوں میں خضے اور لڑکیوں میں پستان متورم ہو جائیں پھلٹا 200

کندھا

بازو کو اٹھاتے یا حرکت دیتے وقت کڑکڑاہٹ

سوجن۔ سختی یا بے حرکتی

کالی کارب۔ صبح

سلیشیا۔ رات

کالی کارب۔ صبح

سینگونیریا۔ رات

بائیں کندھے میں پھاڑتی ہوئی دردیں

دائیں کندھے میں پھاڑتی ہوئی دردیں

کلکیریا کارب یا چیلی ڈنیم۔ صبح، رات

کننی

درد، موج کا احساس، ہاتھ کی الٹی طرف درد

روٹا 30۔ کھانے کے بعد

کینسر

”دیکھئے سرطان“

کھانسی

خسرہ کے بعد

کالی کھانسی

سکٹایا پلٹلا۔ کھانے سے پہلے

ڈرو سرا۔ صبح، رات

بچے کی کھانسی جو صرف سورج غروب ہونے کے بعد ہو سکٹایا پلٹلا۔ صبح، رات

سردی لگ جانے سے کھانسی جو کالی کھانسی میں تبدیل ہو جائے سیٹگو نیریا۔ کھانے سے پہلے

ڈرو سرا۔ کھانے کے بعد

سلفر۔ صبح، کالی کارب۔ رات

یا فاسفورس۔ صبح، رات

کیولا 30

اگنیشیا یا کالی فاس

ہائیو سائمس 30۔

صبح، رات

فاسفورس۔ صبح، رات

پلٹلا۔ کھانے کے بعد

سینکلا۔ صبح

کالی کارب۔ کھانے سے پہلے

ریوکس۔ صبح، رات

ڈرو سرا 30۔ صبح

کالی بائیکرو میکم 30۔ رات

اپی کاک 30۔ صبح، رات

اینٹی مونیم ٹارٹ 30

بچوں کی خشک کھانسی جو رات کو بڑھ جائے

اعصابی کھانسی

اعصابی خشک کھانسی جو رات کو واقع ہو اور

لیٹنے سے بڑھ جائے

خشک کھانسی اور چھاتی میں جکڑن

خشک کھانسی جس کی وجہ سے بستر میں اٹھ کر بیٹھنا پڑے

کھانسی جو چھینکوں پر ختم ہو

کھانے وقت بلغم منہ سے اڑ کر باہر نکلے جبکہ

گرم کمرے میں اضافہ ہو

کھانے وقت ہاتھ ٹھنڈے مگر جسم گرم ہو

کھانسی کی وجہ سے قے ہو جائے

کھانسی کے ابتدائی مراحل۔ خرخراہٹ کے ساتھ

اور مریض مضبوط ہو

کھانسی خرخراہٹ کے ساتھ جبکہ مرض کی انتہا ہو اور

اور مریض مخیف ہو گیا ہو

رات کو خشک کھانسی اور دن کو بلغم کے ساتھ

صبح، رات

کلکیر کارب 200- صبح

(ایک ہفتہ کے لئے)

لگاتار جبکہ منہ میں تانبے جیسے ذائقہ خصوصاً "بوڑھے

مریضوں میں

کبھی کبھی مگر تنگ کرنے والی کھانسی

سینگا- کھانے سے پہلے

(نچی پوٹینسی استعمال کریں)

نکس و امیکا 30- کھانے کے بعد

ڈرو سرا 30- صبح، رات

جب مریض کھانتے وقت دونوں ہاتھوں سے چھاتی کو پکڑے ڈرو سرا 200

نیٹرم میور 200- صبح، رات

کھانتے وقت آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا

(تین دن تک)

ڈرو سرا- صبح، رات

لیکس 200

کھانسی کے خاتمے پر بلغم کا اخراج

مریض کھانسی کی وجہ سے اٹھ جائے اور سانس بند ہو

جانے کا احساس

نیٹرم سلف 200

چھاتی میں خالی پن کا احساس- مریض درد کی وجہ

کھانے کے بعد- صرف چھ خوراکیں

سے چھاتی کو پکڑے

کاربووٹیج- بار بار دھرائیں

جب کھانسی مشکل سانس کے ساتھ ہو

ریو مکس 200- صبح، رات

کھانسی کے ساتھ بائیں پستان کے نیچے درد

ہیر سلف- صبح، رات

کھانسی صرف صبح سویرے جس کے ساتھ بلغم آئے

میگنیشیا فاس 30- صبح، رات

کھانسی نمکین بلغم کے ساتھ- خشک تشنجی کھانسی

ریو مکس 200- صبح، رات

گلے میں گدگدی جس سے کھانسی پیدا ہو

سپا نجیا 200

کھانسی آرے کی آواز کی طرح- سونے پر دم گھٹتا ہو

کیوپرم میٹلیکم 200- صبح

کالی کھانسی میں تمام جسم کا اکڑ جانا

کو نیم 30 کھانے کے بعد

لیٹنے پر کھانسی میں اضافہ

زیادہ بولنے یا اونچی آواز میں پڑھنے سے اضافہ	میفائٹس 30- صبح، رات
لباساں لینے سے کھانسی میں اضافہ	کوئیم 30- کھانے کے بعد
ہاتھوں یا گھٹوں پر جھکنے سے آرام	یوپیڈوریم پرف 200- صبح، رات
صرف معدہ کے بل لینے سے آفاقہ	میڈورنیم 200
تین اور پانچ بجے کے درمیان کھانسی میں اضافہ	کالی کارب 30
خشک کھانسی۔ آدھی رات کے بعد تکلیف میں اضافہ	آر سینی کم البم 30
	(کھانے کے بعد)
جب مریض بالغم اخراج کرنے کے قابل نہ ہو	کاشی کم 30
جب ٹھنڈا پانی سے آرام ہو	کاشی کم 30
جب کھانسی میں خوراک کی قے ہو	فیرم میٹ 30
کھانتے وقت مریض دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑے	کاشی کم
اور چیخ پڑے	
انفونزہ میں کھانسی	کاشی کم یا یوپیڈوریم پرف یا رشاکس
ضدی کھانسی۔ زیادہ تر خشک	
بائیں طرف چھاتی کے اوپر والے حصے میں درد	مرٹس 30
کیڑے	
ہر قسم کے کیڑوں کی تکلیف میں	کیوپرم آکسائی ڈیٹیم ٹائیگرم 1x
پاخانہ میں نکلیں۔ کیڑوں کی وجہ سے کانپنا	سباڈلا۔ کھانے سے پہلے
یا پھڑپھڑانا	
گیس کے ساتھ مریض ناک میں انگلی مار رہے	نیٹرم فاس۔ کھانے کے بعد
پاخانہ کرتے وقت درد۔ رات کو نیند نہ آئے	سباڈلا 30- رات یا

چائنا 30- رات

کیوملا 30

بیلادونا 30 (باری باری)

شیم 30

سائنا 30- اگر آرام نہ آئے

تو سکیوٹا 30 دیں

سنٹونائن 3x

آئیوڈیم 3x

بیسسی لینم 200 ہر جمعہ کو

نیٹرم سلف 200 ہر منگل کو

کالی برومائٹم 30 یا

ریڈیم 30- ہفتہ میں ایک بار

ہیپر سلف یا کاربوووج 30 (ایک ہفتہ تک)

اینٹی مونیسم کروڈم 200

(کھانے کے بعد ہر اتوار کو)

درمیان میں سلفر 200 کھانے کے بعد

ہائیڈروکونائل

پلسٹا 30

لائیکوپوڈیم یا نکس دامیکا 200

کیڑوں کی وجہ سے بچوں کے پیٹ میں مروڑ یا درد

جب بچہ کسی سخت چیز پر پیٹ کو دبائے

کیڑوں کی وجہ سے بچے میں تشنج

پیٹ میں کیڑے

مزمن علامات

کیل

اگر مرض پرانا ہو

دموی مزاج مریض کے لئے

چمکدار سرخی- سب سے پہلے ابھارناک پر

بعد ازاں ناک کی دوسری طرف اور گالوں پر

جب فتور رحم اس کا موجب ہو

ماہواری کی خرابی کی وجہ سے کیل جبکہ چہرہ زرد ہو

گالی گلوچ

گالیاں بکنا- گالی گلوچ کی عادت

کھانے کے بعد۔ صرف دو دن دیں

گردن

اکڑی ہوئی

گردن پر غدودی رسولی جس میں پیپ پڑ جائے

اور زخم میں تبدیل ہو جائے

گردن میں اچانک اکڑاؤ جبکہ غدودوں میں زخم ہو

یا نہ ہو مگر ان سے بدبودار کالے رنگ کا مواد

خارج ہو

گردن کے پچھلے حصے میں وجع المفاصلی اکڑاؤ۔

رٹاکس 200 صبح

سر کو گھمانے پر درد جو کبھی کبھی کندھوں کے درمیان تک جائے

گردن کی گدی (پچھلے حصے) میں سختی

درد گدی سے نیچے کمر تک جائے

گردن کی گدی اور سر کی چوٹی ٹھنڈی

گردن کی گدی سخت اور درد پیٹھ تک جائے

چلتے وقت سختی میں تکلیف زیادہ

بیچ پر جانے سے گھبراہٹ

کاربووتج۔ کھانے سے پہلے

سی سی فیوگا۔ کھانے کے بعد

چیلڈونیم۔ کھانے سے پہلے

کالی کارب۔ کھانے سے پہلے

برائی او نیا۔ کھانے سے پہلے

اناکارڈیم۔ کھانے سے پہلے

جیلی میم۔ کھانے کے بعد

گردے

گردوں میں اور ان کے ارد گرد درد

کلکیریا سلف 200

صبح، رات

ہنستے وقت درد

کینائس انڈیکا 30- صبح، رات

سوزش۔ پیشاب کم آئے

کینتھرس یا ایپس 30- صبح، رات

پیشاب میں خون اور ایسوس

ٹیری بن تھینا 30- صبح، رات

آنکھوں کے نیچے سوجن۔ پیاس ندارد

ایپس 30

چہرے پر سوجن گردوں کی خرابی کے ساتھ

آر سینی کم البم۔ کھانے کے بعد

پیاس بہت زیادہ مگر پانی گھونٹ گھونٹ پیئے

آر ٹیکا یورنس MT- دن میں دو مرتبہ

گردوں میں پتھری کو روکنے کے لئے

کلکیریا۔ یلس MT دن میں ایک

گردوں کے مقام پر متواتر درد

بربرس 200

گردوں کی قولنجی درد

سرپرلا 30- صبح، رات

درد گردہ جو پیچھے کی طرف جائے

ٹیری بن تھینا 30

گرم

گرم ہونے کے بعد سرد پانی پینے سے بدنتائج

نیٹرم کارب 30- صبح، رات

گرمی میں سن سٹروک کے مزمن اثر کے باعث سرد درد

نیٹرم کارب 30- صبح، رات

گرمی

مریض از حد گرمی مزاج، گرم مکان میں اور گرم

پہلٹا 200 (چند دن)

غذا سے تکلیف میں اضافہ۔ ہر قسم کی گرمی سے

تکلیف عموماً بڑھ جاتی ہے

سکیل کار 30

گرمی ناقابل برداشت۔ مریض گرمی کی وجہ سے

تمام کپڑے اتار دیتا ہے۔

انٹی مونیم ٹارٹ 30

سر کی علامات کا گرمی سے بڑھنا۔ کھانسی گرم پانی

سے بڑھ جائے۔ بستر میں گرمی سے تکلیف کا بڑھنا

گرم ہو اور گرم مکان میں تکلیف میں اضافہ

چولہے کی گرمی میں کھجلی۔ درد دانت کا

گرمی سے بڑھنا

از حد گرم مزاج مریض مریض کپڑے اتار دے

گرم مکان میں بستر کی گرمی سے سورج کی گرمی سے اضافہ صبح ہر جمعہ ایک خوراک

گرمی کی حد درجہ ذکی الحسی درد سر، گلسوئے۔

درد دانت کے بائی کے درد، خارش، کھجلی کا

گرمی سے بڑھ جانا

موسم گرما میں تکلیف میں اضافہ دھوپ سے تکلیف

نیرم میور 30

گلا

نزلہ اور زکام کی وجہ سے گلا بیٹھنا

خصوصاً صبح کے وقت

شام کے وقت

کاشی کم 30۔ کھانے کے بعد

کاربووٹیج 30، فاسفورس 30

کھانے کے بعد

فاسفورس 30۔ صبح، رات

ڈکھارا 30

آرنیکا 30

اپیکاک 30۔ صبح، رات

کلکیریا فلور۔ صبح، رات

کلکیریا فاس۔ کھانے کے بعد

بیلارڈونا 30

گلا بیٹھنے کی مزمن شکایت، گلا پر درد

نمدار موسم میں گلا بیٹھنا

آواز کے زیادہ استعمال سے گلا بیٹھنا

مکمل طور پر گلا بیٹھنا

ہنٹے یا اونچا بولنے یا پڑھنے سے گلا بیٹھنا

گلے میں جلن، گلا صاف کرنے کے لئے متواتر کھکھناہٹ

گلا بہت پر درد

گلے پڑنا ”دیکھئے ٹانسائٹس“

گلہڑ

سخت قسم کے گلہڑ میاہ فام لوگوں میں

آئیوڈیم 3x

گنٹھیا

حاد

حاد جبکہ درد جوڑ سے جوڑ میں منتقل ہوتی ہو

ارٹیکالورنس MT کھانے کے بعد

پہلا 30- کھانے سے پہلے

کالی بائیکرو میکم 30- کھانے کے بعد

نیرم فاس- صبح

کاچھیکم- رات

امونیم فاس 3x

حاد- پاؤں میں

مزمن خصوصاً ”جب انگلیوں کے جوڑوں پر گانٹھیں
بن گئی ہوں اور ہاتھ مڑ کر بد شکل ہو گئے ہوں

گھٹن

جب گلے میں بلغم ہو

کاربووٹیج 30

گھٹنے

بستر میں ٹھنڈے- ہاتھ اور پاؤں بھی ٹھنڈے

گھٹنوں میں مائع- پردرد گھر میں کام کرنے والی

عورت کے گھٹنوں میں درد

گھٹنوں کا اگلا حصہ نرم جھکتے ہوئے درد

فاسفورس- صبح رات

سکٹل- صبح رات

بروس- صبح

کلی کارب- رات

سکٹا۔ صبح، رات

گھٹنوں میں مائع۔ پر درد، گھر میں کام کرنے والی

عورت کے گھٹنوں میں درد

بربرس۔ صبح

گھٹنوں کا اگلا حصہ نرم، جھکتے ہوئے درد

کالی کارب۔ رات

اینٹی موئیم ٹارٹ۔ صبح، رات

صبح بستر میں گھٹنوں کے جوڑوں میں درد اور کمزوری

ہائی پرکیم۔ صبح، رات

گھٹنوں میں تیز درد۔ چھونے سے درد زیادہ

ہائی پرکیم۔ صبح، رات

گھٹنوں کے جوڑوں میں درد

کالی کارب۔ صبح

سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے یا اترتے ہوئے تکلیف

جیلی میم۔ رات

فاسفورس۔ صبح، رات

سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے درد

اگنیشیا۔ صبح، رات

گھٹنے گرم مگر ناک ٹھنڈا

لیڈم پال۔ صبح، رات

جوڑ، چوڑوں کے جوڑ ٹخنوں کے جوڑ

گھٹنوں میں گھٹاوی درد، چلنے سے اور

بستر میں تکلیف میں اضافہ

گھسیکا

مزمن مریضوں میں جب گھسیکا دوا کرنے سے بڑھاپی جائے مرکبورس آئیوڈائنڈ 30

تھریڈین 30

دوران مرض

روزانہ ایک خوراک دیں

ایپس

جب کوئی دوا کارگر نہ ہو

آئیوڈیم 3x

جب نئے گوٹریڈا ہو رہے ہوں

ل

لیوما

جب وجہ معلوم نہ ہو

برٹاکارب 200 ہر منٹ کو
یورک ایسڈ 200 ہر جمعہ کو
میڈورینم 1M ہر پندرہ تاریخ کو

لقوہ

”دیکھئے فالج“

لنگڑی کا درد

دیکھئے ”عرق النساء“

لوزتین

”دیکھئے ٹانسلز“

لو

لو لگنے کے پرانے اثرات

چہرے کا سرخ ہونا اور غنودگی

لو لگنے سے بخار اور سر پر بوجھ

دھوپ میں سونے کی وجہ سے صدمہ آفتاب

جب بھی دھوپ میں آئے مریض کو سرد رہو جائے

دھوپ کی وجہ سے سرد رہو

جب کوئی واضح علامت نہ ہو

نیزم کارب 200

بیلادونا 30

کیکٹس یا نیزم پور

ایکونائٹ 30

نیزم میور 30، گلوٹامین 30

بعد ازاں لیکسیس 200

گلوٹامین 200

لیکوریا

تیز، زرد، کمزور کر دینے والا سیلان الرحم

زرد رنگ کا سیلان الرحم یا متعفن جب خواہش

کیموٹا 30 صبح، رات

سپیا۔ صبح، رات

نفسانی میں کی واقع ہو

زرد اور گاڑھا جبکہ بائیں طرف درد ہو

سینٹھس صبح، رات

فیکوپائزم

صرف بیٹھنے پر سیلان الرحم

کریوزوٹم۔ صبح، رات

گلا سزا بدودار، تیز سوزش پیدا کرنے والا
کپڑے پر زرد وجہ پڑ جائے

کلکیریا فاس 3x

انڈے کی سفیدی کی طرح

ہائیڈراسٹس۔ صبح، رات

یسدار۔ تاردار۔ گاڑھایا زرد شرمگاہ میں خارش

فاسفورس۔ صبح، رات

جس سے آبلے پڑ جائیں

کریازوٹم 200

سفید جس سے سبز مٹی کی طرح ہو آئے

اپیکاک۔ صبح، رات

گاڑھا جو فرج کے اندر اور باہر خارش پیدا کرے

کلکیریا کارب 200

گاڑھا، تیزابی، کھجلی اور جلن پیدا کرنے والا

بڑی مقدار میں، ایک ماہواری سے دوسری ماہواری تک

ایام ماہواری میں بھی اخراج

بورکس 30

جب لیکوریا خارج ہو تو ایسا معلوم ہو جیسے

گرم پانی بہہ رہا ہو

مرکیورس 200

سبز رنگ کا لیکوریا، تیزابی، رات کو

زیادہ اخراج ہو

ہیملٹا 200

بلاخارش، گاڑھا، زردی مائل، سبز رنگ اور

تیزابی جبکہ مریضہ نرم مزاج ہو

ایلو مینا 200

مقدار اس قدر زیادہ کہ اخراج ٹخنوں تک جائے

سیپیا 200

گالوں پر بھورے رنگ کے نشان اور پیڑوں میں

نیچے کی طرف مسلسل بوجھ (خصوصاً پتلی عورتوں کیلئے)

نائٹرک ایسڈ 200

مزمن لیکوریا جب بدودار اخراج ہو

زمن

جب علامات نہ ہوں یا شدید درد کمر ہو
گاڑھاسیہ، تیز، خون آلود اور جلانے والا
بچوں میں
جب کیڑوں کی وجہ سے ہو

سلفر 200 (ہر ہفتہ دوسری ادویات کیساتھ)
اوائسٹا 3x ٹریپچوریشن
اکیریکس 30
کلکیریا کارب 6x
سانا 3x

م

مارفیا

مارفیا کی عادت چھڑانے کے لئے

اپیکاک 3x

متلی

گرم پانی سے ہاتھ دھوتے وقت
متلی جب زبان صاف ہو
متلی جب زبان پر میل ہو
متلی کا متواتر ہونا جب زبان سرخ ہو
خوراک کھاتے ہی قے آجائے

فاسفورس - صبح، رات
اپیکاک 30
انٹی مونیم ٹارٹ 30
اپیکاک 30

متلی جبکہ بوجھ ہو اور دبانے سے آرام ہو

برائی اونیا 30

خیالات یا خوراک کی بو کی وجہ سے حمل کے دوران متلی

کالچیکم 30

قے کے بغیر متلی جبکہ معدے میں گڑگڑاہٹ

پوڈوفائلم 30

مٹانہ

پیشاب کی نالی میں پیشاب کرتے وقت ڈنگ
مارنے کا سادرد، پیشاب بے ساختہ نکل جائے

ایپس 3x

سینگا 6

پیشاب بند ہو جائے۔ کمر میں ایسا درد جیسے
کچلی ہوئی ہے

پیشاب کا مقام ذکی الحس۔ پیشاب لگاتار قطرہ قطرہ
بیلاڈونا 30

خارج ہو۔ درد یکایک اٹھتے ہوں اور دفعتاً "بند ہو جاتے ہوں

خونی پیشاب قطرہ قطرہ درد کے ساتھ 'پیشاب کرنے
کینے بس انڈیکا 30
سے پہلے اور دوران شدید جلن
صبح، رات

مثانہ میں درد۔ پیشاب بار بار اور کانٹے کا سا درد
کیستھر س 30، صبح، رات
اس قدر درد کہ مریض زور زور سے چلائے۔ پیشاب گرے
رنگ کا یا خونی

مریض گھٹنوں پر زور دے کر پیشاب خارج کر سکے
پریرا بریو 3x1

پیشاب پھٹے ہوئے سفید دودھ کی طرح
فاسفورس۔ صبح، رات

پیشاب میں سرخ ریت
لائکوپوڈیم 30۔ صبح، رات
پہلٹلا 30
پیشاب کرتے وقت جلن، کانٹے کے سے درد
پیشاب بند ہو جاتا ہو

سفید پیپ یا رطوبت خارج ہو۔ پیشاب سرخ
سار سپرلا 6x

انگارے کی طرح گدلا ہو۔ پیشاب کر چکنے کے بعد شدید درد

پیشاب سے قبل زور لگانا پڑے۔ پیشاب مقدار میں کم
چمافیلا 30
غده قدامیہ میں سوزش

مثانہ میں پتھری اگر اس کو نکال دیا گیا ہے
مثانہ میں دوبارہ پتھری روکنے کے لئے

نکس و امیکا 200 کھانے کے بعد
کلکیریا فاس 200 کھانے کے بعد
(ہر منگل کو)

محبت

محبت میں ناکامی

ایسڈ فاس 30

اگنیشیا 200

محبت میں ناکامی کی وجہ سے خاموشی غم

مروڑ

آنکھوں سے پاؤں کے اوپر والے حصے تک

ہائیڈرو سائیکس - صبح

کسی اعضا میں مروڑ

اگیریکس رات

ہسٹریائی نوعیت کے مروڑ

سی سی فیوگا 200

زخموں کی وجہ سے مروڑ

ہائی پرکیم 200

جب بچوں کو بخار کی وجہ سے مروڑ ہوں

بیلڈوٹا 30

بچے کو جنم دینے کے بعد یا خون کی کمی کی وجہ سے مروڑ

چائٹسم آرس 3x

(ٹریپچوریشن)

مرگی

عمر رسیدہ لوگوں میں جب اکثر دورے پڑ جاتے ہوں

برٹاکارب 200

مرگی جس کا سبب مشمت زنی ہو

بیوفا 200

مرگی کے دورے صرف نیا چاند نکلنے پر جبکہ

سلیشیا 200

غدد سو جے ہوئے ہوں

حملے سے پہلے اور بعد میں کانپنا۔ دانتی لگنا

سائی کوٹاوائی روسا 200

پیچھے کی طرف اکڑاؤ

دورہ کی دوران چہرہ اور ہونٹ نیلے پڑ جائیں

کیوپرکیم میٹ 30-200

دورہ کے بعد سب سے پہلے ہاتھ اور پاؤں کی

انگلیاں اندر کو کھینچ جائیں

کیوپرکیم میٹ 30

دورہ گھٹنوں سے شروع ہو کر اوپر کی طرف جائے

تشخ سے پہلے از حد بے چینی
 جب دورے کیرٹوں کی وجہ سے ہوں
 ار جنتم نائٹرکیم 200
 آر ٹیمی شیٹا MT
 اگنیشیا 200
 کاشی کم 200
 بے قراری پائی جائے
 چودہویں کے چاند کی رات کو دورے جبکہ
 مریض موٹا ہو

دورے اکثر نیند میں ہوں
 جب مرگی کی وجہ تمباکو نوشی ہو
 سیلیشیا 200، 1000 CM
 ار جنتم نائٹرکیم 200
 جب دورے صبح کے وقت ہوں اور ہفتے میں ایک بار
 سیپیا 30
 یاد دو تین ہفتوں میں ایک بار ہوتے ہوں

(نوٹ): مرگی کے مریض کو گاہے بگاہے ٹوبر کولینم 200 اور بیسیلینم 200 کی ایک خوراک
 ہفتہ وار دینے سے دوروں میں کمی واقع ہو جاتی ہے

مزاج

برا مگر مریض کا اس کا احساس نہ ہو
 برا اور مریض کو اس کا اچھی طرح احساس ہو
 کیو ملا 30- صبح، رات
 نکس و امیکا 30- صبح، رات
 بیلاڈونا 200 صبح
 عضیلا

مے

بہت زیادہ تخم دار اور بڑے خشک یا جس سے خون رے
 تھو جا 1000 صبح
 نائٹرک ایسڈ 200- رات

ہاتھوں پر بڑا مت

میگ سلف۔ کھانے سے پہلے
(تھو جا 200 کی چند خوراکیں)

فیرم پکرک۔ صبح

تھو جا۔ رات یا

ناٹرک ایسڈ۔ رات

سنا برس 30۔ صبح، رات

سار سپر پلا 30

کسٹوریم

انٹی مونیم کروڈم 30

کاشی کم 200

کاشی کم 200، نیٹرم سلف 200

ناٹرک ایسڈ 200

سورائینم 1000

رشاکس 30

کاشی کم 200 صبح، تھو جا 200۔ رات

(زیادہ نہ دہرائیں)

کاشی کم 200

بر برس صبح، تھو جا۔ رات

اناکارڈیم 200

کلکیریا کارب۔ صبح

تھو جا۔ رات

نیٹرم میور۔ صبح

تھو جا۔ رات

جھنڈیا کچے کی شکل میں بہت زیادہ

حشفہ پر

قضب پر چھوٹے مے

چھاتی پر

گردن، بازوؤں، ہاتھوں پر نرم ہموار مے

ناک، انگلیوں کے سرے اور بغلوں پر مے

تمام جسم پر چھوٹے مے

آتشکی مے

جس سے بو آئے

سینگ کی طرح چوڑے

سکروٹم پر

ناک پر

ہاتھ کے گوشت والے حصے پر

چھوٹا مے انگوٹھے کے نیچے ہاتھ کی ہتھیلیوں پر مے

مے جن میں زخم بن جائیں

مے جن پر زخم بن جائیں اور چھونے سے

تکلیف میں اضافہ ہو

مسوڑھے

مسوڑھوں سے خون آنا، سوزش، دانتوں سے الگ ہونا
 مسوڑوں کا پھوڑا
 مرکب 200
 کلکیریا سلف 200 صبح
 ہیر سلف 200- رات
 ہیکنیم میٹ 30
 ہیکالوا 3x
 مسوڑھوں کے کناروں پر صاف نیلی لائن
 مسوڑھوں کی سوجن

منہ

منہ کا ذائقہ کڑوا، زبان پر میل ہو
 اس کے ساتھ سخت پیاس لگتی ہو
 منہ کا ذائقہ کڑوا۔ خصوصاً صبح سویرے
 بعض اوقات ذائقہ اور سونگھنے کی طاقت ندارد
 پیاس نہ لگے
 منہ بہت گرم اور خشک زبان پر اور گالوں کے اندر چھالے بورکس 6
 منہ میں اور مسوڑھوں میں بدبودار رطوبت
 ذائقہ نمکین، کڑوا، ترش یا خون سے ملا جلا
 ذائقہ شکر جیسا میٹھا
 شیریں، خون جیسا ذائقہ، منہ صاف ہو مگر
 ہلکی رطوبت ہو
 منہ کڑوا یا میٹھا کڑوا خصوصاً صبح کے وقت
 منہ کڑوا اور لٹی کا سا اور یسدار اور تھوڑا سا خشک
 منہ کے کنارے پھٹے ہوئے
 دھاتی ذائقہ
 میگنیشیا سلف۔ صبح
 بربرس 200- صبح
 کنڈورنگو یا گریفائٹس 30
 آر سینی کم البم

ہلٹلایا نیٹرم فاس

مرکیورس 30

نیٹرم میور۔ صبح

ہیکسم۔ صبح، رات

مرکیورس

مرکیورس

وریسکم۔ صبح، رات

نائٹرک ایسڈ 200

سفینم 200 IM

بکھی بکھی

منہ خشک مگر پیاس نہ دارد

منہ میں چھالے، بہت زیادہ رال ٹپکنا

منہ خشک، گرم اور دکھن، اکثر قبض رہتی ہو

منہ میں جھاگ ہو

زائقہ میٹھایا تانبے کا سا۔ تھوک خونی اور یسدار

زبان پر زخم اور منہ سے بو آتی ہو

منہ میں پانی اکٹھا ہو جائے جس کا زائقہ نمکین ہو

منہ کے کنارے پھٹے ہوئے، منہ میں زخم

سوتے ہوئے منہ سے بہت زیادہ رال ٹپکے

معدہ

نکس و امیکا 30۔ کھانے سے پہلے

معدہ پر بھاری بوجھ کا احساس۔ کھانے کے ایک یا

دو گھنٹے بعد

شانی میگنیا۔ کھانے سے پہلے

ایسا معلوم ہو کہ معدہ نیچے کی طرف لٹک رہا ہے

فاسفورس۔ صبح، رات

جیسا کہ معدہ میں کوئی چیز پک رہی ہو

ابر وٹینم 30۔ کھانے سے پہلے

جیسا کہ پانی میں تیرنا

نکس و امیکا 200۔ رات

معدہ کا لہر اور تیزابیت

سلفر 200، کاربووٹج 200، دوپہر

چھ ہفتے استعمال۔ ہفتہ میں صرف چار دن

ایبس نائٹرا 30

معدہ کی خرابی جس کی وجہ چائے یا تمباکو نوشی ہو

سینگونیو یا آرسینی کم

معدہ میں زخم کا احساس، جلن وار درد

کھانے سے تکلیف میں اضافہ

معدہ میں سردی اور درد۔ ٹھنڈی اشیاء کھانے سے آرام، معدہ کا گرم ہوتے ہی قے جب گرم مشروبات اور گرمی سے افاتہ ہو معدہ میں درد، گیس، اچھارہ بعض اوقات لینے پر تکلیف میں اضافہ

درد کی وجہ سے کروٹیں بدلنا پڑیں سب علامات کھانے کے بعد بہتر تکلیف کو پیٹ کے بل لینے پر آرام معدہ میں تکلیف جس کے ساتھ متلی کا احساس

معدہ میں زخم

اگرچہ مریض ٹھنڈی خوراکیں طلب کرے۔ بیرونی طور پر اگنیشیا۔ کھانے سے پہلے جسم کو گرم رکھنا چاہتا ہے

اندرونی طور پر گرم غذا کی خواہش بیرونی طور پر ٹھنڈے رہنے کی خواہش آندھی اور طوفان کے اثرات

معدہ میں درد

خالی معدہ میں درد

کھانا کھانے کے بعد معدہ میں درد

فاسفورس 200- صبح

آر سینی کم 30

کاربووٹیج 30- کھانے کے بعد

پلمبم۔ کھانے کے بعد

چیلیڈونیم۔ کھانے سے پہلے

نائٹرک ایسڈ۔ کھانے کے بعد

نکس و امیکا۔ آر سینی کم

کھانے کے بعد

آر نیٹھوگالم 30- کھانے سے پہلے

اگرچہ مریض ٹھنڈی خوراکیں طلب کرے۔ بیرونی طور پر اگنیشیا۔ کھانے سے پہلے

فاسفورس۔ کھانے سے پہلے

فاسفورس 200-

ہر جمعہ کو ایک خوراک

بیلادونا 200- ہر پانچ منٹ کے بعد

پانی میں ملا کر دیں جب تک

درد ختم نہ ہو جائے

اناکارڈیم 30- دن میں چار خوراکیں

ایس ناکرا 30- دن میں چار خوراکیں

مقعد

مقعد کا پھوڑا یا ناسور

پاؤنیا یا فلورک ایسڈ

کھانے کے بعد

پاؤنیا یا سلیشیا 200

کھانے کے بعد

ایلو ز 30 کھانے سے پہلے

ایسکولس 200

کھانے سے پہلے

نائٹرک ایسڈ 200

برائی او نیا کھانے کے بعد

پاؤنیا کھانے کے بعد

سلیشیا کھانے سے پہلے

یانیٹرم میور کھانے سے پہلے

اور پاؤنیا رات کو

اپیکا ہر آدھے گھنٹے بعد

ہیما میل ہر گھنٹے بعد

سباڈلا کھانے سے پہلے

نکس و امیکا اور سلفر

یانیٹرم فاس 200

نائٹرک ایسڈ - کھانے سے پہلے

فاسفورس - صبح رات

جلن اور کاٹنے والی درد

ہوا خارج ہوتے وقت جلن

جلن، دکھن اور سخت خشک قبض

سکڑن، خون آئے، پھٹی ہوئی

درد خاص طور پر پاخانہ کے بعد

خشکی اور درد

مقعد سے بہت بودار نمی کا ہونا

دکھن، درد اور بعض اوقات خون بھی آئے

بواسیر، چمکدار سرخ خون اور سیاہ خون

الجھن جو کیرٹوں کی وجہ سے ہو

الجھن اور دکھن

تیز اور کاٹنے والی درد جو قبض کے

دوران اور قبض کے بعد محسوس ہو

مقعد کھلی ہوئی جو بند ہو

موج

پٹھوں، ٹانگوں اور بازوؤں میں

بیس اور آرنیکا

(باری باری دہرائیں)

اگنس کاسٹس 2x

موج آ جانا

بوجھ اٹھانے سے موج کا آنا

موج کی وجہ سے جسم کے کسی حصے میں سختی

رشاکس 200

رشاکس۔ بیس

(باری باری دہرائیں)

اگنس کاسٹس 200

موج آ جانا اور جوڑا تر جانا

موج کی وجہ سے اعصاب کو شدید ضرب

جب ہڈی کو شدید ضرب پہنچے

ہائی پرکیم 200

روٹا 30

کاربوائیٹس یا

حفظ ماہی (موج کے میلان کو روکنے کیلئے)

نیٹرم کارب کا استعمال مفید ہے

موسم

مرطوب موسم میں تکلیف کی کمی

مرطوب موسم میں تکلیف کی زیادتی

پیرسلف۔ صبح، رات

سلیشیا۔ صبح، رات

موتیا بند

اگر مریض روشنی میں بہتر دیکھ سکے

یوفریزیا 200۔ کھانے کے بعد

(ہر جمعہ کو)

جب آدمی چیز نظر آئے

کاشی کم 200، تین خوراکیں دے کر

کم از کم 14 دن تک انتظار کریں

کلکیر یا فلور اور سلیشیا کا استعمال

بھی نہایت مفید ہے

کوئیم 200 ہر اتوار کو

اگر چوٹ کی وجہ سے ہو

اگر مریض نوجوان ہو

فاسفورس 200- صبح، سلیشیا 200- رات

لائیکوپوڈیم 30، سپیا 30

جب مرض کی وجہ تپ دق ہو یا حیض

کا دب جانا ہو

باری باری دیں

جب مرض پیدائشی یا موروٹی ہو

پہلٹلا 6 روزانہ ایک خوراک

پانچ دن تک

جب آنکھ میں سوزش ہو

سلیشیا 200

کا چیمکم

بچوں کا نرم موتیا بند

آنکھوں میں اور آنکھوں کے ارد گرد درد

کلکیر یا فاس 200

زنگم سلف CM ایک خوراک

جب کوئی دوا سمجھ میں نہ آئے

دے کر انتظار کریں

کلکیر یا فلور 6x روزانہ دیں

موٹلا

جسم پھولا ہوا

پیٹ موٹا

تھاروڈینیم یا کلکیر یا کارب- رات کو

کلکیر یا کارب 30

(دن میں تین مرتبہ)

فیوکس MT

موٹاپہ کم کرنے کے لئے

ناپسندیدگی

بچوں سے

کسی کے ساتھ رہنے یا جانے یا بیٹھنے کی وجہ سے
حمل کے دوران کسی کے ساتھ رہنے یا جانے یا
یا بیٹھنے کی وجہ سے

کسی کے ساتھ رہنے یا جانے یا بیٹھنے کی وجہ
سے ناپسندیدگی مگر اکیلا رہنا بھی ممکن نہ ہو

کھانوں سے جن میں تیزابیت ہو

الکوحل سے

گائے یا بھینس کے گوشت سے

مکھن سے

پنیر سے

فھنڈے مشروبات سے

انڈوں سے

چربی والی اشیاء سے

مچھلی سے

آلے سے

سپیا 30- صبح (سات دن)

کلکیر یا کارب 200 یا براہینا کارب 200
لیکس صبح (ایک ہفتہ کے لئے)

کو نیم۔ رات، سلفر۔ صبح

سلفر 30، صبح نکس و امیکا 30، رات

آر سینی کم 30

آر سینی کم 30- کاربوو تیج 30 (باری باری)

ہلشٹا 200 ہر تیسرے دن

چیلی ڈونیم 200

نیرم میور 200- صبح

نکس و امیکا 200- رات

فیرم 30

آر سینی کم 30- صبح

کاربوو تیج اینیمیلنس 30- رات

پٹولیم 200- ہر تیسرے دن

نیرم میور 200- صبح

نکس و امیکا 200- رات، کالینی کم۔ کبھی کبھی

آر سینی کم 3x، فاسفورس 6x

فاسفورک ایسڈ 1x

گرم مشروبات سے

گوشت سے

دودھ سے

آلو سے

مرغن غذاؤں سے

نمک سے

کھانے کی بوتے

میٹھی اشیاء سے

چائے سے

پانی سے

کام سے

فیرم 30

تھو جا 200 - ہر ہفتے ایک خوراک

کاربووٹیج 30 - نکس و امیکا 30

تھو جا 200 ہر ہفتے ایک خوراک

پہلٹلا - آر سینی کم -

کاربووٹیج اینمیلنس (پوٹینسی 30)

فاسفورس 30

کاکولس 30، بیلاڈونا 30

آر سینی کم - کاشی کم - مرکیورس (30)

فاسفورس - نکس و امیکا 30

بیلاڈونا - نیٹرم میور، نکس و امیکا 30

اگیریکس 200 - برتیسرے دن ایک خوراک

ناراضگی

اگر مریض تسلی و تشفی دینے سے ناراض ہو جائے

اگر مریض تسلی و تشفی دینے کو پسند کرے

ناخن

نازک، بھر بھرے، ناہموار، بھدے، ناخن

جلد ٹوٹ جاتے ہوں

ناخن اور انگلیوں کے پور بہت زیادہ بھر بھرے

اور پردرد، انگلی کے پور پر زخم ہو جائے

ناخنوں کے نیچے درد

ناخنوں کے نیچے شاخدار افزائش

نیٹرم میور 30 - کھانے سے پہلے

پہلٹلا 30

سلیشیا 30 - صبح، رات

تھو جا 6 ہر چھ گھنٹے بعد

ایلو مینا 6، ہر گھنٹے بعد

سپیا 30 - صبح، رات

اینٹی مونیم کروڈم 30 - صبح، رات

ناخن سخت، شکن دار اور بھدے
ناخنوں کے ارد گرد اور نیچے زخم
اندر کی طرف بڑھنے والا ناخن

گریفائٹس 30- صبح، رات
فاسفورس 3- چار گھنٹے بعد
سلیشیا 200
ہر تیسرے دن ایک خوراک

ناخن خورہ

ابتدائی مراحل

جب تکلیف ہر موسم سرما میں ہو

بہت نرم اور چھپنے والی درد۔ نیلی رنگت

بہت ٹھنڈے پانی میں انگلی ڈبوئے سے آرام ہو

جب زخم گل سڑ رہا ہو

جب زخم کو گرمی سے افاتہ ہو اور شدید جلن ہو

رنگ سیاہی مائل ہو

سلیشیا یا سپر سلف ہر گھنٹے بعد
سپر سلف 200- صبح، رات (چند دن)
لیکس 200 یا پاپاؤنیا 30
ایپس 30
انتھراکسی نم 30
آر سینی کم 30

(نوٹ): اگر شروع میں فیرم فاس اور سلیشیا اول بدل کر دی جائیں تو زخم میں پیپ نہیں پڑے گی۔
ناخن خورہ میں بہترین ادویات ہیں۔

ناف

ناف پر بوجھ کا احساس

ناف سے اخراج

ناف سے خون کا اخراج اور پھوڑا

نومولود بچے کی ناف پر پھوڑا وغیرہ

فاسفورس ایسڈ 3x

سلیشیا 6x

ابروٹینم 30

ٹکس موسیکا 30

ناک

ایسا معلوم ہو کہ جیسے ناک کی جڑ میں کوئی	کالی آئیوڈین- صبح، رات
کیڑا رینگ رہا ہو	
ناک میں گندی بو	بیلڈونا 30- صبح، رات
ناک میں گندی بو جیسے بعد نزلہ اور زکام ہو	ہیٹلا 30- صبح، رات
گندی بو خصوصاً "ناپسندیدہ"	کلکیریا کارب 200
مشقت کرنے کے بعد ناک سے خون بہے	آرنیکا
چہرے کو صاف کرتے وقت ناک سے خون نکلے	امونیم کارب 30- صبح، رات
کسی وجہ کے بغیر ناک سے چمکدار سرخ خون نکلے	فیرم فاس 200
	کالی فاس 200
صبح تین اور چار کے درمیان ناک سے خون نکلنا	برائی اوینا 30، صبح، رات
ناک سے خون کا آنا جبکہ چہرے پر سرخی ہو	گریفائٹس 200
اور سر کی طرف اجتماع خون ہو	
جلن دار درد- ناک کا اندرونی حصہ میں جلن	سینگونیریا 200- صبح، رات
ناک میں (ٹوٹ پھوٹ) اور خشکی	ایلو مینا 30- صبح، رات
ناک سے سبز رنگ کا اخراج	فاسفورس 30- صبح، رات
ناک کی جڑ سے سرے تک کھچاؤ کا احساس	ریوم 30- صبح، رات
صبح سویرے بستر میں ناک میں خشکی	ایلو ز 30- صبح، رات
چھینکوں کے ساتھ بہنے والا نزلہ	سینگونیریا 200- صبح، رات
بہت زیادہ نکسیر جبکہ خون چمکدار ہو	اپیکاک 30
بہت زیادہ نکسیر جبکہ خون کا رنگ کالا سرخ ہو	ہیما میل 30
ناک کو ملنے کی خواہش عموماً جب کیڑے بھی ہوں	سانا 30- صبح، رات
ناک میں کھلی مریض ناک کو اس وقت تک	ارجنٹم میٹ 30- صبح، رات
ملتا ہے جب تک کہ اس سے خون نہ نکل آئے	

ناک میں کھلی اور نتھنوں میں سنناہٹ
سو گھنے کی طاقت نہ رہے

ناک میں پالی پس

کھلی ٹھنڈی ہوا میں ناک سرخ ہو جائے
کھلی کے ساتھ سرخی

گانٹھ دار ناک

رات کو ناک بند ہونے کا احساس
زیادہ گرم کمرے میں جانے سے ناک بند
ہونے کا احساس

بائیں نتھنے میں بال کا احساس

دائیں نتھنے میں بال کا احساس

ناک کا سرا سرخ یا نیلا

نتھنے میں درم یا رسولی اور کڑوا ذائقہ

ناک میں پھوڑے

نامردی

کثرت مجامعت کی وجہ سے نامردی اور نقاہت

خواہش جماع بالکل مفقود خصوصاً "خواتین میں

نامردی جبکہ خود اعتمادی کا فقدان ہو

اور منی خود بخود گرتی ہو

کاربووتج 30

کلکیریا کارب 30- صبح

پہلٹا 30- رات

سینگونیریا 200، تھو جا 200

ایلو ز 30- صبح، رات

سلیشیا 200- صبح، سلفر 200- رات

(صرف چار دن استعمال)

سلفر 200 صبح

آرم میٹ- رات

اینٹی مونیم کروڈم- صبح، رات

اینٹی مونیم کروڈم- صبح، رات

کالی بالی کرو میکم 200

ہائی ڈراسٹس 30

کاربووتج اینی میلس

آر سینی کم البم

سینگونیریا صبح، سلیشیا- رات

ایسڈ فاس MT سے 30

اونس موڈیم- اونچی طاقت

سیلیم 200

لائیکوپوڈیم 200 سے اوپر

بوڑھے آدمیوں میں مکمل نامردی

قبل از خون انتشار

کوئیم 200 IM

جنسی خواہشات کے دب جانے کی وجہ سے نامردی

قوت مجامعت زیادہ مگر وقت پر شرمندگی

فاسفورس 200

استادگی بہت کم۔ جماع نہ کر سکے، پتلے اور

کمزور مریض

سلفر 200

پرانے سوزاک کی وجہ سے نامردی

ایگنس کاسٹس 30

جوانی کی غلط کاریاں، وقت سے پہلے بڑھاپے کے آثار

کلکیریا کارب 1000

موٹے آدمیوں میں نامردی۔ جماع کے بعد

جسمانی اور دماغی کمزوری

بل سیرولاٹا

خیمے سکڑ جائیں۔ انزال کے وقت درد ہو

جماع کی خواہش نثارو

ایگنس کاسٹس 30'200

سوزاک کے بعد نامردی۔ پرانے پاپی جنسی خواہش

بہت زیادہ عملاً "صفر

کروٹن ٹنگ لیٹم 200

اعضاء تناسل سکڑا ہوا اور خارش

کیمفر 30

جنسی خواہش بڑھی ہوئی۔ رات کو منی خارج ہو جائے

کلکیریا کارب 200'1000

منی جلد خارج ہو جائے۔ جماع کے بعد کمزوری اور

چڑچڑاپن

کلاڈیم 200

نامردی جس کے ساتھ دل کی حالت پست

مجامعت کو دل چاہے مگر بوسہ لینے اور پیار کرنے

سے بھی استادگی نہ ہو

جب منی بلا ارادہ خارج ہو اور قضیب میں ہچکتا ہوا

سلفر 200

درد ہو۔ عضو کمزور اور ڈھیلا

نزلہ (دیکھئے زکام)

مزمن نزلہ اور زرخرے کا زخم

۳ سنتھورم 3x

(کافی مدت تک استعمال کریں)

نفخ

دیکھئے ”اپھار“

نظر

نظر کی خرابی جس کی وجہ باریک کام کا اکثر کرنا ہو

رنگ نظر نہ آئیں

رات کو نظر نہ آئے

منشیات کے بد اثرات کی وجہ سے نظر کی خرابی

روٹا 200

سینٹونائن۔ صبح، رات

فالٹی سو سکما 30۔ صبح، رات

نکس دامیکا 200۔

رات کو سوتے وقت

بو تھرا پس 30۔ صبح، رات

جیلی میم 200

فاسفورس 30، صبح، رات

جیلی میم یا آرم میٹ (صبح، رات)

سفلیئم 200

جیلی میم۔ صبح، رات

بیٹیشیا 30۔ صبح آرنیکا 30۔ رات

سینگونیوا۔ کھانے کے بعد

کونیم۔ کھانے سے پہلے

آر سینی کم 200۔ کھانے کے بعد ہر جمعہ کو

دن کو نظر نہ آئے

اچانک نظر کا گم ہو جانا

نظر کے سامنے دھندلا پن

فکریا ڈیپریشن کی وجہ سے نظر کی کمزوری

ایک کے نیچے دوسرا سایہ نظر آنا

ہر چیز دو دو نظر آئے آنکھوں میں تھکاوٹ محسوس ہو

چھوٹی لکھائی نہ پڑھ سکے

ہر چیز کے ارد گرد سبز دائرہ

ہر چیز کے ارد گرد سرخ دائرہ

گرم پانی میں نہانے سے نظر بہتر ہو جائے

نکسیر

جب ایک نتھنے سے گاڑھا لیسدار کالا خون خارج ہو

کروکس شایوس 30- صبح، رات

حمل کے دوران یا ان عورتوں میں جو

سپیا 30- صبح، رات

امراض رحم میں مبتلا ہوں

جب حیض دب جائے

پہلٹلا 3x

بہت کمزور مریضوں میں سیاہ رنگ کا خون

کروٹیلکس ہری ڈس 6x سے 200 تک

بوڑھے لوگوں، شراب خوروں یا جوان کمزور

سکیل کار 30- صبح، رات

عورتوں میں

خاموش طبع بوڑھے لوگوں میں جب ناک صاف کرتے

اگیریکس 200

وقت خون آئے

بستر سے اٹھتے وقت نکسیر چھوٹے

ایلو 30- صبح، رات

ہر صبح چہرہ دھونے پر، رات کو کھانا کھانے کے

امونیم کارب 30

بعد یا متواتر چھینکوں کے بعد

گلوٹائن 200

سورج کی گرمی کی وجہ سے

ہائیڈراسٹس 30

بائیں نتھنے سے

فاسفورس 30

پاخانہ کرتے وقت زور لگانے سے

میزیریم 200

دائیں نتھنے سے عموماً شام کو، رات کو سونے سے پہلے

ٹیرنٹولا 6

جب خون زیادہ مقدار میں سیاہ رنگ کا

چھپھڑے، چھپھڑے ہو کر خارج ہو

ورپرم البم 30

حیض سے پہلے

ہیما میل 3x

جب رگوں سے قطرہ قطرہ یا دھار باندھ کر

خون خارج ہو۔ جریان کثرت خون کی وجہ سے

یا بڑھاپے کی وجہ

ایکونائٹ 30

فکر اور بے چینی کے ساتھ، نوجوان مریضوں

میں جن میں خون زیادہ ہو

چائنا 30- صبح، رات

تکسیر کا عادتاً "پھوٹنا جس سے مریض

کمزور ہو جائے۔ کانوں میں سائیں سائیں کی

آوازیں آئیں

وائی پرا 30

ہر قسم کی تکسیر جبکہ مریض سردی کو بالکل

برداشت نہ کر سکے

نمونہ

ہائی پریکیم 30- صبح

حفظ ماتقدم تنگ کرنے والی کھانسی کے بعد

فاسفورس 30- رات

سینگا 30- صبح، فاسفورس 30- رات

جب بلغم کا اخراج دقت سے ہو

چیلینڈونیم 200

صفرائی علامات کے ساتھ

سینگونیریا 30

جب مرض بڑھ چکا ہو

برائی اونیا 30- صبح، فاسفورس 30- رات

بچوں کے نمونہ میں

برائی اونیا 30- صبح، فاسفورس 30- رات

جب کوئی علامات سمجھ میں نہ آئیں

فیرم فاس، کالی میور، کالی سلف

سب 6x میں استعمال کریں

سلفر 200

ایسے مریض جو جلد تندرست ہونے میں نہ آئیں

کالی کارب 30

بچوں کے نمونہ میں جب کالی کھانسی کے دورے ہوں

نیند

مریض صرف بائیں طرف سو سکے

مریض صرف دائیں طرف سو سکے

مریض برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا ایک عضو

دوسرے سے لگ جائے

چھاتی پر ہاتھ کا بوجھ برداشت نہ کر سکے

بائیں طرف نہ سو سکے۔ درودل

رات کو سو نہیں سکتا۔ مگر سہ پہر اور شام

نیند کی نہ رکنے والی خواہش

رات کے درمیانی حصہ میں پاؤں ٹھنڈے

نیند مشکل سے آئے

نیند میں ہنسنا

نیند میں رونا

نیند پریشانی کی، خوابوں اور اکثر جاگنے کے

ساتھ، شہوانی خواب

نیند کے دوران سر میں جھٹکے لگنا

رات کے وقت نیند مگر سونہ سکے

بے خوابی ڈر کی وجہ سے

نیند میں باتیں کرنا

خواب پریشان کن

ڈاکوؤں کے خواب

تقریباً "ساری رات نیم خوابی

نیند میں بچوں کی بے چینی۔ نیند میں جھٹکے

مرکیورس۔ صبح، رات

فاسفورس۔ صبح، رات

سورانیئم 200

سورانیئم 200 IM

کالمیا 200 IM

پہلٹا 200 30 IM

ٹوبر کو لینم۔ کبھی کبھی اونچی طاقت

کاشی کم 200، فاسفورس 6

لائیکوپوڈیم 30

نیٹرم میور 30

لیکسیس 300

آرنیکا 200

نیٹرم میور 30

نیٹرم میور 30

نیٹرم میور

نیٹرم میور 30

نیٹرم میور 30

کونیم 30

کیمو ملا 3x

ٹوبر کو لینم 200 یا 1M	سوتے وقت کانپنا
سلیشیا 200- ہفتے میں ایک بار	نیند میں خراٹے
آر سینی کم 30- صبح، نکس و امیکا 30- رات	نیند کے دوران کپڑے پھینک دینا
اوپیم 200	نیند بکثرت
کالی فاس- صبح، رات	رات کے وقت نیند میں اٹھ کر چلے
سلیشیا- صبح، رات	بے خوابی- کروٹیں بدلنا
میگنیشیا کارب- صبح، رات	بستر سخت معلوم ہو
سلیشیا- صبح، رات	خوابوں کے ساتھ جن میں باتیں کرے
پایرو جینم- صبح، رات	خواب پر آگندہ، ڈراؤنے، اپنی موت کے،
	اپنی جوانی کے یا گزشتہ واقعات کے
	نیند میں کانپ پھوسی کرنا

و

وجع المفاصل

کالی فاس، رشاکس	حاد یا مزمن، پرورد زیادہ سخت، صبح کے وقت
صبح، رات	اور آرام کرنے کے بعد تکلیف میں اضافہ۔ ہلکی
	ہلکی مشقت سے تکلیف میں قدرے آفاقہ
چیلیڈونیم- صبح، رات	ٹخنوں اور پاؤں کی حاد درد
سلفر- صبح	صبح کے وقت بہتر اور بستر میں تکلیف زیادہ
کاشی کم- صبح، رات	بستر کی گرمی سے درد غائب
کلکیر یا فاس- صبح، رات	سردی کے موسم میں شروع ہو اور گرمی کے موسم
	میں بہتر ہو جائے
لیڈم- صبح، رات	ہاتھوں میں

چوڑ، گھٹنے اور پاؤں کے جوڑ میں
گھٹنوں میں

بائیں کہنی اور بائیں کلائی میں
نیچے سے اوپر کی طرف

چھوٹے جوڑوں اور پٹھوں میں
مختلف پٹھوں اور جوڑوں میں
درد سے زیادہ سختی

گردن، کمر، اعضاء، ہاتھ، گھٹنوں
انگلیوں اور رانوں، کہنی، کلائی کا وجع المفاصل

پاؤں، ٹخنوں جن پر کبھی کبھی سوجن بھی ہو،
نرم گرم، پردرد، خصوصاً جب اعضاء کو گرم پسینے میں
رکھنے سے آفاقہ ہو

جب اعضاء کو ٹھنڈے پانی میں رکھنے سے آفاقہ ہو
پٹھوں کے وجع المفاصل جب کہ پسینہ بھی ہو
حاملہ عورتوں کا وجع المفاصل جبکہ اعضاء
سو جاتے ہو

جب وجع المفاصل سارے جسم میں تیرتی ہوئی معلوم
ہو اور اس کو کسی مقام پر بھی قیام نہ ہو

جب بہت زیادہ گرمی ہو یا برفانی ٹھنڈک ہو

جب درد ایک طرف سے دوسری طرف منتقل ہوتی رہے

جس سے اعضاء سکڑ جائیں اور جوڑ سخت ہو جائیں

چھوٹے جوڑوں کا وجع المفاصل یا نقرس جس کو

ٹھنڈے پانی سے آرام ہو

لیڈم۔ صبح، رات

ہائی پرکیم۔ رشاکس

میگنیشیا سلف۔ صبح، رات

کالسیا۔ صبح، رات

کالوفانیلم 200۔ صبح، رات

کلکیریا فاس 6x بعد میں 200

فاسفورس 30، کھانے کے بعد

کالوفانیلم 200

چیلیڈونیم 200

لیڈم پال 30۔ صبح، رات

اینٹی مونیم ٹارٹ 30۔ صبح، رات

کاکولس انڈیکا۔ صبح، رات

سلفر 200 صبح

کالچیکم۔ صبح، رات

لیک کنی نم۔ صبح، رات

کاشی کم 200۔ صبح

لیڈم۔ صبح، رات

وقت

نکس وامیکا	صبح
نیٹرم میور	دوپہر سے قبل
آر سینی کم البم	دوپہر کے بعد
ہلٹلا۔ لائیکو پوڈیم	پچھلا پہر اور شام
رشاکس۔ مرکيورس سال	تمام رات
برائی اونیا	آدھی رات سے پہلے
آر سینی کم البم۔ نکس وامیکا	آدھی رات کے بعد
بریٹا آئیوڈینم 200	صبح کے وقت، قبل دوپہر، شام کے وقت، آدھی رات کے بعد



ہاتھ

گریفائٹس 6	ہاتھ پھوٹنا
آر نیکا 30	زور لگنے یا مشقت کرنے سے ہاتھ پر سوجن آجانا
ایسڈ فلورک 30	ہاتھوں پر پسینہ آئے اور مریض کو سرد پانی کے استعمال سے آرام آتا ہو
ایسڈ پکڑک 30	ہاتھوں پر سرد پسینہ آئے جو یسدار ہو
اگیریکس 30	ہاتھوں سے بے ساختہ چیزوں کا گرنا

ہچکی

میگنیشیا فاس 6x، نکس وامیکا 30

دقتی یا مزمن

گرم پانی میں ہر آدھ گھنٹے بعد دیں

جن سنگ MT

ہائیوسائٹس 30

جب کوئی علامت واضح نہ ہو۔

تشنجی ہچکی جو رات کے وقت لیٹنے سے کھانے اور
گفتگو کرنے کے بعد زیادہ ہو

میگنیشیا فاس 6x پانچ خوراکیں

انگیشیا 30 ماسکس 30

سکوٹیلیریا ہر دو گھنٹے بعد

سلفورک ایسڈ 3x ہائیڈرو سینک ایسڈ 1x

بچوں میں .

عورتوں میں ہسٹیریا کی وجہ سے

شدید اور متواتر ہچکی

ہڈیاں

روٹا 200

فلورک ایسڈ 30- صبح

فاسفورس 30- رات

روٹا 30 یا سمفائٹم 30، صبح، رات

فاسفورس 30- صبح

سمفائٹم 30- رات

کلکیریا کارب 3x

کلکیریا فاس 200 یا سمفائٹم 200

سلیشیا- صبح، رات

یا فیرم فاس- صبح، رات

کلکیریا فاس 6x

مرک کار 3x

ایسا معلوم ہو جیسے ہڈی ٹوٹ گئی ہو

ہڈی کی گدی میں درد ہونے کا احساس

ہڈیوں کا گلنا سرٹنا (نیکراسس)

ہڈی پر چوٹ لگنا یا زخم ہونا

ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف

ریڑھ کا ستون اور اعضا ٹیڑھے ہوں

ہڈیوں کا ٹوٹ جانا

نرم چھونے سے تکلیف میں اضافہ

کمزور آسانی سے ٹوٹنے والی اور دیر سے جڑنے والی

ہڈیوں میں غیر معمولی آتشکی ابھار

کالی بانکرو میکم 3x

روٹا 30- صبح، رات

سلیشیا، کلکیریا فاس 3x

بیسلی لینم 200 ہر جمعہ اور منگل کو

کلکیریا فلور 6x

ہالالاوا 30

کلکیریا کارب 30

سلیشیا 30

فلورک ایسڈ 30

ہڈی کا کچلا جانا

ہڈیوں کا ٹیڑھا ہونا

ہڈی کا خشک ہو جانا

ہڈی دار گوشت۔ ہڈی کا بڑھ جانا

جڑے کی ہڈی کی چوٹ

کبڑاپن

اگر سردی سے تکلیف میں اضافہ ہو

اگر سردی سے تکلیف میں افادہ ہو

ہرنیا

ہرنیا کی تکلیف کے لئے

نکس و امیکا۔ دو ہفتوں کے لئے

اس کے بعد کلکیریا کارب دو ہفتوں کے لئے

(چند ماہ تک استعمال کی جائے)

اوپیم 200

نکس و امیکا 200

آرم۔ میکم 30

لائیکوپوڈیم MT کی مالش۔

لائیکوپوڈیم 200

نکس و امیکا 1x

آنتوں میں بل پڑ جانا۔ آنتوں کے الٹ جانے سے

پاخانے کی قیس

بوڑھے آدمیوں کے سادہ فتق میں

ہرنیا کی درد۔ دائیں طرف

مزمن درد ہرنیا

ہشیریا

گلے میں ہوا کے گولے پھنس جانا

اگیشیا 30۔ ہر آدھ گھنٹے بعد دیں

ماکس 3x ہر بیس منٹ بعد
نکس مو سیکٹا 30- صبح، رات
بلاڈونا 30

اگنیشیا 200

سی سی فوگا 1M

کالی فاس 200

ہیریائی دورہ
بہت زیادہ غنودگی۔ منہ خشک

ہیریائی تشنج

ہیریائی فالج

ہیریائی دورہ ماہواری کے دوران

جب مریضہ کے اعصاب کمزور ہو چکے ہوں

ہونٹ

یو فریزیا 30- کھانے سے پہلے

نیٹرم میور 6

آر سینی کم البم۔ صبح، رات

ہیر سلف 30

ایسا محسوس ہو جیسے اوپر والا ہونٹ لکڑی کا بنا ہو

درمیان میں پھٹے ہوئے

خشک۔ پھٹے ہوئے

اوپر والے ہونٹ میں سوجن

ہیضہ

ہیضہ کی ابتدا میں

بلا درد دست۔ بلا ارادہ پنڈلیوں میں

اور راتوں میں درد

آئرس وری کیولر 6

وریٹرم البم 30

کروٹن ٹگلیم 30

ایپاک 3x

جی متلاوے۔ سبز رنگ کے دست درد کے ساتھ

چہرے کی رنگت پیلی، قے میں پانی نکلے

اسہال، کالی قے، تمام جسم پر سرد پسینہ

پانی کی طرح اخراج جس میں سفید پھٹکیاں

ملی ہوں۔ پانی پینے کے بعد ہمیشہ پاخانہ آئے

ابتدائی درجہ میں جب جی متلائے اور قے آئے

پیٹ میں ایسا احساس کہ کسی نے ہاتھ سے
 پکڑا ہوا ہے۔ حرکت سے تکلیف میں اضافہ
 نکوٹینم 30
 چہرہ پر موت کی سفیدی، متلی، ٹھنڈا پسینہ جبکہ
 بدن گرم، ہچکیاں کوئی قے یا اسہال نہ آئیں
 فاسفورس 30
 جب مرض کی ابتدا ہو۔ قے آنے سے پہلے جب
 اسہال سفیدی مائل ہوں اور پانی کی طرح
 مٹیالے بلادرود ہو ہڈیاں خاموشی
 کیوپرم میتھیکم 30
 شدید قے اور قونج اور اسہال قے سے یا قے سے
 پہلے یا چھاتی میں تشنج جسکی وجہ سے سانس رک جائے
 ٹھنڈا پانی پینے سے قے کو آرام
 کالوستھ 200
 زبردست مروڑدار دست جس سے مریض درود سے
 دہرا ہوتا جائے

ی

یرقان
 نوزائیدہ بچوں کا یرقان
 ایلٹیریم 3
 جگر میں درد جبکہ مریض دائیں طرف نہ لیٹ سکے
 مرکورس سال 30
 جس کی وجہ سے ڈیریا غصہ ہو
 کیمولما 6
 جب پاخانہ کارنگ یا اکل سفید ہو
 چیلٹو نیم
 جب سرطان کاشبہ ہو
 فاسفورس 3
 عام طور پر
 چیلٹو نیم 200
 ڈالیکس 200

ضمیمہ I - طبعی ادویات

- 1- ایکونائٹ، ایسیٹک ایسڈ، اگیریکس، اگنس کاسٹس،
امونیا کارب، آرسینی کم، آرم میٹ، آرنیکا، انگیشیا
- ب- بیسی لینم۔ بریٹا کارب، بیلاؤنا
- پ- ہلٹلا، پلاٹینم
- ت- تھوجا
- ث- ٹوبرکولینم
- ج- چائنا
- ح- ہائیو ساٹس
- ز- زکنم
- ک- کالی کارب، کلکیریا کارب، کیمفر، کینیبس سٹائیوا، کیپیکم، کاربووٹیج،
کاشی کم، سنابرس، کریازوٹم
- ل- لائیکوپوڈیم
- م- میڈورینم
- ن- نائٹرک ایسڈ، نکس وامیکا
- ف- فاسفورس۔ فاسفورک ایسڈ
- س- سورائینم، سکیل کار، سپیا، سینگا، سلشیا، سٹرامونیم، سلفر، سفلینم
- و- وریٹریم البم

ضمیمہ 2... ادویات کی ترتیب

ڈاکٹر شید کے نزدیک ادویات کی مندرجہ ذیل ترتیب بہتر نتائج کی حامل ہے۔

ایکونائٹ : آرنیکا، آرسینی کم، (قولنجی درد) بیلاڈونا، برائی اونیا (کھانسی) اپیکاک (سمش)، سیپیا، سپانچیا (کھانسی)

انٹی مونیم کروڈم : مرکورس، پلٹلا، سلفر

انٹی مونیم ٹارٹ : پلٹلا، سلشیا، ٹیری بنتھم

ایپس : آرسینی کم، گریفائٹس، آئیوڈیم (گھٹنے کی سوجن)، لائیو پوڈیم،

فاسفورس، سلفر

ارجنٹا نائٹرکیم : کلکیریا، کالی کارب، لائیو پوڈیم، مرکورس، پلٹلا، سیپیا،

سلشیا

آرنیکا : ایکونائٹ، آرسینی کم، برائی اونیا، اپیکاک، رشاکس، سلفورک ایسڈ

آرسینی کم

: ایپس، بیلاڈونا، کیٹکس، کیمولہ، جیلیڈونیم، چائنا، سالی کونا، فیرم،

فلورک ایسڈ، ہیرسلف، آئیوڈین، اپیکاک، کالی بائیکرو میکم، لائیو پوڈیم،

مرکورس، نکس و امیکا، رشاکس (جلد) سلفر، ورٹیم، البم

: کاشی کم، ہیرسلف، نائٹرک ایسڈ، سینگا

آرم ٹرانفیلیم

: ایکونائٹ، بیلاڈونا، کلکیریا، چائنا، لائیو پوڈیم، مرکورس، نائٹرک

آرم

ایسڈ، پلٹلا، رشاکس، سیپیا، سلفر

: چائنا، کوئیم، ڈلکارا، ہیرسلف، لیکس، رشاکس، سینگا، سٹرامونیم،

بیلاڈونا

ویلیریانا

کلکیریا کرب : لائیو پوڈیم، نائٹرک ایسڈ، فاسفورس، سلشیا

کلکیریا فاس : سلفر

کینتھرس : بیلاڈونا، کالی بائیکرو میکم، مرکورس، فاسفورس، پلٹلا، سیپیا،

سلفر

کاربووئج	: آرسینی کم، چائنا، ژوروسرا، کالی کارب، فاسفورک ایسڈ
کاشی کم	: انٹی مونیم ٹارٹ، کلکیریا، گائیکم، کالی آئیوڈیم، لائیو پوڈیم
کیمولہ	: نکس وامیکا، پلٹا، رشاکس، روٹا، سیپیا، سلشیا، شانم، سلفر
کاکولس	: ایکونائٹ، آرنیکا، بیلاڈونا، برائی اوینا، کیکٹس، کلکیریا، کاکولس، مرکیورس، نکس وامیکا، پلٹا، رشاکس، سیپیا، سلشیا، سلفر
کانیا	: آرسینی کم، بیلاڈونا، ہیرسلف، اگنیشیا، لائیو پوڈیم، نکس وامیکا، اوپیم، سلفر
کیوپرم	: آرسینی کم، بیلاڈونا، کلکیریا، کاشی کم، سکوتا، ہائیوسائمس، کالی نائٹرکیم، پلٹا، سٹرامونیم، وریٹریم البم
ڈلکامارا	: بیلاڈونا، کلکیریا، لائیو پوڈیم، رشاکس، سیپیا
فیرم	: ایکونائٹ، آرنیکا، بیلاڈونا، چائنا، کوئیم، لائیو پوڈیم، مرکیورس، فاسفورس، پلٹا، سلفر، وریٹریم البم
جیلی میم	: بیپٹیشیا، کیکٹس، اپیکاک
ہیرسلف	: بیلاڈونا، مرکیورس، نائٹرک ایسڈ، سپونجیا، سلشیا
اگنیشیا	: آرسینی کم، بیلاڈونا، کلکیریا، چائنا، لائیو پوڈیم، نکس وامیکا، پلٹا، رشاکس، سیپیا، سلشیا، سلفر
آئیوڈین	: ایکونائٹ، ارجنٹم نائٹرکیم، کلکیریا، کالی بائیوکرومیکم، لائیو پوڈیم، مرک سال، فاسفورس، پلٹا
اپیکاک	: آرسینی کم (ہیضہ، نقاہت، کروب، سردی وغیرہ)، انٹی مونیم ٹارٹ، نکس وامیکا
کالی کارب	: کاربووئج، فاسفورس
لیکس	: آرسینی کم، بیلاڈونا، کاربووئج، کاشی کم، کوئیم، مرکیورس، لائیو پوڈیم

ٲيرن ٲولا

لائيڪوپوٲيم	: گريفاٽس، ليڪيس، ليٲم، فاسفورس، سليشيا
ميگنيشياڪارب	: ڪاشي ڪم، فاسفورس، ٲلٲلا، سٲيا، سلفر
ميگنيشيا ميور	: بيلائوٲا، لائيڪوپوٲيم، نيٲرم ميور، ٲڪس واميڪا، ٲلٲلا، سٲيا
مرڪيورس	: بيلائوٲا، ڇائٲا، ٲلٲلا، ٲير سلف، ٲائٲرڪ ايسٲ، سلفر
نيٲرم ميور	: سٲيا
ٲائٲرڪ ايسٲ	: ڪلڪيريا، ٲلٲلا، سلفر
ٲڪس واميڪا	: برائي اوٲيا، ٲلٲلا، سلفر
اوٲيم	: ايڪوٲائٲ، انٲي موٲيم ٲارٲ، بيلائوٲا، برائي اوٲيا، ٲائيو سائٲس، ٲڪس مو سڪيٲا، ٲڪس واميڪا
ٲيٲروليم	: برائي اوٲيا، ڪلڪيريا، لائيڪوپوٲيم، ٲائٲرڪ ايسٲ، ٲڪس واميڪا، ٲلٲلا، سٲيا، سليشيا، سلفر
فاسفورس	: آر سٲني ڪم، بيلائوٲا، لائيڪوپوٲيم، مرڪيورس، فاسفورس، ٲلٲلا، سليشيا، سلفر
ٲلمبم	: آر سٲني ڪم، بيلائوٲا، لائيڪوپوٲيم، مرڪيورس، فاسفورس، ٲلٲلا، سليشيا، سلفر
ٲلٲلا	: اٲاڪارٲيم، انٲي موٲيم ٲارٲ، بيلائوٲا، برائي اوٲيا، ڪلڪيريا، اگنيشيا، ڪالي بائيوڪرا ميڪم، لائيڪوپوٲيم، ٲائٲرڪ ايسٲ، ٲڪس واميڪا، فاسفورس، رشائڪس، سٲيا، سلفر
رشائڪس	: آر سٲني ڪم، برائي اوٲيا، ڪلڪيريا، ڪوٲيم، ٲڪس واميڪا، فاسفورڪ ايسٲ، ٲلٲلا، سلفر
سٲيا	: بيلائوٲا، ڪلڪيريا، ڪاربوٲيٲ، ڪوٲيم، لائيڪوپوٲيم، ٲائٲرڪ ايسٲ، ٲڪس واميڪا، فاسفورس، ٲلٲلا، رشائڪس، مر سٲرلا، سليشيا، سلفر

سلیشیا : فلورک ایسڈ، سپر سلف، لیکس، لائیکوپوڈیم، سیپیا
سلفر : کلکیریا، لائیکوپوڈیم، سرپیرا، سیپیا

ورمٹرم البم : آرسینی کم، آرنیکا، چائنا، کیو پر م، اپیکاک
زکرم : اگنیشیا



**Tibbi Books for
Atiba Karam**